

محتويات الكتاب

مشروع بنى
في نهاية كل
وحدة

أولاً

الجبر والإحصاء

أولاً : الجبر والإحصاء

الوحدة 1 العلاقات والدوال

الوحدة 2 النسبة والتناسب والتغير
الطردي والتغير العكسي

الوحدة 3 الإحصاء

ثانياً : حساب المثلثات والهندسة

الوحدة 4 حساب المثلثات

الوحدة 5 الهندسة التحليلية



الوحدة 1

العلاقات والدوال

١٠

الوحدة 2

النسبة والتناسب والتغير الطردي والتغير العكسي


٨٦

الوحدة 3

الإحصاء

١٥٠

١٨٥ مفاهيم ومهارات أساسية تراكمية.



دروس الوحدة :

الدرس 1 حاصل الضرب الديكارتي.

الدرس 2 العلاقة - الدالة (التطبيق).

الدرس 3 التعبير الرمزي عن الدالة - دوال كثيرات الحدود.

الدرس 4 دراسة بعض دوال كثيرات الحدود.

مشروع بحثي 🔍 على الوحدة الأولى



يمكنك حل
الامتحانات
التفاعلية على
الدروس من خلال
مسح **QR code**
الخاص بكل امتحان

تساوى زوجين مرتبين

فإن : $٩ = س$ ، $س = س$

إذا كان : $(س ، ٩) = (س ، س)$

فإن : $٣ = س$ ، $س = ٤$

فمثلاً : إذا كان : $(س ، ٩) = (س ، ٣)$

فإن : $س = ٥$ ، $س = ٢$

إذا كان : $(س ، ٢) = (س ، ٥)$

مثال ١

أوجد قيم $س$ ، $ص$ في كل مما يأتي إذا كان :

$$١ \quad (س - ١ ، ٨) = (٨ ، \sqrt{ص}) \quad ٢ \quad (٢٢ ، س + ص) = (ص ، ٢)$$

الحل

$$١ \quad \therefore (س - ١ ، ٨) = (٨ ، \sqrt{ص}) \quad \therefore س - ١ = ٨$$

$$\therefore س = ٩$$

$$\therefore \sqrt{ص} = ٨$$

$$\therefore ص = ٦٤$$

$$\therefore ص = ٦٤$$

$$٢ \quad \therefore (٢٢ ، س + ص) = (ص ، ٢)$$

$$\therefore ص = ٢ \quad \text{«لأن : } ٢٢ = ٢ \text{»}$$

$$\therefore ص = ٢٢$$

$$س + ص = ٢ \quad \text{وبالتعويض عن قيمة } ص :$$

$$\therefore س = ٠$$

$$\therefore س = ٢$$

الإجابات النهائية

لأسئلة حاول بنفسك في نهاية كل درس للتأكد من إجابتك.

أوجد قيم $س$ ، $ص$ في كل مما يأتي إذا كان :

$$١ \quad (س + ١ ، ٩) = (٩ ، ٣)$$

$$٢ \quad (س - ٥ ، ٨) = (٨ ، ٢ - ص)$$

$$٣ \quad (س - ٢ ، ٢ - ص) = (ص ، \sqrt{٦٤})$$



الدرس

1


حامل الضرب الديكارتي

في هذا الدرس سوف نتعرف على مفهوم حاصل الضرب الديكارتي وكيفية إيجاده وتمثيله وقبل تناول هذا الموضوع سوف نتذكر معاً ما درسناه عن الزوج المرتب.

الزوج المرتب

يُسمى $(س ، ٩)$ زوجاً مرتباً ، ويُسمى ٩ بالمسقط الأول ، $س$ بالمسقط الثاني.

ويمكن تمثيل الزوج المرتب $(س ، ٩)$ بنقطة كما بالشكل المقابل.



ملاحظات

إذا كان : $س \neq ٩$ فإن : $(س ، ٩) \neq (٩ ، س)$ فمثلاً : $(٢ ، ٣) \neq (٣ ، ٢)$

وعند تمثيلهما بيانياً كما بالشكل المقابل نجد أنهما يقعان في موضعين مختلفين.

الزوج المرتب ليس مجموعة. أي أن : $(س ، ٩) \neq \{س ، ٩\}$

$(٩ ، ٩)$ زوج مرتب ، بينما في المجموعات لا نكتب $\{٩ ، ٩\}$

بل نكتب $\{٩\}$ بدون تكرار العنصر ٩

توجد مجموعة خالية من العناصر يُرمز لها بالرمز \emptyset بينما لا يوجد زوج مرتب خالي.

حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين منتهيتين

لأي مجموعتين S و T منتهيتين وغير خاليتين يكون :

حاصل الضرب الديكارتي للمجموعة S في المجموعة T ، ويُرمز له بالرمز $S \times T$ هو مجموعة جميع الأزواج المرتبة التي مسقطها الأول عنصر ينتمي إلى S ومسقطها الثاني عنصر ينتمي إلى T

$$\text{أي أن : } S \times T = \{(s, t) : s \in S, t \in T\}$$

فمثلاً : إذا كانت $S = \{1, 2\}$ ، $T = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ فإن :

$$S \times T = \{(1, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 8), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (2, 8)\}$$

$$= \{(1, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 8), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (2, 8)\}$$

والجدول التالي يساعدنا في إيجاد $S \times T$

| المسقط الثاني | | | المسقط الأول |
|---------------|--------|--------|--------------|
| 8 | 7 | 0 | |
| (1, 8) | (1, 7) | (1, 0) | 1 |
| (2, 8) | (2, 7) | (2, 0) | 2 |

$$S \times T = \{(1, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 8), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (2, 8)\}$$

$$= \{(1, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 8), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (2, 8)\}$$

والجدول المقابل يساعدنا في إيجاد $S \times T$

| المسقط الثاني | | المسقط الأول |
|---------------|--------|--------------|
| 2 | 1 | |
| (1, 2) | (1, 1) | 1 |
| (2, 2) | (2, 1) | 2 |

مما سبق لاحظ أن :

$$S \times T \neq T \times S \text{ حيث : } S \neq T$$

ملاحظة

حاصل الضرب الديكارتي للمجموعة S في نفسها ، ويُرمز له بالرمز $S \times S$ أو بالرمز S^2 ويُقرأ « S اثنين»

هو مجموعة جميع الأزواج المرتبة التي كل من مسقطها الأول والثاني عنصر من عناصر S

$$\text{أي أن : } S \times S = \{(s, t) : s \in S, t \in S\}$$

٢٢

فمثلاً : إذا كانت $S = \{1, 2\}$

| المسقط الثاني | | المسقط الأول |
|---------------|--------|--------------|
| 2 | 1 | |
| (1, 2) | (1, 1) | 1 |
| (2, 2) | (2, 1) | 2 |

$$S \times S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$$

ملاحظتان

• لأي مجموعة S يكون :

$$S \times \emptyset = \emptyset \times S = \emptyset$$

حيث : \emptyset المجموعة الخالية.

• إذا كان $S = \{1, 2\}$ فإن $S \times S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$

فإن : $S \times S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$

فمثلاً : إذا كان $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

فإن : $S \times S = \{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (0, 5), (0, 6), (0, 7), (0, 8), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 8), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (2, 8), (3, 0), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (3, 8), (4, 0), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (4, 8), (5, 0), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (5, 7), (5, 8), (6, 0), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6), (6, 7), (6, 8), (7, 0), (7, 1), (7, 2), (7, 3), (7, 4), (7, 5), (7, 6), (7, 7), (7, 8), (8, 0), (8, 1), (8, 2), (8, 3), (8, 4), (8, 5), (8, 6), (8, 7), (8, 8)\}$

تمثيل حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين منتهيتين

يمكن تمثيل حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين منتهيتين بطريقتين :

• الطريقة الأولى : المخطط السهمي .



فمثلاً : إذا كانت : $S = \{1, 2\}$ ، $V = \{0, 7, 8\}$

فإنه يمكن تمثيل حاصل الضرب الديكارتي $S \times V$ حيث :

$S \times V = \{(1, 0), (1, 7), (1, 8), (2, 0), (2, 7), (2, 8)\}$ كالتالي :

الطريقة الثانية : المخطط البياني (الديكارتي)

الطريقة الأولى : المخطط السهمي





حيث تمثل عناصر المجموعة S أفقياً وعناصر المجموعة V رأسياً وتمثل نقاط تقاطع الخطوط الأفقية والرأسية الأزواج المرتبة عناصر حاصل الضرب الديكارتي $S \times V$

حيث نرسم سهماً من كل عنصر يمثل المسقط الأول «وهي عناصر المجموعة S » إلى كل عنصر يمثل المسقط الثاني «وهي عناصر المجموعة V »



وبالمثل يمكن تمثيل $S \times V$ حيث :

$S \times V = \{(1, 0), (1, 7), (1, 8), (2, 0), (2, 7), (2, 8)\}$ كالتالي :



• كما يمكن تمثيل $S \times V$ حيث :

$S \times V = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$ كالتالي :



المخطط السهمي

لاحظ أن : الشكل يُسمى «عروة» لتدل على أن السهم يخرج من النقطة وينتهي عند نفس النقطة.

مثال ٢

إذا كانت : $S = \{2, 3, 4\}$ ، $V = \{1, 2\}$ فأوجد كلاً من :

١ $S \times V$ ٢ $V \times S$ ٣ $S \times S$

وأوجد عدد عناصر كل منها.

الحل

١ $S \times V = \{(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2)\}$

عدد عناصر $S \times V = 6$ أزواج مرتبة.


٢ $V \times S = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4)\}$

عدد عناصر $V \times S = 6$ أزواج مرتبة.

٣ $S \times S = \{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$

$\{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$

عدد عناصر $S \times S = 9$ أزواج مرتبة.



الحل

$$1. \therefore \text{ص} \cup \text{ع} = \{9, 7, 5, 3\}$$

$$\therefore \text{ص} \times (\text{ع} \cup \text{ص}) = \{9, 7, 5, 3\} \times \{2, 4\}$$

$$= \{(3, 2), (3, 4), (5, 2), (5, 4), (7, 2), (7, 4), (9, 2), (9, 4)\}$$

$$= \{(9, 2), (7, 2), (5, 2), (3, 2), (9, 4), (7, 4), (5, 4), (3, 4)\}$$

$$\text{ص} \times \text{ص} = \{2, 4\} \times \{7, 5, 3\}$$

$$(1) \{(7, 2), (5, 2), (3, 2), (7, 4), (5, 4), (3, 4)\} =$$

$$\text{ص} \times \text{ع} = \{2, 4\} \times \{9, 7, 5\}$$

$$(2) \{(9, 2), (7, 2), (5, 2), (9, 4), (7, 4), (5, 4)\} =$$

ومن (1)، (2) :

$$\therefore (\text{ص} \times \text{ص}) \cup (\text{ص} \times \text{ع}) = \{(9, 2), (7, 2), (5, 2), (3, 2), (9, 4), (7, 4), (5, 4), (3, 4)\}$$

$$= \{(9, 2), (7, 2), (5, 2), (3, 2), (9, 4), (7, 4), (5, 4), (3, 4)\}$$

$$2. \therefore \text{ص} \cap \text{ع} = \{7, 5\}$$

$$\therefore \text{ص} \times (\text{ع} \cap \text{ص}) = \{7, 5\} \times \{2, 4\}$$

$$= \{(7, 2), (5, 2), (7, 4), (5, 4)\}$$

ومن (1)، (2) :

$$\therefore (\text{ص} \times \text{ص}) \cap (\text{ص} \times \text{ع}) = \{(7, 2), (5, 2), (7, 4), (5, 4)\}$$

$$3. \therefore \text{ع} - \text{ص} = \{9\}$$

$$\therefore \text{ص} \times (\text{ع} - \text{ص}) = \{9\} \times \{2, 4\} = \{(9, 2), (9, 4)\}$$

$$\text{ومن (1)، (2) : } \therefore (\text{ص} \times \text{ص}) - (\text{ص} \times \text{ع}) = \{(9, 2), (9, 4)\}$$

ملاحظات

إذا رمزنا لعدد عناصر أى مجموعة بالرمز n فإنه من المثال السابق نجد أن :

$$n(\text{ص}) = 2, \quad n(\text{ع}) = 4$$

$$n(\text{ص} \times \text{ص}) = 4, \quad n(\text{ص} \times \text{ع}) = 8, \quad n(\text{ع} \times \text{ص}) = 8, \quad n(\text{ع} \times \text{ع}) = 16$$

$$\text{أى أن : } n(\text{ص} \times \text{ص}) = n(\text{ص}) \times n(\text{ص}) = 2 \times 2 = 4$$

$$n(\text{ص} \times \text{ع}) = n(\text{ع} \times \text{ص}) = n(\text{ص}) \times n(\text{ع}) = 2 \times 4 = 8$$

٢٢

حاول بنفسك

إذا كانت : $\text{ص} = \{1, 2, 3, 4\}$ ، $\text{ع} = \{1, 2\}$ فأوجد كلًا مما يأتى :

$$1. \text{ص} \times \text{ص} \text{ ومثله بمخطط سهمى. } 2. \text{ص} \times \text{ع} \text{ ومثله بمخطط بيانى.}$$

$$3. \text{ع} \times (\text{ص} \times \text{ع}) \quad 4. \text{ع} \times (\text{ص} \times \text{ص})$$

تذكر العمليات على المجموعات

إذا كانت : $\text{ص} = \{1, 2, 3, 4\}$ ، $\text{ع} = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ فإن :

$$\text{ص} \cap \text{ع} = \text{مجموعة العناصر المشتركة بين ص وع} = \{2, 3, 4\}$$

$$\text{ص} \cup \text{ع} = \text{مجموعة العناصر الموجودة فى ص أو ع دون تكرار}$$

$$= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\text{ص} - \text{ع} = \text{مجموعة العناصر الموجودة فى ص وغير موجودة فى ع وهى } \{1\}$$

$$\text{ع} - \text{ص} = \text{مجموعة العناصر الموجودة فى ع وغير موجودة فى ص وهى } \{5, 6\}$$

مثال ٣

إذا كانت : $\text{ص} = \{2, 4\}$ ، $\text{ع} = \{3, 5, 7\}$ ، $\text{ف} = \{9, 7, 5\}$

مثل المجموعات ص ، ع ، ف بشكل فن ثم أوجد :


$$1. \text{ص} \times (\text{ع} \cup \text{ف}) \quad 2. (\text{ص} \times \text{ع}) \cup (\text{ص} \times \text{ف})$$

$$3. \text{ص} \times (\text{ع} \cap \text{ف}) \quad 4. (\text{ص} \times \text{ع}) \cap (\text{ص} \times \text{ف})$$

$$5. \text{ص} \times (\text{ع} - \text{ف}) \quad 6. (\text{ص} \times \text{ع}) - (\text{ص} \times \text{ف})$$


وفيما يلي التمثيل البياني لكل من : $ط \times ط$ ، $ص \times ص$ ، $ع \times ع$:

أولاً تمثيل حاصل الضرب الديكارتي $ط \times ط$ (ط^٢)



المتعامدة للحاصل الديكارتي $ط \times ط$ والتي تتكون من تقاطع المستقيمتين الرأسية والأفقية المارة بالنقط التي تمثل الأعداد الطبيعية على كل من $س$ \rightarrow ، $ص$ \rightarrow وكل نقطة من نقط هذه الشبكة تمثل أحد الأزواج المرتبة في الحاصل الديكارتي $ط \times ط$ فمثلاً :
 • النقطة ١ تمثل الزوج المرتب $(2, 3)$.
 • النقطة ٢ تمثل الزوج المرتب $(0, 5)$.
 • النقطة ٣ تمثل الزوج المرتب $(4, 0)$.
 • النقطة ٤ تمثل الزوج المرتب $(0, 0)$.


ثانياً تمثيل حاصل الضرب الديكارتي $ص \times ص$ (ص^٢)



* وكل نقطة من نقاطها تمثل أحد الأزواج المرتبة في الحاصل الديكارتي $ص \times ص$ فمثلاً :
 • النقطة ١ تمثل الزوج المرتب $(4, 2)$.
 • النقطة ٢ تمثل الزوج المرتب $(4, 2)$.
 • النقطة ٣ تمثل الزوج المرتب $(-2, 4)$.
 • النقطة ٤ تمثل الزوج المرتب $(0, 3)$.

ملاحظة

في المثال السابق يمكن تمثيل $ص \times (ص \cap ع)$ بمخطط سهمي وآخر بياني كالتالي :



حاول بنفسك ٣

إذا كانت : $س = \{2, 3\}$ ، $ص = \{1, 2, 3, 4\}$ ، $ع = \{2\}$

مثل كلاً من : $س \times ص$ ، $ع \times ص$ بشكل فن ثم أوجد :

١ $ع \times (س \cap ص)$ ٢ $(ع \times س) \cup (ع \times ص)$

حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين غير منتهيتين

* نعلم أنه إذا كانت $س$ مجموعة منتهية عدد عناصرها $ن$ فإن حاصل الضرب الديكارتي $س \times س$ هو أيضاً مجموعة منتهية عدد عناصرها $ن^2$

فمثلاً : إذا كان : $ن = 3$ فإن : $ن = (س \times س) = 9$

* أما إذا كانت $س$ مجموعة غير منتهية فإن : $س \times س$ تكون مجموعة غير منتهية أيضاً .

ومن أمثلة ذلك : $ط \times ط = \{(س, س) : س \in ط, ط \in ط\}$

$$ص \times ص = \{(س, س) : س \in ص, ص \in ص\}$$

$$ن \times ن = \{(س, س) : س \in ن, ن \in ن\}$$

$$ع \times ع = \{(س, س) : س \in ع, ع \in ع\}$$

تمثيل حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين غير منتهيتين


* نعلم أنه إذا كانت $س$ مجموعة منتهية فإن حاصل الضرب الديكارتي $س \times س$ يمثل بمخطط بياني يتكون من عدد منتهٍ من النقط.

* أما إذا كانت $س$ مجموعة غير منتهية فإن حاصل الضرب الديكارتي $س \times س$ يمثل بمخطط بياني يتكون من عدد غير منتهٍ من النقط.

مثال ٤

اذكر الربع الذي تقع فيه أو المحور الذي تقع عليه كل من النقط الآتية ثم عين موضعها على الشبكة البيانية المتعامدة للحاصل الديكارتي $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:
 أ : $(-1, 2)$ ، ب : $(-1, -4)$ ، ج : $(1, 2)$ ، د : $(-2, -2)$ ، هـ : $(\frac{1}{2}, 0)$ ، س : $(-\frac{1}{2}, 0)$

الحل



- أ : $(-1, 2)$ تقع في الربع الرابع.
- ب : $(-1, -4)$ تقع في الربع الثاني.
- ج : $(1, 2)$ تقع في الربع الأول.
- د : $(-2, -2)$ تقع في الربع الثالث.
- هـ : $(\frac{1}{2}, 0)$ تقع على محور السينات.
- س : $(-\frac{1}{2}, 0)$ تقع على محور الصادات.

حاول بنفسك ٤


أكمل الجدول التالي بكتابة الربع أو المحور الذي تقع عليه كل نقطة :

| النقطة | $(-5, 3)$ | $(-2, 1)$ | $(\frac{1}{2}, 0)$ | $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ | $(0, 0)$ | $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ |
|-----------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|
| الربع أو المحور | | | | | | |

حاصل الضرب الديكارتي لفترتين

سبق أن درسنا أن الفترة هي مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R} ، ويكون حاصل الضرب الديكارتي لفترتين مجموعة جزئية من حاصل الضرب الديكارتي $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ويمكن تمثيله كما بالمثل التالي :


ثالثاً تمثيل حاصل الضرب الديكارتي $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (٢)



- الشبكة التربيعية المتعامدة للحاصل الديكارتي $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ هي عبارة عن سطح منطقة ممتدة بلا حدود من جميع الاتجاهات والشكل المقابل يوضح جزءاً صغيراً من هذه المنطقة.
- كل نقطة من نقاط هذه المنطقة تمثل أحد الأزواج المرتبة للحاصل الديكارتي $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ فمثلاً :
 • النقطة أ تمثل الزوج المرتب $(2, -3)$
 • النقطة ب تمثل الزوج المرتب $(-3, 4)$

ملاحظات ١١

- يُسمى المستقيم الأفقي \overrightarrow{SS} محور السينات أو المحور الأفقي.
- ويُسمى المستقيم الرأسى \overrightarrow{SS} محور الصادات أو المحور الرأسى.
- نقطة تقاطع المحورين \overrightarrow{SS} ، \overrightarrow{SS} تُسمى بـ «نقطة الأصل».
- إذا كانت النقطة أ تمثل الزوج المرتب $(س, ص)$ في الحاصل الديكارتي $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ فإن :



- المسقط الأول \overrightarrow{SS} يسمى بالإحداثى السينى للنقطة أ
- المسقط الثانى \overrightarrow{SS} يسمى بالإحداثى الصادى للنقطة أ
- المحوران \overrightarrow{SS} ، \overrightarrow{SS} يقسمان المستوى إلى أربعة أقسام (أرباع) كما بالشكل المقابل ويمكن التعرف على الربع الذى تقع فيه أى نقطة من إشارتى إحداثييه.

- إذا كان الإحداثى السينى للنقطة = صفر فإن النقطة تقع على محور الصادات.
- إذا كان الإحداثى الصادى للنقطة = صفر فإن النقطة تقع على محور السينات.

مثال ٥

إذا كانت : $s = [2, 0]$ ، $s = [2, 1]$
 فمثل بيانياً باستخدام الشبكة البيانية المتعامدة للحاصل الديكارتي $s \times s$ المنطقة التي تمثل كلاً من :
 ١ $s \times s$ ٢ $s \times s$ ٣ $s \times s$
 ثم بين في كل حالة أيًا من النقط الآتية ينتمي إلى كل من حواصل ضرب الديكارتي السابقة
 وأيها لا ينتمي : $(2, 0)$ ، $(0, 1)$ ، $(2, 2)$

الحل

١ لتمثيل $s \times s$ بيانياً نتبع ما يلي :
 • نمثل الفترة s على محور السينات.
 • نمثل الفترة s على محور الصادات.
 • تمثل منطقة تقاطع اللونين الحاصل الديكارتي $s \times s$
 • $(2, 2) \in s \times s$ لأنها تنتمي للمنطقة التي تمثل $s \times s$
 • $(0, 1) \notin s \times s$ لأنها تقع خارج المنطقة التي تمثل $s \times s$
 • $(2, 0) \in s \times s$

٢ لتمثيل $s \times s$ بيانياً نتبع ما يلي :
 • نمثل الفترة s مرة على محور السينات ومرة أخرى على محور الصادات.
 • منطقة تقاطع اللونين تمثل $s \times s$
 • $(2, 2) \in s \times s$
 • $(0, 1) \in s \times s$ ، $(2, 0) \in s \times s$

٣ بالمثل يمكن تمثيل $s \times s$ كما بالشكل المقابل :
 • $(2, 2) \in s \times s$
 • $(0, 1) \notin s \times s$
 • $(2, 0) \notin s \times s$

حاول بنفسك ٥

إذا كانت : $s = [1, 2]$ ، $s = [2, 0]$
 أوجد المنطقة التي تعبر عن كل مما يأتي باستخدام الشبكة البيانية المتعامدة للحاصل الديكارتي $s \times s$:
 ١ $s \times s$ ٢ $s \times s$
 وبين أيًا من النقط الآتية ينتمي إلى $s \times s$:
 ٢ $(2, 1)$ ، $(2, 0)$ ، $(-1, 3)$ ، $(-2, -2)$

في نهاية كل درس
 ستجد الإجابات النهائية لأسئلة
 حاول بنفسك بنفس هذا الشكل

١ $(1, 1) \in s \times s$

١ $\{(1, 1)\}$ ٢ $\{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$
 ٣ $\{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$
 ٤ $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$
 ٥ $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$
 ٦ $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$
 ٧ $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$
 ٨ $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$
 ٩ $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$
 ١٠ $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$

تمارين 1

على حامل الضرب الديكارتي



اخترت
تفاعلي



أسئلة كتاب الوزارة

أولاً حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين منتهيتين

1 في كل مما يأتي أوجد قيم a, b إذا كان :

$$(\sqrt{27}, \sqrt{20}) = (a, b) \quad 2$$

$$(9, 5) = (a, b) \quad 1$$

$$(1-a, 4-2) = (3-a, 6) \quad 4$$

$$(3-a, 2) = (1+a, 2-4) \quad 3$$

$$(3-a^2, 4-2) = (a, b) \quad 6$$

$$(1-a^2, 2-4) = (26, 7-4) \quad 5$$

$$(a, a^2) = (7, 4) \quad 8$$

$$(\sqrt{27}, 32) = (1-a^2, 4) \quad 7$$

$$(44, 1-45) = (a, 3) \quad 10$$

$$(4, 1+a^2) = (7, 42) \quad 9$$

2 إذا كانت : $\{2, 1\} = S$ ، $\{5, 4, 3\} = V$

أوجد $S \times V$ ومثله : 1 بالمخطط السهمي. 2 بالمخطط البياني.

3 إذا كانت : $\{8, 4, 3\} = S$

أوجد S^2 ومثله : 1 بالمخطط السهمي. 2 بالمخطط البياني.

4 إذا كانت : $\{3, 2, 1\} = S$ ، $\{4\} = V$

أوجد : 1 $S \times V$ 2 $V \times S$

$$3 \quad 4 \quad 2 \quad 1$$

5 إذا كانت : $\{1, 2\} = S$ ، $\{0, 4\} = V$ ، $\{2, 5, 4\} = E$

أوجد : 1 $S \times V$ 2 $V \times E$ 3 S^2

$$4 \quad 5 \quad 6 \quad 2 \quad 1 \quad 3$$

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان : $(س - ١ ، ١١) = (٨ ، ص + ٣)$ فإن : $\sqrt{س + ٢} = \dots\dots\dots$ (يوسعيد ١٩)

- (١) ٥ (ب) $٥ \pm$ (ج) $\sqrt{١٧}$ (د) ٢٥

٢ إذا كان : $(س + ٢ ، ص) = (٢ ، ٣)$ فإن : $س^٥ + ص = \dots\dots\dots$ (الشرقية ٢٠)

- (١) ٣ (ب) ٢ (ج) صفر (د) ١

٣ إذا كان : $(س - ٣ ، \sqrt{ص}) = (١ ، ٤)$ فإن : $س + ص = \dots\dots\dots$ (الغربية ١٨)

- (١) ٢ (ب) ٣ (ج) ١٦ (د) ١٧

٤ لأي مجموعتين $أ ، ب$ تعبر المجموعة $\{(س ، ص) : س \in أ ، ص \in ب\}$ عن $\dots\dots\dots$ (الدفعلية ١٦)

- (١) $أ \cup (ب \times أ)$ (ب) $أ \times ب$ (ج) $أ \cup (أ \times ب)$ (د) $أ \times ب$

٥ إذا كانت : $س = \{١ ، ٢\}$ فإن : $س \times \emptyset = \dots\dots\dots$

- (١) $س$ (ب) \emptyset (ج) $\{٠\}$ (د) $\{(٠ ، ١) ، (٠ ، ٢)\}$

٦ إذا كانت : $س = \{٢\}$ ، $ص = \{٣\}$ فإن : $س \times ص = \dots\dots\dots$ (الجيزة ١٧)

- (١) ٦ (ب) $\{٦\}$ (ج) $(٢ ، ٣)$ (د) $\{(٢ ، ٣)\}$

٧ إذا كانت : $س = \{٣\}$ فإن : $س^٢ = \dots\dots\dots$ (الشرقية ١٧ ، القاهرة ١٣)

- (١) ٩ (ب) $(٣ ، ٣)$ (ج) $\{٩\}$ (د) $\{(٣ ، ٣)\}$

٨ إذا كانت : $س = \{٣\}$ فإن : $س(س^٢) = \dots\dots\dots$ (قنا ٢٠)

- (١) ١ (ب) ٩ (ج) $\{٣ ، ٣\}$ (د) ٣

٩ إذا كانت : $س = \{١ ، ٢\}$ ، $ص = \{٢ ، ٤\}$

فإن : $(٣ ، ٤) \in \dots\dots\dots$ (السويس ١٩ ، قنا ١١)

- (١) $س \times ص$ (ب) $ص \times س$ (ج) $س^٢$ (د) $ص^٢$

١٠ إذا كان: $\nu = (س)$ ، $\nu = \{١، ٢\}$

(الجيزة ١٥)

فإن: $\nu = (س \times ص) = \dots\dots\dots$

٤ (١) ٣ (ب) ٥ (ج) ٦ (د)

١١ إذا كان: $\nu = (س)$ ، $\nu = (س \times ص) = ١٢$

(بوسعيد ٢٠، المنيا ١٩، القاهرة ١٨، بوسعيد ١٧، دمياط ١٥)

فإن: $\nu = (ص) = \dots\dots\dots$

٤ (١) ٩ (ب) ١٥ (ج) ٣٦ (د)

١٢ إذا كان: $\nu = (س^٢)$ ، $\nu = (س) = \dots\dots\dots$

٢ (١) ٣ (ب) ٩ (ج) ٨١ (د)

١٣ إذا كان: $\nu = (س^٢)$ ، $\nu = (س \times ص) = ٦$

(الجيزة ٢٠)

فإن: $\nu = (ص^٢) = \dots\dots\dots$

٤ (١) ٩ (ب) ١٦ (ج) ١٢ (د)

(دمياط ١٨)

١٤ إذا كان: $\nu = (س) = \nu = (س \times ص)$ فإن: $\nu = (ص) = \dots\dots\dots$

١ (١) ٢ (ب) ٢ (ج) ٤ (د)

١٥ إذا كان: $٢ \ni س^٢$ حيث $س = \{س : ٥ > س > ٧، س \ni ط\}$

فإن: $٢ = \dots\dots\dots$

(الشرقية ٢٠)

٣٦ (١) {٣٦} (ب) (٦، ٦) (ج) [٧، ٥] (د)

١٦ إذا كان: $(٥، ٣) \ni \{٦، ٢\} \times \{س، ٨\}$

(الإسكندرية ٢٠، بوسعيد ١٩، كفر الشيخ ١٨، قنا ١٥)

فإن: $س = \dots\dots\dots$

٨ (١) ٦ (ب) ٥ (ج) ٣ (د)

١٧ إذا كان: $\{٢\} \times \{س، ص\} = \{(٤، ٢)، (٣، ٢)\}$

فإن: $س - ص = \dots\dots\dots$

(كفر الشيخ ٢٠، الشرقية ١٥)

١ (١) ١- (ب) $١ \pm$ (ج) (د) صفر

٧ إذا كان: $س \times ص = \{(٦، ٢)، (٩، ٢)، (٦، ٣)، (٩، ٣)، (٦، ٥)، (٩، ٥)\}$

{(٩، ٥) أوجد: $س، ص$

٨ إذا كان : $\sim \times \sim = \{(0, 1), (3, 1), (1, 1)\}$

أوجد : ١ \sim ، \sim ٢ $\sim \times \sim$ ٣ \sim^2

(القليوبية ٢٠، سوهاج ١٩، الجيزة ١٦)

٩ إذا كان : $\sim^2 = \{(1, 1), (2, 1), (1, 2), (2, 2)\}$ أوجد : \sim

١٠ إذا كان : $\sim \times \sim = \{(3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$ أوجد : \sim^2

١١ إذا كانت : $\sim = \{1, 2, 3, 4\}$ ، $\sim = \{0, 2, 4\}$

مثل \sim ، \sim بشكل فن ثم أوجد :

١ $(\sim \cap \sim) \times \sim$ ٢ $(\sim - \sim) \times \sim$ ٣ $(\sim - \sim) \times \sim$

١٢ إذا كانت : $\sim = \{3, 4\}$ ، $\sim = \{0, 4\}$ ، $\sim = \{0, 6\}$

أوجد : ١ $\sim \times (\sim \cap \sim)$ ٢ $(\sim - \sim) \times \sim$ ٣ $(\sim - \sim) \times (\sim - \sim)$

(المنيا ١٩، المنوفية ١٨، الدقهلية ١٣)

١٣ إذا كانت : $\sim = \{1\}$ ، $\sim = \{2, 3\}$ ، $\sim = \{0, 2, 6\}$

مثل المجموعات \sim ، \sim ، \sim بشكل فن ثم أوجد :

أولاً : ١ $\sim \times \sim$ ٢ $\sim \times \sim$ ٣ $\sim \times \sim$ ٤ \sim^2

ثانياً : $(\sim \times \sim) \cup (\sim \times \sim)$ ثالثاً : $\sim \times (\sim \cap \sim)$

رابعاً : $(\sim \times \sim) \cap (\sim \times \sim)$ خامساً : $(\sim - \sim) \times (\sim \cup \sim)$

ثانياً حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين غير منتهيتين

١٤ على شبكة بيانية متعامدة للحصول الديكارتي $\sim \times \sim$ عين النقط الآتية :

أ $(0, 4)$ ، ب $(3, 6)$ ، ج $(7, 2)$ ، د $(6, 1)$ ، هـ $(4, 0)$ ، م $(6, 0)$ ، ن $(0, 9)$

ثم اذكر الربع الذي تقع فيه أو المحور الذي تنتمي إليه كل من هذه النقاط.

١٥ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ النقطة تقع فى الربع الثانى.

- (أ) (٢ ، ٣) (ب) (٣ ، ٢-) (ج) (٢- ، ٣-) (د) (٢- ، ٣-)

٢ إذا كانت النقطة (٩- ، ب ، هـ) تقع على محور الصادات فإن (البجيرة ١٨)

- (أ) $ب = ٩$ (ب) $ب + ٩ = \text{صفر}$ (ج) $ب \neq ٩$ (د) $٩ = ب - ٩$

٣ إذا كانت النقطة (هـ ، ب-٧) تقع على محور السينات

فإن : ب = (القليوبية ٢٠ ، القاهرة ١٨ ، قنا ١٧ ، ش. سيناء ١٦ ، الإسكندرية ١١)

- (أ) ٢ (ب) ٥ (ج) ٧ (د) ١٢

٤ إذا كانت النقطة (س ، ٧) تقع على محور الصادات

فإن : هـ س + ١ = (البجيرة ١٧)

- (أ) صفر (ب) ١ (ج) ٥ (د) ٦

٥ إذا كانت : (س + ١ ، $\sqrt{٢٧}$) = (١- ، ص) فإن النقطة (س ، ص) تقع فى الربع (الفيوم ٢٠)

- (أ) الأول. (ب) الثانى. (ج) الثالث. (د) الرابع.

٦ إذا كانت : $ب > ٣$ فإن النقطة (هـ ، ب-٣) تقع فى الربع (القاهرة ١٦)

- (أ) الأول. (ب) الثانى. (ج) الثالث. (د) الرابع.

٧ إذا كانت : $س \in ح$ فإن النقطة (س- ، $\sqrt{س}$) تقع فى الربع (المنوفية ٢٠)

- (أ) الأول. (ب) الثانى. (ج) الثالث. (د) الرابع.

٨ إذا كانت النقطة (٩ ، ب) تقع فى الربع الرابع فإن : ب صفر

- (أ) $=$ (ب) $<$ (ج) $>$ (د) \leq

٩ إذا كانت النقطة (٢٢ ، ب-٣) $\exists س س \rightarrow$ فإن : $\frac{ب}{٢} =$ (حيث $٢ \neq ٠$)

- (أ) صفر (ب) $\frac{٢}{٣}$ (ج) ٢ (د) ٣

١٠ إذا كان : $(س | ٤) = (٣ ، ص٢)$ والنقطة (س ، ص) تقع فى الربع الثانى
فإن : $س + ص = \dots\dots\dots$ (الشرقية ١٤)

- (١) ٧ (ب) ١ (ج) ١- (د) ٧-

١١ إذا كانت : $٢ > صفر ، ب < صفر$ ، فإن النقطة التى تقع فى الربع الثانى هى

(الفصوص ١٨)

- (١) (٢ ، ب) (ب) (٢- ، ب) (ج) (٢ ، ب-) (د) (٢- ، ب-)

١٢ إذا كانت النقطة (س-٢ ، ٤-س) تقع فى الربع الرابع فإن : $س = \dots\dots\dots$
حيث $س \exists ص$

- (١) صفر (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

١٣ إذا كانت النقطة (س-٤ ، ٢-س) حيث $س \exists ص$ تقع فى الربع الثالث

فإن : $س = \dots\dots\dots$ (البجيرة ٢٠ ، بوسعيد ١٩ ، المنوفية ١٧ ، كفر الشيخ ١٦ ، الإسكندرية ١٥)

- (١) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٦

١٤ إذا كانت : النقطة (٢-٤ ، ٤) تقع على الجزء السالب من محور الصادات

فإن : $٤ = \dots\dots\dots$ (الشرقية ١٨)

- (١) $٢ \pm$ (ب) ٤ (ج) ٢- (د) ٢

١٦ إذا كانت : $٢ (٠ ، ٢-) ، ب (٢- ، ٣) ، ح (٢ ، ٣)$ فعين على الشبكة التربيعية ح^٢
النقط ٢ ، ب ، ح ثم أوجد مساحة $\Delta ب ح$
«٦ وحدات مربعة»

١٧ إذا كانت : $س = [٢- ، ٣]$

أوجد المنطقة التى تمثل $س \times س$ ثم بين أى من النقاط التالية تنتمى إلى الحاصل
الديكارى $س \times س$:

- ٢ (٢ ، ١) ، ب (٣ ، ١-) ، ح (١- ، ٤) ، د (٢- ، ٠)

١٨ إذا كانت : $س = [٢- ، ٣]$ ، $ص = [٤ ، ٠]$ فأوجد المنطقة التى تمثل كلاً من :

- ١ $س \times ص$ ٢ $ص \times س$ ٣ $ص٢$

١٩ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان : $\neg S \times \neg V = \{(1, 2), (1, 3)\}$ ، $\neg S \times \neg V = \{1, 2, 3\}$ ،

(الشرقية ٢)

فإن : $\neg S = \dots\dots\dots$

(أ) $\{1\}$ (ب) $\{1, 2\}$ (ج) $\{1, 2, 3\}$ (د) $\{1, 2, 3\}$


٢ إذا كان : $\neg S - \neg V = \{7\}$ ، $\neg S - \neg V = \{2, 4\}$ ، $\neg S \cap \neg V = \{1\}$ ،

فإن : $(\neg S \times \neg V) \cap (\neg S \times \neg V) = \dots\dots\dots$

(أ) $\{(6, 6)\}$ (ب) $\{(2, 7), (4, 7)\}$

(ج) $\{(7, 2), (7, 4)\}$ (د) $\{(6, 7)\}$

٣ $\{2\} \times [0, 2]$ يمثلها بيانياً الشكل



للمتفوقين



٢٠ إذا كانت : $\neg S \supset \neg V$

، $\neg S \times \neg V = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 2)\}$ ،
فأوجد قيم :

٢١ إذا كانت : $\neg S \supset \neg V$ ، وكان $\neg S \times \neg V = \{(1, 6), (2, 6), (3, 6)\}$ ،

(دمياط ٧)

فأوجد : $\neg S$ ، $\neg V$ ، $\neg S \times \neg V$



الدرس

2

العلاقة - الدالة (التطبيق)

أولاً العلاقة

العلاقة من مجموعة S إلى مجموعة T هي ارتباط يربط بعض أو كل عناصر S ببعض أو كل عناصر T وسنرمز لها عادة بالرمز « f ».

• بيان العلاقة f من S إلى T هو مجموعة من الأزواج المرتبة التي مسقطها الأول ينتمي إلى S ، ومسقطها الثاني ينتمي إلى T ويرتبط المسقط الأول في كل منها بالمسقط الثاني بهذه العلاقة.

فإذا كان : $(s, t) \in f$ بيان f حيث $s \in S$ ، $t \in T$ فإننا نعبر عن ذلك فنكتب « s f t ».

• بيان العلاقة من المجموعة S إلى المجموعة T يكون مجموعة جزئية من الحاصل الديكارتي $S \times T$.

أي أن : بيان f $\subseteq S \times T$.

• يمكن تمثيل العلاقة بمخطط سهمي أو مخطط ديكارتي (بياني).


مثال ١

إذا كانت : $\{5, 2\} = \sim$ ، $\{7, 4, 1\} = \sim$ وكانت \sim علاقة من \sim إلى \sim
حيث « \sim » تعني « $a > b$ » لكل $a \in \sim$ ، $b \in \sim$
فاكتب بيان \sim ومثلها بمخطط سهمي وآخر ديكارتي (بياني).


الحل

$\therefore 2$ ليست أصغر من 1
 $\therefore 4 > 2$ ،
 $\therefore 7 > 2$ ،
 $\therefore 5$ ليست أصغر من 1
 $\therefore 5$ ليست أصغر من 4
 $\therefore 7 > 5$ ،
 \therefore بيان $\sim = \{(7, 5), (7, 2), (4, 2)\}$

الشكلان الآتيان يمثلان المخطط السهمي والمخطط الديكارتي لهذه العلاقة :



المخطط الديكارتي



المخطط السهمي

حاول بنفسك ١

إذا كانت : $\{3, 2, 1\} = \sim$ ، $\{6, 5, 4, 3\} = \sim$ وكانت \sim علاقة من \sim إلى \sim
حيث « \sim » تعني « $a = b + 3$ » لكل $a \in \sim$ ، $b \in \sim$
اكتب بيان \sim ومثلها بمخطط سهمي.

ملاحظة

إذا كانت العلاقة \sim من \sim إلى \sim فإننا نقول إن \sim علاقة على \sim ويكون بيان $\sim \supset \sim \times \sim$ ٢٢

مثال ٢


إذا كانت : $\sim = \{2, 1, 0, 1-, 2-\}$ وكانت \sim علاقة على \sim حيث « ١ \sim ٢ »

تعني « ١ معكوس جمعي للعدد ٢ » لكل $1 \sim 2$ ، $2 \sim 1$ ، فاكذب بيان \sim ومثلها بمخططين أحدهما سهمي والآخر بياني.


الحل

بيان $\sim = \{(2-, 2), (1-, 1), (0, 0), (1, 1-), (2, 2-)\}$


الشكلان الآتيان يمثلان المخطط السهمي والمخطط البياني للعلاقة « \sim » :




المخطط البياني للعلاقة \sim



(أو)



المخطط السهمي للعلاقة \sim



مثال ٣

إذا كان المخطط السهمي المقابل يمثل علاقة \sim على \sim

اكتب بيان \sim ومثله بمخطط ديكارتي.

نلاحظ في العلاقة السابقة أن :

كل عنصر من عناصر S قد ارتبط بعنصر واحد فقط من عناصر S


مثل هذه العلاقة تسمى «دالة» أو «تطبيق»، كما تسمى :

• المجموعة $S = \{0, 1, 2, 3\}$ بـ «مجال الدالة»

• المجموعة $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ بـ «المجال المقابل للدالة».

• المجموعة $S = \{0, 2, 4, 6\}$ بـ «مدى الدالة»

وهو مجموعة جزئية من المجال المقابل للدالة.



وبصفة عامة :

يُقال لعلاقة من S إلى S إنها دالة إذا تحققت إحدى الحالات الآتية :

١ في بيان العلاقة : كل عنصر من عناصر S يظهر مرة واحدة فقط كمسقط أول في أحد الأزواج المرتبة التي تنتمي إلى بيان العلاقة (لاحظ بيان العلاقة السابقة).

٢ في المخطط السهمي الممثل للعلاقة : كل عنصر من عناصر S يخرج منه سهم واحد فقط إلى أحد عناصر S (لاحظ المخطط السهمي للعلاقة السابقة).

٣ في المخطط البياني الممثل للعلاقة : كل خط رأسي تقع عليه نقطة واحدة فقط من النقاط التي تمثل العلاقة (لاحظ المخطط البياني للعلاقة السابقة).

مثال ٤

إذا كانت : $S = \{1, 2, 3, 4\}$ ، $S = \{1, 3, 5, 7\}$

فبيّن أي العلاقات الآتية تمثل دالة من S إلى S ، وإذا كانت دالة اذكر مداها :

١ $\{(1, 1), (2, 3), (3, 5), (4, 7)\}$


٢ $\{(1, 4), (2, 5), (3, 7), (4, 1)\}$

٣ $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 7)\}$

الحل

بيان ١ : $\{(1, 1), (2, 3), (3, 5), (4, 7)\}$

$\{(1, 4), (2, 5), (3, 7)\}$



حاول بنفسك ٢

إذا كانت : $S = \{1, 2, 4\}$ وكانت f علاقة على S حيث « f » $S \rightarrow S$ تعني

« f ضعيف» لكل $f \in S, S \ni f$ اكتب بيان f ومثله بمخطط ديكارتى.

ثانياً الدالة (التطبيق)



مثال تمهيدى

إذا كانت : $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ، $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

• f علاقة من S إلى S حيث « f » $S \rightarrow S$ تعني « f » $S \rightarrow S$ لكل $f \in S, S \ni f$ اكتب بيان f ومثلها بمخطط سهمي وآخر بياني.

الحل


بيان ١ : $\{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}$



مثال ٦

إذا كانت : $\sim = \{0, 1, 2, 3\}$ ، $\sim = \{5, 6, 7, 8, 9\}$

فبين أي المخططات البيانية الآتية يمثل دالة من \sim إلى \sim وإذا كانت دالة اذكر مداها :



الحل

- \sim ليست دالة لوجود نقطتين على الخط الرأسى المار بالعنصر $2 \in \sim$
- \sim دالة لأن كل خط رأسى تقع عليه نقطة واحدة فقط ، مدى الدالة \sim هو $\{5, 6, 8\}$
- \sim ليست دالة لعدم وجود أى نقطة على الخط الرأسى المار بالعنصر $1 \in \sim$

مثال ٧

إذا كانت : $\sim = \{0, 1, 2, 3\}$ ، $\sim = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

وكانت \sim علاقة من \sim إلى \sim حيث « \sim » تعنى « $\sim = \sim + 1$ » لكل $1 \in \sim$ ،
 $\sim \ni \sim$ فاكتب بيان \sim ومثلها بمخطط سهمى .

اذكر مع بيان السبب هل \sim تمثل دالة من \sim إلى \sim أم لا ، وإذا كانت دالة فأوجد مداها .


الحل

• بيان \sim : $\{ (0, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 5) \}$

• \sim تمثل دالة من \sim إلى \sim لأن كل عنصر من عناصر \sim

ارتبط بعنصر واحد فقط من عناصر \sim

مدى الدالة = $\{2, 3, 4, 5\}$




الحل

- \sim ليست دالة لأن العنصر $2 \in \sim$ ظهر كمسقط أول مرتين فى بيان العلاقة وذلك فى الزوجين المرتبين $(0, 2)$ ، $(1, 2)$
- \sim ليست دالة لأن العنصر $2 \in \sim$ لم يظهر كمسقط أول فى أى من الأزواج المرتبة التى تمثل العلاقة .
- \sim دالة لأن كل عنصر من عناصر \sim ظهر مرة واحدة فقط كمسقط أول فى أحد الأزواج المرتبة التى تمثل العلاقة ، مدى الدالة \sim هو $\{2, 3, 5\}$

مثال ٥

إذا كانت : $\sim = \{2, 3, 5, 7, 9\}$

فبين أي المخططات السهمية الآتية يمثل دالة من \sim إلى \sim ، وفى حالة الدالة اذكر المدى :



الحل

- \sim دالة لأن كل عنصر من عناصر \sim يخرج منه سهم واحد فقط إلى أحد عناصر \sim ، مدى الدالة \sim هو $\{2, 3, 5, 7, 9\}$
- \sim ليست دالة لأن العنصر $5 \in \sim$ لم يخرج منه أى سهم ، أو لأن العنصر $2 \in \sim$ يخرج منه سهمان .
- \sim ليست دالة لأن العنصر $7 \in \sim$ يخرج منه سهمان .

على العلاقة - الدالة (التطبيق)



📖 أسئلة كتاب الوزارة

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : د دالة من المجموعة س إلى المجموعة ص فإن : س تسمى

(١) مدى الدالة د . (ب) مجال الدالة د .

(ج) المجال المقابل للدالة د (د) قاعدة الدالة د

٢ إذا كانت : د دالة من المجموعة س إلى المجموعة ص فإن : ص تسمى

(i) مجال الدالة. (ب) المجال المقابل للدالة.

(ج) مدى الدالة. (د) قاعدة الدالة.


٣ إذا كان بيان العلاقة G هو $\{(3, 4), (5, 2), (3, 1)\}$

(القلوبية ١٧)


فإن ع. تمثل دالة مداها

$$\{0, 3, 1, 4, 2\} \text{ (ب)} \qquad \{4, 2, 1\} \text{ (د)}$$

$b(j) \quad \{0, 2\} (j)$


$$\{\text{ح، و، ا}\} \text{ (ب)} \qquad \{\text{ا}\} \text{ (i)}$$

$\{ح، ب\}$ (د) $\{ب، ا\}$ (ج)



..... علی سے مذاہا

$$\{1 - \epsilon, \epsilon, 1\} \text{ (ب)} \quad \{2 - \epsilon, 1 - \epsilon, \epsilon, 1\} \text{ (د)}$$
$$\{2-\epsilon, 1-\epsilon, 1\} \quad (2) \qquad \{2-\epsilon, 1-\epsilon, 0\} \quad (3)$$

٦ إذا كانت : \mathcal{C} دالة من S إلى S حيث $S = \{٢, ٤, ٥\}$ ، $S = \{٦, ٧\}$

وكانت $\mathcal{E} = \{(6, 0), (6, 1), (6, 2)\}$ فإن $\mathcal{F} = \dots$

٦ (ج) ١٢ (د) ٥ (ب) ٤ (ا)

13

مثال

إذا كانت: $s = \{ \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, 0, 1, 2, 3 \}$ وكانت g علاقة على s حيث « g »

تعني «١ معكوس ضربى للعدد» لكل ١ ٣ س، ٣ س

فاكتب بيان ع ومثلها بمخطط سهمي ، واذكر مع بيان السبب هل ع تمثل دالة أم لا.

الحل

• بیان $\mathcal{E} = \left\{ \left(2, \frac{1}{2} \right), (1, 1), \left(\frac{1}{2}, 2 \right), \left(\frac{1}{2}, 3 \right) \right\}$

$$\left\{ \left(r, \frac{1}{r} \right) \right.$$

• \mathbf{e}_i لا تمثل دالة لأن العنصر صفر $\exists s$ لم يخرج منه أي سهم في المخطط السهمي الممثل للدالة

٣ حاول بنفسك

إذا كانت : $\{1, 2, 3\} = \text{ص}$ ، $\{1, 4, 6, 9\} = \text{ع}$ وكانت ع علاقة

من سـ إلى صـ حيث «أ ع ب» تعني «أ = ب» لكل $\exists \text{ سـ} , \text{ بـ} \exists \text{ صـ}$

فاكتب بيان ع ومثلها بمخطط سهمي. اذكر مع بيان السبب هل ع تمثل دالة

من سـ إلى صـ أم لا ، وإذا كانت دالة فاذكر مداها.

$\{1, 3, 6\} = \{1, 3, 6\}$ (مجموعه‌های تهی و مجموعه‌های مساوی)

$$S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3)\}, \text{ etc.}$$

❖ $\mathcal{G} = \{(1, 1), (3, 1)\}$, \mathcal{G} is not a group.

1. $\mathcal{S} = \{(1, 0), (2, 3), (4, 4)\}$, \mathcal{S} is not a subalgebra.

סדרה **על הדימוי**

3.

تمارين 2

على العلاقة - الدالة (التطبيق)

اختبار
تفاعلي



أسئلة كتاب الوزارة

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : د دالة من المجموعة س إلى المجموعة ص فإن : س تسمى

(أ) مدى الدالة د

(ب) مجال الدالة د

(ج) المجال المقابل للدالة د

(د) قاعدة الدالة د

٢ إذا كانت : د دالة من المجموعة س إلى المجموعة ص فإن : ص تسمى

(أ) مجال الدالة.

(ب) المجال المقابل للدالة.

(ج) مدى الدالة.

(د) قاعدة الدالة.

٣ إذا كان بيان العلاقة ع هو $\{(3, 4), (5, 2), (3, 1)\}$

فإن ع تمثل دالة مداها

(أ) $\{4, 2, 1\}$


(ب) $\{5, 3, 1, 4, 2\}$

(ج) $\{5, 2\}$

(د) ط

(القليوبية ١٧)

س



٤ الشكل المقابل يمثل دالة على س مداها (القاهرة ١١)

(أ) $\{أ\}$

(ب) $\{أ, ب, ح\}$

(ج) $\{ب, أ\}$

(د) $\{ب, ح\}$

٥ الشكل المقابل يمثل دالة

على س مداها

(أ) $\{١, ٠, ١, ٢\}$

(ب) $\{١, ٠, ١, ٢\}$

(ج) $\{٢, ١, ٠\}$

(د) $\{٢, ١, ٠, ١\}$

٦ إذا كانت : ع دالة من س إلى ص حيث $س = \{٥, ٤, ٢\}$ ، $ص = \{٧, ٦\}$

وكانت ع $= \{(٦, ٥), (٦, ٢), (٦, ١)\}$ فإن : ٢ =

(أ) ٦


(ب) ١٢

(ج) ٥

(د) ٤


٢ أي من العلاقات التالية تمثل دالة من \sim إلى ص ؟

وإذا كانت العلاقة تمثل دالة ، فأوجد مدى الدالة :




٣ إذا كانت : $\sim = \{1, 2, 3, 4\}$

فأي من المخططات السهمية الآتية تعبر عن دالة على المجموعة \sim ؟



٤ بين أي المخططات البيانية الآتية يعبر عن دالة واذكر بيان كل دالة ومداهما :




٥ إذا كانت : $\sim = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$ ، $\text{ص} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$ فأي العلاقات الآتية

دالة من \sim إلى ص وأيها ليست دالة مع ذكر السبب ، وإذا كانت العلاقة دالة اذكر مداهما

١ $\{ (1, 2), (2, 1) \} = \text{ع}$

٢ $\{ (1, 2), (2, 1), (3, 4), (4, 3), (5, 6), (6, 5), (7, 8), (8, 7), (9, 10), (10, 9) \} = \text{ع}$

٣ $\{ (1, 2), (2, 1), (3, 4), (4, 3), (5, 6), (6, 5), (7, 8), (8, 7), (9, 10), (10, 9) \} = \text{ع}$



المخطط السهمي المقابل يمثل علاقة \hookrightarrow من $\text{ص} \leftarrow \text{س}$ حيث :

$$\text{ص} = \{1, 2, 4, 8\}, \text{س} = \{3, 1, 4\}$$

١ اكتب بيان \hookrightarrow

٢ هل \hookrightarrow دالة أم لا ؟ ولماذا ؟

٣ ما قيمة س إذا كان : $(\text{س}, 2) \in \hookrightarrow$ بيان \hookrightarrow ؟

(بني سويف ١٧، سوهاج ١٦)

٧ إذا كانت : $\text{س} = \{1, 2, 3\}$ ، $\text{ص} = \{1, 3, 6, 9, 12\}$ وكانت \hookrightarrow علاقة

من س إلى ص حيث « \hookrightarrow » تعني « $\frac{1}{3}$ » لكل $\text{س} \in \text{س}$ ، $\text{ص} \in \text{ص}$

اكتب بيان \hookrightarrow وبين أنها دالة واكتب مداها.

(مطروح ١٩، سوهاج ١٧، المنوفية ١٥)

٨ إذا كانت : $\text{س} = \{4, 6, 8, 10\}$ ، $\text{ص} = \{2, 3, 4, 5\}$ وكانت \hookrightarrow علاقة

من س إلى ص حيث « \hookrightarrow » تعني أن « $2 = \text{س}$ » لكل $\text{س} \in \text{س}$ ، $\text{ص} \in \text{ص}$

فاكتب بيان \hookrightarrow ومثلها بمخطط سهمي.

(أسوان ١١)

٩ إذا كانت : $\text{س} = \{1, 3, 4, 5\}$ ، $\text{ص} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

وكانت \hookrightarrow علاقة من س إلى ص حيث « \hookrightarrow » تعني « $7 = \text{س} + \text{ص}$ » لكل $\text{س} \in \text{س}$ ، $\text{ص} \in \text{ص}$

، $\text{ص} \in \text{ص}$ اكتب بيان \hookrightarrow ومثلها بمخطط سهمي وآخر بياني.

(بوسعيد ١٧، بني سويف ١٥)

١٠ إذا كانت : $\text{س} = \{0, 1, 4, 7\}$ ، $\text{ص} = \{1, 3, 5, 6\}$

وكانت \hookrightarrow علاقة من س إلى ص حيث « \hookrightarrow » تعني « $8 > \text{س} + \text{ص}$ » لكل $\text{س} \in \text{س}$ ، $\text{ص} \in \text{ص}$

، $\text{ص} \in \text{ص}$ اكتب بيان \hookrightarrow ، ومثلها بمخطط سهمي. هل \hookrightarrow دالة ؟ ولماذا ؟

(الإسكندرية ١٨)

١١ إذا كانت : $\text{س} = \{2, 4, 5, 7\}$ ، $\text{ص} = \{4, 5, 6, 7, 9\}$

وكانت \hookrightarrow علاقة من س إلى ص حيث « \hookrightarrow » تعني « $9 \geq \text{س}$ » لكل $\text{س} \in \text{س}$ ، $\text{ص} \in \text{ص}$

اكتب بيان \hookrightarrow ومثله بمخطط سهمي وآخر بياني.

٢٥



३



يَتِمُّ

٢٩

وكانت

٣٠

۲

२

٣١ إذا كانت : $\{ -1, 1, 2 \} = \mathcal{A}$ ، $\mathcal{B} = \{ x : x \in \mathcal{A} \}$ وكانت \mathcal{C} علاقة من \mathcal{A} إلى \mathcal{B} حيث « \mathcal{C} » تعني « $\mathcal{C} = \{ x : x \in \mathcal{A} \}$ » لكل $x \in \mathcal{A}$ ، $\mathcal{C} \ni \mathcal{B}$ أوجد بيان \mathcal{C} ومثله بمخطط سهمي.

٣٢ إذا كانت : $\mathcal{S} = \{ 1, 2, 3 \}$ ، $\mathcal{V} = \{ 3, 4, 5 \}$ بين مع ذكر السبب أيًا مما يأتي يمثل علاقة من \mathcal{S} إلى \mathcal{V} :

١ $\mathcal{L} = \{ (1, 3), (2, 3), (3, 5) \}$

٢ $\mathcal{M} = \{ (1, 4), (2, 3), (3, 3), (4, 2) \}$

٣٣ إذا كانت : $\mathcal{S} = \{ 1, 2, 3, 5 \}$ ، \mathcal{C} دالة على \mathcal{S} ، بيان $\mathcal{C} = \{ (1, 3), (2, 1), (3, 5) \}$ أوجد : ١ مدى الدالة.

(أسوان ٢٠٠٠، القليوبية ٢٠٠٠)

٢ القيمة العددية للمقدار : $\mathcal{A} + \mathcal{B}$

للمتفوقين

٣٤ إذا كانت : $\mathcal{S} = \{ -2, -1, 0, 1, 2 \}$ ، $\mathcal{V} = \{ 0, 4 \}$ وكانت \mathcal{C} علاقة من \mathcal{S} إلى \mathcal{V} بحيث « \mathcal{C} » تعني « $\mathcal{C} = \{ x : x \in \mathcal{S} \}$ » لكل $x \in \mathcal{S}$ ، $\mathcal{C} \ni \mathcal{V}$ فاكتب بيان \mathcal{C} وانكر هل العلاقة \mathcal{C} دالة من \mathcal{S} إلى \mathcal{V} أم لا مع بيان السبب.

٣٥ إذا كانت \mathcal{C} دالة من \mathcal{S} إلى \mathcal{V} حيث « \mathcal{C} » تعني « \mathcal{C} تقسم \mathcal{B} » لكل $\mathcal{B} \in \mathcal{S}$ ، $\mathcal{B} \in \mathcal{V}$ ، وإذا كان : $\mathcal{S} \cup \mathcal{V} = \{ 2, 3, 5, 11, 14, 9, 35 \}$ ، وكان : $\mathcal{S} = \{ 3 \}$ ، $\mathcal{V} = \{ 12 \}$ أوجد كلاً من : \mathcal{S} ، \mathcal{V} ثم اكتب بيان الدالة \mathcal{C} وأوجد مداها.

٣٦ إذا كانت \mathcal{C} دالة من \mathcal{S} إلى \mathcal{V} حيث « \mathcal{C} » تعني « \mathcal{C} مضاعف \mathcal{B} » لكل $\mathcal{B} \in \mathcal{S}$ ، $\mathcal{B} \in \mathcal{V}$ ، وإذا كان : $\mathcal{S} = \{ 2 \}$ ، $\mathcal{V} = \{ 4 \}$ ، $\mathcal{S} \cup \mathcal{V} = \{ 4, 8, 9, 27 \}$ أوجد كلاً من : \mathcal{S} ، \mathcal{V} ثم اكتب بيان الدالة \mathcal{C} وأوجد مداها.

تذكر أن

إذا كانت : د دالة من المجموعة س إلى المجموعة ص أي : د : س → ص فإن :

١ س تُسمى «مجال الدالة د»

٢ ص تُسمى «المجال المقابل للدالة د»

٣ مجموعة صور عناصر مجموعة المجال س بالدالة د تُسمى «مدى الدالة د»

وهي مجموعة جزئية من المجال المقابل ص

مثال ١

إذا كانت : س = {١، ٠، -١} ، ص = {٠، ١، -٢} ،

وكانت الدالة د : س → ص حيث د (س) = س^٢ - ١

فأوجد بيان الدالة د ومثلها بمخطط سهمي واكتب مداها.

الحل

∴ د (س) = س^٢ - ١


∴ د (١) = ١ - ١ = ٠ ، ∴ (١، ٠) بيان الدالة د

د (٠) = ٠ - ١ = -١ ، ∴ (٠، -١) بيان الدالة د

د (١) = ١ - ١ = ٠ ، ∴ (١، ٠) بيان الدالة د

∴ بيان د = {(١، ٠)، (٠، -١)، (١، ٠)}


، مدى الدالة د = {١، ٠}



ملاحظة

إذا كانت : د دالة من المجموعة س إلى نفسها أي : د : س → س

فنقول إن : «د دالة على س»



الدرس

3

التعبير الرمزي عن الدالة - دوال كثيرات الحدود

التعبير الرمزي عن الدالة

* يُرمز عادةً للدالة من المجموعة س إلى المجموعة ص بأحد الحروف مثل : د أو س أو ... وتكتب رياضياً :

د : س → ص وتقرأ د دالة من س إلى ص

أ، س : س → ص وتقرأ س دالة من س إلى ص وهكذا ...

* إذا كانت د : س → ص وكان الزوج المرتب (س، ص) ينتمي إلى بيان الدالة د

فإن العنصر ص يسمى صورة العنصر س بواسطة الدالة د

ونكتب ذلك بإحدى الصورتين :

د : س → ص وتقرأ د ترسم س إلى ص

أ، د : د (س) = ص وتقرأ د دالة حيث د (س) = ص

فمثلاً : إذا كانت د : س → ص بحيث : د : س → س^٢ فإن د : ٣ → ٩ ويمكن أن نكتب ذلك على الصورة : د (س) = س^٢ ومنها د (٣) = ٩

ملاحظة

الصورة الرياضية د (س) = س^٢ تُسمى بقاعدة الدالة د ، وتستخدم لإيجاد صورة كل عنصر من عناصر المجال بواسطة الدالة د

أى أن :

الدالة كثيرة الحدود هي دالة قاعدتها حد أو مقدار جبرى ويتوفر فيها الشرطان الآتيان :

- ١ كل من المجال والمجال المقابل للدالة هو مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R}
- ٢ قوة (أس) المتغير x فى أى حد من حدود قاعدتها هو عدد طبيعى.

وفيما يلى أمثلة لدوال كثيرات الحدود :

$$\begin{aligned} \bullet \text{ م : م (س) : م (س) } &= 2 - 2 - 1 + 1 \\ \bullet \text{ د : د (س) } &= 2 - 1 + 0 \\ \bullet \text{ م : م (س) } &= 2 - 1 + 0 \\ \bullet \text{ م : م (س) } &= 2 - 1 + 0 \end{aligned}$$

ملاحظة

إذا كان أى من المجال أو المجال المقابل للدالة ليس مجموعة الأعداد الحقيقية فإن الدالة ليست كثيرة حدود.

٤٤

فمثلاً : • د : د (س) = \sqrt{x} ليست دالة كثيرة حدود

لأن د (س) غير موجودة فى \mathbb{R} إذا كانت x تساوى عدداً سالباً.

فمثلاً : د (س) = $(1-x)$ لأن : $x \notin \mathbb{R}$

وبالتالى فإن مجال الدالة \mathbb{R} ليس مجموعة الأعداد الحقيقية.

• م : م (س) = $\frac{1}{x}$ ليست دالة كثيرة حدود

لأن م (س) غير موجودة فى \mathbb{R} إذا كانت $x = 0$ أى أن : $x \notin \mathbb{R}$

وبالتالى فإن مجال الدالة \mathbb{R} ليس مجموعة الأعداد الحقيقية.

ملاحظة

عند بحث ما إذا كانت دالة تمثل دالة كثيرة حدود أم لا فإننا لا نقوم بتبسيط قاعدتها.

٤٥

فمثلاً : الدالة د : د (س) = $(\frac{1}{x} + x)$ لا تمثل دالة كثيرة حدود لأن : د (س) $\notin \mathbb{R}$

بينما الدالة د : د (س) = $x^2 + 1$ تمثل دالة كثيرة حدود.

ولأن : د (س) = $(\frac{1}{x} + x)$ لجميع الأعداد الحقيقية ما عدا الصفر.

مثال ٢

إذا كانت د : د ← ط حيث ط هي مجموعة الأعداد الطبيعية ، وكانت : د (س) = $x + 1$ فأوجد : د (٠) ، د (١) ، د (٢) ، د (٣) ، د (٤) ثم ارسم جزءاً من الشبكة الترتيبية للحصول الديكارتي ط × ط ومثل عليها خمسة عناصر من هذه الدالة. ما هو مدى د ؟

الحل

د (س) = $x + 1$ لكل س $\in \mathbb{P}$ (تعنى أن : صورة أى عدد طبيعى بالدالة د هو العدد ١ + ٠ ، د (٠) = $1 + 0 = 1$ ، د (١) = $1 + 1 = 2$ ، د (٢) = $1 + 2 = 3$ ، د (٣) = $1 + 3 = 4$ ، د (٤) = $1 + 4 = 5$ ،


∴ الأزواج المرتبة (٠ ، ١) ، (١ ، ٢) ، (٢ ، ٣) ، (٣ ، ٤) ، (٤ ، ٥) ،

هي خمسة عناصر من عناصر الدالة د

• مدى د هو جميع الأعداد الطبيعية عدا الصفر

(لأنه لا يوجد عدد طبيعى إذا أُضيف إلى ١ يكون الناتج صفراً)

أى أن : مدى د = ط - {٠}



حاول بنفسك

إذا كانت : س = {٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨} ، ص = {١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦} وكانت الدالة د : س ← ص حيث د (س) = $\frac{1}{x}$ فاكتب بيان د ومثلها بمخطط بياني وأوجد مداها.

دوال كثيرات الحدود

تعريف

الدالة د : د ← ع ، د (س) = $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ حيث $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$ ، $n \in \mathbb{N}$ ، $a_n \neq 0$ ، \exists ط تسمى دالة كثيرة حدود.

٥٠

٥. د (س) = س^٤ + س^٢ - س^٤ + س^٢ = ٢س^٢ = ٢س^٣

∴ د دالة من الدرجة الثالثة.

حاول بنفسك ٢

أى من الدوال المعروفة بالقواعد الآتية تمثل دالة كثيرة حدود وعين درجتها إذا كانت كثيرة حدود :

| | |
|--|----------------------------------|
| ١. د (س) = س(س - ٢) | ٢. د (س) = س(٥ + $\frac{٢}{س}$) |
| ٣. د (س) = س ^٢ - $\sqrt{٢}$ + ١ | ٤. د (س) = (س - ٢) - (س - ٤) |

مثال ٤

إذا كانت د : د (س) = س^٢ - ٢س + ٥

١ أوجد : د (١) ، د (٠) ، د (٢-) ، د ($\frac{١}{٢}$) ، د ($\sqrt{٥}$)

٢ أثبت أن : د (٢ + $\sqrt{٢}$) = ٢ + د (٢ - $\sqrt{٢}$)

الحل

١. د (١) = (١) = ١ - ٢(١) + ٥ = ٤

وبالمثل : د (٠) = ٥ ، د (٢-) = ١٣ ، د ($\frac{١}{٢}$) = $\frac{١}{٤}$

، د ($\sqrt{٥}$) = $\sqrt{٥} - ٢\sqrt{٥} + ٥$

٢. ∴ د (٢ + $\sqrt{٢}$) = (٢ + $\sqrt{٢}$)^٢ - ٢(٢ + $\sqrt{٢}$) + ٥

(١) $١٢ = ٥ + ٢ - ٢\sqrt{٢} - ٢\sqrt{٢} + ٤ + ١ + ٨ =$

، د (٢ - $\sqrt{٢}$) = (٢ - $\sqrt{٢}$)^٢ - ٢(٢ - $\sqrt{٢}$) + ٥

(٢) $٦ = ٥ + ٢ - ٢\sqrt{٢} + ٢ - ٢\sqrt{٢} + ٤ + ١ =$

من (١) ، (٢) : ∴ د (٢ + $\sqrt{٢}$) = ٢ + د (٢ - $\sqrt{٢}$)

درجة الدالة كثيرة الحدود

درجة الدالة كثيرة الحدود هي أكبر قوة للمتغير في قاعدة الدالة.

فمثلاً : • الدالة د : د (س) = ٣س - $\frac{١}{٢}$ من الدرجة الأولى (دالة خطية)

• الدالة د : د (س) = ٢س^٢ - ٣س + ٤ من الدرجة الثانية (دالة تربيعية)

• الدالة د : د (س) = ٣س^٢ - ٥س + ٤ من الدرجة الثالثة (دالة تكعيبية)

ملاحظة ١١

الدالة د : د (س) = ١ حيث $١ \in \mathbb{R}$ - {٠} دالة كثيرة حدود من الدرجة صفر (دالة ثابتة)

مثل د : د (س) = ٣

وفى حالة ١ = ٠ أى عندما د (س) = ٠ فإن الدالة د ليس لها درجة.

٢٢

مثال ٢

إذا كانت د : د (س) = ٣س - ٥

٢. د (س) = ٣س - ٥

٤. د (س) = ٣س^٢ + ٢(س + ٢)

٥. د (س) = (س^٢ + س) - (س^٢ - ٢س)

الحل

١. د دالة من الدرجة الأولى.

٣. د دالة من الدرجة الثالثة.

٤. ∴ د (س) = (س^٢ + س + ٤) - (س^٢ - ٢س)

= ٤س^٢ + ٣س + ٤

∴ د دالة من الدرجة الرابعة.

لاحظ أنه

عند بحث درجة الدالة يجب تبسيط قاعدتها إلى أبسط صورة قبل تعيين درجتها.

مثال ٥

إذا كانت : د (س) = $2س + ٢$ ، س (س) = $س + ٢$

وكان : د (٢) + س (٤) = ٣٠ فأوجد : د (٢) - س (٢)

الحل

$$\therefore \text{د (٢)} = ٢ \times ٢ + ٢ = ٤ + ٢ = ٦ ، \text{س (٤)} = ٤ + ٢ = ٦$$

$$\therefore \text{د (٢)} + \text{س (٤)} = ٦ + ٦ = ١٢$$

$$\therefore ٣٠ = \text{د (٢)} + \text{س (٤)} = ١٢ + ٢ \times \text{س (٢)}$$

$$\therefore ١٨ = ٢ \times \text{س (٢)}$$

$$\therefore \text{س (٢)} = \frac{١٨}{٢} = ٩$$

$$\therefore \text{د (٢)} = ٢ \times ٩ + ٢ = ١٨ + ٢ = ٢٠$$

$$\therefore \text{د (٢)} - \text{س (٢)} = ٢٠ - ٩ = ١١$$

حاول بنفسك ٣

إذا كانت : د (س) = $٢س + ٥$ ، س (س) = $س - ٦$

فأثبت أن : د (٢) + س (٣) = صفر

١. اكتب دالة د (س) و س (س) في الجدول التالي

٢. اكتب دالة د (س) و س (س) في الجدول التالي

٣. اكتب دالة د (س) و س (س) في الجدول التالي

$$\{١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠\}$$

٤. اكتب دالة د (س) و س (س) في الجدول التالي

٥. اكتب دالة د (س) و س (س) في الجدول التالي

تمارين 3

على التعبير الرمزي عن الدالة - دوال كثيرات الحدود

اختبار
تفاعلي



أسئلة كتاب الوزارة

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ مجموعة صور عناصر مجال الدالة تسمى (مطروح ١٦٤، دمياط ١٥)

(أ) القاعدة. (ب) المجال. (ج) المدى. (د) المجال المقابل.

٢ إذا كانت الدالة د : $s \rightarrow s^2$ فإن مدى الدالة د (القاهرة ١٧)

(أ) $s \times s$ (ب) s (ج) $s \times s$ (د) s

٣ الدالة د حيث د (س) = $s^2 - 2s + 7$

كثيرة حدود من الدرجة (ج. سيناء ١٩، السويست ١٥)

(أ) الأولى. (ب) الثانية. (ج) الثالثة. (د) الرابعة.

٤ الدالة د : د (س) = $s^2 - 2s + 2$ هي دالة كثيرة حدود من الدرجة (أ) الأولى. (ب) الثانية. (ج) الثالثة. (د) الرابعة.

٥ الدالة د : د (س) = $s^2 - (s^2 - 3s)$ كثيرة حدود من

الدرجة (بورسعيد ١٦)

(أ) الأولى. (ب) الثانية. (ج) الثالثة. (د) الرابعة.

٦ الدالة د : د (س) = $s^2 (3 - s)$

هي دالة كثيرة حدود من الدرجة (أسوان ١٣)

(أ) الأولى. (ب) الثانية. (ج) الثالثة. (د) الرابعة.

٧ الدالة د : د (س) = $(s - 5)^2$ هي دالة كثيرة حدود من الدرجة (قنا ١١)

(أ) الأولى. (ب) الثانية. (ج) الثالثة. (د) الرابعة.

٨ إذا كانت د : د (س) = $s^2 - s + 3$ فإن د (٢) =

(أ) ٢- (ب) ١- (ج) ٥ (د) ٩

٩ إذا كانت د : د (س) = $s^2 - 2s + 2$ فإن د (٢) = (الدقهلية ١١)

(أ) ٤ (ب) ٢ (ج) ٦ (د) صفر

١٠ إذا كانت الدالة d : $v \leftarrow s$ حيث $d(s) = s^2$

فإن : $d(2) + d(-2) = \dots$

- (أ) صفر (ب) ٤ (ج) ٨ (د) ٨-

١١ إذا كانت : $d(s) = s + ٨$ ، $d(2) = \text{صفر}$

فإن : $d = \dots$

- (أ) ٨ (ب) ٦ (ج) ٤ (د) ٤-

١٢ إذا كانت : $d(s) = s - ٥$ وكان : $\frac{1}{p} d(4) = ٣$ فإن : $٩ = \dots$

- (أ) ٢ (ب) ٨ (ج) ١١ (د) ١٦

١٣ إذا كان : $d : c \leftarrow c$ حيث $d(s) = s^{٢-} + ٣$ وكان : $d(2) = ١١$

فإن : $d = \dots$

- (أ) ٥ (ب) ٣ (ج) ٢ (د) ٢-

١٤ إذا كان : $(٠, ١) \ni$ بيان الدالة d حيث $d(s) = s + ٢$ فإن : $m = \dots$

- (أ) صفر (ب) ١- (ج) ٢ (د) ٢-

١٥ إذا كان : $(٣, v) \ni$ بيان الدالة d حيث $d(s) = s + ٢$ فإن : $v = \dots$

- (أ) ٥ (ب) ٣ (ج) ٢ (د) ١

١٦ إذا كان : $(4, 4) \ni$ بيان الدالة d حيث $d(s) = ٢ + s - ٣$ فإن : $4 = \dots$

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٣- (د) ٢-

١٧ إذا كانت : $d(s) = (٣ + s) - ٣$ فإن : $d(7) = \dots$

(الدقهلية ١٩)

- (أ) ٤ (ب) ١ (ج) ٧ (د) ١٠

١٨ إذا كانت : $s = \{٢, ٤, ٦\}$ وكان $v = ٤$ وكانت الدالة $d : s \leftarrow v$

، $d(s) = s^2 - ١$ فإن : v يمكن أن تكون

- (أ) $\{١٣, ٧, ٣\}$
 (ب) $\{٤٥, ٢٥, ١٥, ٣\}$
 (ج) $\{٣٥, ١٥, ٣\}$
 (د) $\{٣٥, ٢٥, ١٥, ٣\}$

١٩ إذا كانت : د (س) = $س^2 + ٢س - ٣$ فإن مجموعة قيم س الممكنة التي

(القطعية ١٦)

تجعل د دالة من الدرجة الثانية هي

(أ) {٢، ٣} (ب) {١، -١} (ج) {٠، ١، ٢} (د) {١، ٢}

٢ أى من الدوال الآتية تمثل كثيرة حدود :

٢ د : د (س) = ٣

١ د : د (س) = $س^2 - ٥$

٤ د : د (س) = $س^2 + ٢س + ٣$

٣ د : د (س) = $س + \frac{١}{س}$

٥ د : د (س) = $س^2 + \sqrt{س} + ٨$

٦ د : د (س) = $س(س + \frac{١}{س} - ٢)$

٧ د : د (س) = $\sqrt{س} + ٨$

٨ د : د (س) = $س(س^2 + ٢س - ٤)$

٣ إذا كانت د : ح ← ح ، اذكر درجة د ثم أوجد د (٢-) ، د (٠) ، د ($\frac{١}{٢}$) حيث :

٢ د (س) = $س^2 - ٤$

١ د (س) = $٣ - ٢س$

٤ إذا كانت د : د (س) = $س^2 - ٥س + ٢$ أثبت أن : د (٢) = $\frac{١}{٢}$ (الأقصى ١٤)

٥ إذا كانت : د (س) = $س^2 - ١$ أثبت أن : د (٢) - ٣ = د (١) = صفر (الغريبة ١١)

٦ إذا كانت : د (س) = $س^2 - ٣س$ ، س (س) = $٣ - س$

١ أوجد : د ($\sqrt{٢}$) + س ($\sqrt{٢}$) أثبت أن : د (٣) = س (٣) = صفر

(بوسعيد ٢٠، قنا ١٩، الإسكندرية ١٨، المنيا ١٧)

٧ إذا كانت د : د (س) = $س^2 - ٢س - ٥$ أثبت أن : د ($\sqrt{٦} + ١$) = د ($\sqrt{٦} - ١$) = ٠

٨ الدالة د : ح ← ح حيث د (س) = ١س + ٢س + ٣س + ٤س = ١٠ ، ٥ ، ٢ = صفر ، ١ عدد حقيقى
لا يساوى الصفر

١ أوجد : درجة الدالة د

٢ إذا كانت د (٣) = ١١ فأوجد قيمة : ب

(المثني ١٨)

٩ إذا كانت : د (س) = ٥س - ٣ ، س (س) = ٢س - ٢

وكان د (١) + س (٣) = ٧ - فأوجد : د (٣) + س (١)

١٠ إذا كانت د : ص ← ط حيث د (س) = (٣ - س) ، س : ص ← ط

حيث س (س) = ٢ - س - ٣ فأوجد : قيمة س التى تجعل د (س) = س (س)

(٣ ، ٤)

١١ إذا كانت د دالة على س حيث س = {٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦}

وكانت د (٣) = ٣ ، د (٤) = ٥ ، د (٥) = ٥ ، د (٦) = ٥

١ مثل د بمخطط سهمى.

٢ اكتب بيان د وانكر مداها.

(الإسماعيلية ١٥)

١٢ إذا كانت : س = {٠ ، ١ ، ٢} ، ص = {١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧}

وكانت د : س ← ص حيث د (س) = ٥ - س

١ أوجد : مدى الدالة د

٢ ارسم مخططاً بيانياً للدالة د

(الوادي الجديد ١٧)

١٣ إذا كانت الدالة ت : ط ← ط حيث ط مجموعة الأعداد الطبيعية

ت : س ← ٢س + ٣

١ أوجد : ت (٠) ، ت (١) ، ت (٢) ، ت (٣) ، ت (٤) ، ت (٥)

٢ مثل خمسة عناصر من عناصر ت على جزء من الشبكة التربيعية للحصول الديكارتي ط × ط

٣ ما هو مدى ت ؟

١٤ إذا كانت د : ص ← ص ، ص مجموعة الأعداد الصحيحة

$$د (س) = س^2 - ٢س - ٣$$

١ أوجد : د (٤) ، د (٣) ، د (٢) ، د (١) ، د (٠) ، د (١-) ، د (٢-)

٢ مثل سبعة عناصر من عناصر د على الشبكة التربيعية للحصول الديكارتى ص × ص

٣ إذا كانت د : د (س) = ٥ فأوجد قيمة : س « ٤ ، ٣ »

١٥ إذا كان د : د (س) = ٤س + ب وكان : د (٢) = ب

فأوجد قيمة المقدار : ٤س + ٥ « ٥ » (الشرقية ١٩)

١٦ إذا كان بيان الدالة د = { (١١ ، ٥) ، (٩ ، ٤) ، (٧ ، ٣) ، (٥ ، ٢) ، (٣ ، ١) }

١ اكتب مجال الدالة د ٢ اكتب مدى الدالة د

٣ اكتب قاعدة للدالة د (الأقصر ١٩ ، شه. سيناء ١٧ ، دمياط ١٦)

للمتفوقين



١٧ إذا كانت د : د (س) = ٢س^٢ + ٢س + ح

وكانت د : د (س) = ٠ عندما س ∈ { ٢ ، ٠ }

« ٠ ، ٦ »

فأوجد قيمة كل من : ب ، ح

اسم يعلى التفوق



الآن بالمكتبات

EL-MOASSER
GUIDE


فى اللغة الإنجليزية
للمرحلة الإعدادية

التمثيل البياني للدالة الثابتة

الدالة الثابتة د : د (س) = ب (حيث $ب \in \mathbb{R}$) يمثلها بيانياً خط مستقيم يوازي محور السينات ويمر بالنقطة (0, ب) ويكون هذا الخط :


- أعلى محور السينات إذا كان : $ب > 0$
- أسفل محور السينات إذا كان : $ب < 0$
- منطبق على محور السينات إذا كان : $ب = 0$

* والأمثلة التالية توضح ذلك :



لاحظ أنه

إذا كان معامل س كسراً يفضل أن نختار أعداداً تقبل القسمة على مقام هذا الكسر لسهولة التمثيل.



$$2 : س (س) = -\frac{1}{2} س$$

| | | | |
|-----------|---|----|----|
| س | 0 | 2 | -4 |
| د = س (س) | 0 | -1 | -2 |

من الشكل المقابل لاحظ أن :
المستقيم ل يمر بنقطة الأصل (0, 0)

وبصفة عامة

الدالة د : د ← س حيث د (س) = س ، $د \in \mathbb{R}$
يمثلها بيانياً مستقيم يمر بنقطة الأصل (0, 0)

حاول بنفسك 1

مثل بيانياً كلا من الدالتين الخطيتين الآتيتين :

$$1 : د : د (س) = 3 - س$$

$$2 : د : د (س) = 2 - س$$

ثانياً الدالة الثابتة

تعريف

الدالة د : د ← س حيث د (س) = ب ، $ب \in \mathbb{R}$ تسمى دالة ثابتة.
فمثلاً :

$$د : د (س) = 5 \text{ دالة ثابتة حيث :}$$

$$د (1) = 5 ، د (0) = 5 ، د (-2) = 5 ، \dots \text{ وهكذا}$$

حاول بنفسك 2

مثل بيانياً د : د (س) = 1 ثم أوجد ما يأتي :

- | | |
|------------------|----------|
| 1 درجة الدالة د | 2 د (5) |
| 3 د (2) + د (-2) | 4 د (-س) |

الحل

ثالثاً الدالة التربيعية

تعريف

الدالة د : ح ← ح حيث د (س) = $اس^2 + بس + ج$ ، $ا ، ب ، ج$ أعداد حقيقية ، $ا \neq 0$. تُسمى دالة تربيعية (وهي كثيرة حدود من الدرجة الثانية).

* أمثلة لدوال تربيعية :

$$\begin{aligned} \text{د : ح} \leftarrow \text{ح} \leftarrow \text{ح} \leftarrow \text{د (س)} = \text{س}^2 , \text{د : ح} \leftarrow \text{ح} \leftarrow \text{د (س)} = \text{س}^2 - 2 \\ \text{د : ح} \leftarrow \text{ح} \leftarrow \text{د (س)} = \text{س}^2 - 3\text{س} + 7 , \text{د : ح} \leftarrow \text{ح} \leftarrow \text{د (س)} = \text{س}^2 - 6\text{س} + 7 \end{aligned}$$

لاحظ أنه

في كل من الدوال السابقة أكبر قوة للمتغير س هي ٢ لذلك فإن كلاً منها دالة من الدرجة الثانية.

التمثيل البياني للدالة التربيعية

نعلم أن مجال الدالة التربيعية هو مجموعة الأعداد الحقيقية وهي مجموعة غير منتهية ، ولذلك لتمثيل هذه الدالة بيانياً فإننا نمثلها على فترة معينة عن طريق تعيين بعض الأزواج المرتبة التي تنتمي إلى بيان الدالة ثم نرسم منحنى ممهداً يمر بالنقط التي تمثلها . والامثلة التالية توضح ذلك.

مثال ٢


مثل بيانياً كلاً من الدالتين التربيعيتين الآتيتين :

$$١ \text{ د : د (س)} = \text{س}^2 \text{ متخذاً س} \in [٢, -٢]$$

$$٢ \text{ د : د (س)} = -\text{س}^2 \text{ متخذاً س} \in [٢, -٢]$$

$$٢ \text{ د (س)} = -\text{س}^2$$

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| س | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ |
| د (س) | ٩ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٩ |




لاحظ أن : معامل س > ٠

- النقطة (٠ ، ٠) هي نقطة رأس المنحنى وهي نقطة قيمة عظمى لأن المنحنى يقع بتمامه أسفلها .
- القيمة العظمى للدالة هي صفر وهي الإحداثي الصادي لنقطة رأس المنحنى .
- المنحنى متماثل بالنسبة لمحور الصادات أي أن محور الصادات هو محور تماثل المنحنى ومعادلته هي س = ٠ .

$$١ \text{ د (س)} = \text{س}^2$$

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| س | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ |
| د (س) | ٩ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٩ |



لاحظ أن : معامل س < ٠

- النقطة (٠ ، ٠) هي نقطة رأس المنحنى وهي نقطة قيمة صغرى لأن المنحنى يقع بتمامه فوقها .
- القيمة الصغرى للدالة هي صفر وهي الإحداثي الصادي لنقطة رأس المنحنى .
- المنحنى متماثل بالنسبة لمحور الصادات أي أن محور الصادات هو محور تماثل المنحنى ومعادلته هي س = ٠ .

وبصفة عامة

الدالة التربيعية د : د (س) = $s^2 + 2s - 3$ حيث $s \in]-3, 5[$ ، ح أعداد حقيقية

، $s \neq 0$ صفر يكون لها الخصائص الآتية :

١ نقطة رأس المنحنى : د $(-\frac{1}{2}, \frac{17}{4})$

٢ إذا كان $s > 0$ (معامل s^2) موجباً فإن منحنى الدالة يكون مفتوحاً لأعلى

وفي هذه الحالة يكون للدالة قيمة صغرى تساوى د $(-\frac{1}{2}, \frac{17}{4})$

٣ إذا كان $s < 0$ (معامل s^2) سالباً فإن منحنى الدالة يكون مفتوحاً لأسفل

وفي هذه الحالة يكون للدالة قيمة عظمى تساوى د $(-\frac{1}{2}, \frac{17}{4})$

٤ منحنى الدالة يكون متماثلاً حول الخط الرأسى المار بنقطة رأس المنحنى

وتكون معادلة هذا الخط : $s = -\frac{1}{2}$ ويسمى محور تماثل منحنى الدالة.

مثال ٣

ارسم الشكل البياني للدالة د : د (س) = $s^2 - 2s - 3$ متخذاً $s \in]-3, 5[$

ومن الرسم أوجد : ١ نقطة رأس المنحنى.

٢ معادلة محور التماثل.

٣ القيمة العظمى أو الصغرى للدالة.

الحل

د : د (س) = $s^2 - 2s - 3$


| س | ٢- | ١- | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|-------|----|----|----|----|----|---|---|
| د (س) | ٥ | ٠ | ٣- | ٤- | ٣- | ٠ | ٥ |

هذه الرسم نجد أنه :

١ نقطة رأس المنحنى : (١ ، -٤)

٢ معادلة محور التماثل : $s = 1$

٣ «وهو مستقيم يوازي محور الصادات ويمر بنقطة رأس المنحنى»
القيمة الصغرى للدالة = -٤



ملاحظة

يمكن تكوين الجدول المستخدم فى رسم الدالة السابقة باستخدام الآلة الحاسبة العلمية التى تدعم نظام (Table) على النحو التالى :

١ تهيئة الحاسبة على نظام (Table) ، وذلك بالضغط على مفتاح MODE ثم اختيار نظام (Table)

٢ إدخال البيانات : نكتب قاعدة الدالة السابقة ، وذلك بالضغط على المفاتيح التالية :

أبدأ \rightarrow ALPHA \rightarrow 1 \rightarrow X² \rightarrow - \rightarrow 2 \rightarrow ALPHA \rightarrow 1 \rightarrow - \rightarrow 3

٣ نضغط على المفتاح \rightarrow ثم فى بداية الفترة START نكتب 2 \rightarrow ثم نضغط \rightarrow

٤ نكتب فى نهاية الفترة END الرقم 4 \rightarrow ثم نضغط \rightarrow

٥ نحدد بعد ذلك طول الفترة STEP 1 ونختار الرقم 1 \rightarrow ثم نضغط \rightarrow

وبذلك يتم إنشاء الجدول فى الحاسبة ، ويمكن التنقل باستخدام

المفتاح \rightarrow إلى أعلى وإلى أسفل.

| X | F(X) |
|---|------|
| 1 | -2 |
| 2 | -1 |
| 3 | 0 |
| 4 | -3 |
| 5 | -4 |
| 6 | -3 |
| 7 | 0 |

• وللخروج من البرنامج : نضغط \rightarrow ثم 1 \rightarrow

مثال ٤

ارسم الشكل البياني للدالة د : د (س) = $s^2 + 3s + 2$ متخذاً $s \in]-4, 1[$ ، ثم أوجد :


١ القيمة العظمى أو الصغرى للدالة.

٢ معادلة محور التماثل.

الحل

د : د (س) = $s^2 + 3s + 2$


| س | ١- | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|-------|----|---|---|---|---|----|
| د (س) | ٢- | ٢ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢- |



* هذه نقطة رأس المنحنى نجد أن :

١ القيمة العظمى للدالة $= \frac{1}{4}$

٢ معادلة محور التماثل هي : $س = \frac{1}{4}$



وعند تمثيل الأزواج المرتبة نلاحظ أن

نقطة رأس المنحنى ليست ضمن

هذه النقط مما يجعل رسم الجزء

المنقط بالشكل المقابل غير دقيق

، وبالتالي يصعب دراسة المنحنى

، ولذا يجب إيجاد نقطة رأس

المنحنى جبرياً كما يلي :

إيجاد نقطة رأس المنحنى

عند رأس منحنى الدالة التربيعية يكون :

* الإحداثى السيني $= \frac{-b}{2a}$

* الإحداثى الصادي $= d\left(\frac{-b}{2a}\right)$

حيث a معامل $س$ ، b معامل $س^2$

∴ $س$ عند رأس المنحنى $= \frac{-b}{2a} = \frac{-2}{2 \times (-1)} = \frac{2}{2} = 1$

∴ $ص$ $= d\left(1\right) = 2 + \frac{9}{4} + \frac{9}{4} = \frac{1}{4}$

∴ رأس المنحنى عند النقطة $\left(1, \frac{1}{4}\right)$

حاول بنفسك

ارسم منحنى الدالة $د : (س) = س^2 + 2س - 3$ على الفترة $[-4, 2]$

ومن الرسم أوجد :

١ القيمة العظمى أو الصغرى للدالة.

٢ معادلة محور التماثل.


مثال ٥

في الشكل المقابل :

أ $س$ ح و مربع

، المنحنى يمثل الدالة $د : (س) = س^2$


أوجد إحداثيات النقط : أ ، ب ، ح



الحل

نرسم قطر المربع أ ح ليتقاطع مع القطر ب و في نقطة م

∴ قطرا المربع متساويان في الطول وينصف كل منهما الآخر



وبفرض أن : $m = 2$

$$(J^2, \cdot) \vdash, (J, J-) \vdash, (J, J) \vdash \therefore$$

، ∴ (ل، ل) ينتمي لبيان الدالة د : د (س) = س^٢

، وبالتعويض في قاعدة الدالة :

$$\cdot = J - \frac{1}{2}J \therefore$$


$${}^2J = J \therefore$$

$$\therefore J = \cdot \text{ (مرفوض)}$$


$$\cdot = (1 - J) J \therefore$$

أ، $l - 1 = 0$ ومنها $l = 1$

$$(1-) \supset, (2, \cdot) \supset, (1, 1) \uparrow \therefore$$




١- = -١ ٢- = -٣ ٣- = -١ ٤- = -١ ٥- = -١ ٦- = -١ ٧- = -١ ٨- = -١ ٩- = -١ ١٠- = -١

 $\textcircled{2} - 2$


③-1

① ۱۳۴۰ هجری قمری.

③ - 1



③





تمارين 4

على بعض دوال كثيرات الحدود

أسئلة كتاب الوزارة

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : د (س) = ٧ فإن : د (٣-) = (الجيزة ١٧)

٧ (أ) ٧- (ب) ٢١ (ج) ٢١- (د)

٢ إذا كانت : د (س) = ٢ فإن : د (٢٢) =

٢ (أ) ٢ (ب) ٢ (ج) ٢ (د) ٢

٣ إذا كانت : د (س) = ٢ فإن : د (٢) - د (١) = (الدقهلية ١٣)

٢ (أ) ٢ (ب) ٢ (ج) صفر (د) ١٠

٤ إذا كانت : د (س) = ٥ فإن : د (٥) / د (١٠) =

٥ (أ) ٥ (ب) ١/٥ (ج) ١ (د) ١٠

٥ إذا كانت د دالة حيث : د ← ح وكانت د (س) = ٣

فإن : د (٦) / د (صفر) = (الدقهلية ١٧)

٦ (أ) ٦ (ب) ١ (ج) ٣ (د) غير معرفة.

٦ إذا كانت : د (س) = ٣ فإن : د (٣) / د (٢) = (الإسكندرية ٠٥)

٢/٣ (أ) ٢/٣ (ب) ٢/٣ (ج) ١ (د) ٣٢/٣٣

٧ إذا كانت : د (٢ س) = ٤ فإن : د (- س) = (الدقهلية ٠٩)

٢- (أ) ٤- (ب) ٤ (ج) ٢ (د) ٢

٨ الدالة : د (س) = ٣ س يمثلها بيانياً خط مستقيم يمر بالنقطة (بنى سويف ١٧)

(٣، ٣) (أ) (٠، ٢) (ب) (٠، ٠) (ج) (٣، ٠) (د)

١٦ إذا كانت : د (س) = s^2 ، $s \in [-2, 2]$

(الذيلية ٠٨)

فإن : د (س) \exists

(١) $[4, 0]$ (ب) $[4, 0]$ (ج) $[4, 0]$ (د) $[-4, 4]$

٢ أكمل ما يأتي :

١ الدالة د : $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث د (س) = ٥ يمثلها خط مستقيم يوازي

ويقطع محور الصادات في النقطة

٢ الدالة الخطية المعرفة بالقاعدة د (س) = $2s - 1$ يمثلها بياناً خط مستقيم

يقطع محور الصادات في النقطة

٣ الدالة الخطية المعرفة بالقاعدة د (س) = $3s + 6$ يمثلها بياناً خط مستقيم

يقطع محور السينات في النقطة

٤ إذا كانت النقطة (٣ ، ٩) تقع على الخط المستقيم الممثل للدالة د : $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

(البجيرة ١١)

حيث د (س) = $4s - 5$ فإن : ٩ =

٥ إذا كان المستقيم الممثل للدالة د : $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث د (س) = $5s - 9$ يقطع محور

الصادات في النقطة (٢ ، ب) فإن : ٩ = ، ب =

٦ معادلة خط التماثل لمنحنى الدالة د : د (س) = s^2 هي (سوهاج ٠٩)

٧ إذا كان منحنى الدالة د حيث د (س) = $s^2 + 1$ يمر بالنقطة (٢ ، ٥)

(دمياط ١١)

فإن : ح =

٨ إذا كانت : د (س) = $2s - 1$ تنتمي لمنحنى الدالة د : د (س) = $s^2 + 1$

(ج. سيناء ٠٩)

فإن : ص =

٣ مثل بياناً كلاً من الدوال الآتية حيث $s \in \mathbb{R}$:

٢ د : د (س) = $4s - 1$

١ د : د (س) = ٥

٤ د : د (س) = $\frac{1}{2}s$

٣ د : د (س) = صفر

مثل بيانياً كلاً من الدوال الخطية الآتية ، وأوجد نقطتي تقاطع المستقيم الممثل لكل منها مع

محورى الإحداثيات حيث $s \in \mathbb{R}$:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| ١ د : د (س) = س | ٢ د : د (س) = - س |
| ٣ د : د (س) = ٣ س | ٤ د : د (س) = - ٢ س |
| ٥ د : د (س) = ٢ + س | ٦ د : د (س) = - ٢ س |
| ٧ د : د (س) = ٣ س - ١ | ٨ د : د (س) = - ٢ س + ٣ |
| ٩ د : د (س) = $\frac{1}{4}$ س | ١٠ د : د (س) = - ٥ س - $\frac{1}{4}$ |

مثل بيانياً كلاً من الدوال الآتية ، ومن الرسم استنتج إحداثي رأس المنحنى ، ومعادلة محور

التماثل ، والقيمة العظمى أو الصغرى للدالة حيث $s \in \mathbb{R}$:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ١ د : د (س) = ٢ س ^٢ متخذاً $s \in [-٢, ٢]$ | |
| ٢ د : د (س) = ١ + ٢ س متخذاً $s \in [-٣, ٣]$ | (الفيوم ١٦، بني سويف ١٤) |
| ٣ د : د (س) = ٢ س ^٢ - ٢ متخذاً $s \in [-٣, ٣]$ | (دمياط ٢٠، بوسعيد ١٨، البحيرة ١٧) |
| ٤ د : د (س) = ٢ س ^٢ - ٢ متخذاً $s \in [-٣, ٣]$ | (سوهاج ٢٠، الغربية ١٩، الإسكندرية ١٨) |
| ٥ د : د (س) = ٢ س ^٢ - ٢ س متخذاً $s \in [-٢, ٤]$ | (كفر الشيخ ٢٠، القاهرة ١٨، قنا ١١) |
| ٦ د : د (س) = ٢ س ^٢ + ٢ س + ١ متخذاً $s \in [-٤, ٢]$ | (الغربية ١٨، الشرقية ١٧) |
| ٧ د : د (س) = (٢ - س) ^٢ متخذاً $s \in [-١, ٥]$ | (الغربية ٢٠، كفر الشيخ ١٩) |
| ٨ د : د (س) = س (س - (٢ - س) - ٣ متخذاً $s \in [-٢, ٤]$ | (الدقهلية ١٧) |
| ٩ د : د (س) = ٣ - ٢ س - س ^٢ متخذاً $s \in [-٤, ٢]$ | |
| ١٠ د : د (س) = ٤ س + ٣ - ٢ س ^٢ متخذاً $s \in [-٣, ٣]$ | |
| ١١ د : د (س) = ٤ س ^٢ - ٤ س + ٥ متخذاً $s \in [٠, ٥]$ | |
| ١٢ د : د (س) = ١ - ٢ س + س ^٢ متخذاً $s \in [-١, ٤]$ | |

٦ إذا كانت الدالة $d: (s) = 3 - s - 6$ يمثلها خط مستقيم يمر بالنقطة $(2, 4)$

أوجد قيمة 4 ثم أوجد نقطة تقاطع الخط المستقيم مع محور الصادات.

(الغيبية ٢٠) «٦، ٠»، «٦-، ٠»

٧ إذا كان المستقيم الممثل للدالة $d: s \leftarrow s$ حيث $d(s) = 4 - s + 5$ يقطع جزءاً

موجباً من محور الصادات طوله يساوي ٣ وحدات ويمر بالنقطة $(1, 5)$

أوجد قيمتي 4 ، 5

(أقرأ الشبه ٢٠) «٢، ٣»

٨ إذا كان المستقيم الممثل للدالة $d: s \leftarrow s$ ، $d(s) = 4 - s + 5$ يقطع محور

السينات في النقطة $(2, 0)$ ويقطع محور الصادات في النقطة $(0, 3)$

أوجد قيمة كل من الثابتين 4 ، 5 ثم أوجد قيمة $d(1)$ (الشرقية ١٧) «١، ٣-، ٣-»

٩ إذا كان منحنى الدالة $d: s \leftarrow s$ حيث $d(s) = 4 - s - 2$ يقطع محور السينات

في النقطة $(-2, 5)$ أوجد قيمة $2 + 3$ م (الشرقية ١٥) «٩»

١٠ إذا كانت $s = \{2, 3, 6\}$ ، $s = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

وكانت $r: s \leftarrow s$ حيث $r(s) = 9 - s$

١ أوجد مجموعة صور عناصر المجموعة s بالدالة r

٢ هل r دالة خطية؟ اذكر السبب. (الدفعلية ١٤)

١١ إذا كانت $d: (s) = 4 + s^2$ ، $l(s) = 4 - s$ حيث d ، l كثيرتا حدود 4 ، 4 ، 4


ثابتان وكان $d(3) + (2)l(3) = 6$ أوجد القيمة العددية للمقدار $d(2) + (0)l(2)$ (٧)

(الدفعلية ١٩) «٤-»

الشكل المقابل يمثل الدالة d حيث $d = (s) = 2 - s$
أوجد :

١ إحدائى كل من النقطتين 1 ، 2 ، 3

٢ مساحة سطح $\Delta 123$



(الأقصر ١٩، الإسماعيلية ١٦)


١٣ في الشكل المقابل :

الدالة الثابتة d تمثل بيانياً بالمستقيم 1

والدالة الخطية s تمثل بيانياً بالمستقيم 2 حيث $2 = (3, 2)$


١ اكتب قاعدة الدالة d وقاعدة الدالة s

٢ أوجد قيمة d : $d = (10) + s$ (٦)



(الشرقية ١٤) « ١٢ »

الشكل المقابل يوضح المستقيم 1 الذى يمثل الدالة d
حيث : $d = (s) = 4$ ، فإذا كان 1 أو يمثل الدالة الخطية s
حيث : $s = (s) = 2s + 4$ ، وكانت مساحة سطح
المثلث 123 و تساوى 4 وحدات مربعة ،
فأوجد قيمة : كل من s ، 4 حيث و نقطة الأصل.




(الدقهلية ١٧) « ٢ ، ٤ »


الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة d حيث $d = (s) = 9 - s^2$
أوجد :

١ إحدائى 1 ، 2 ، 3

٢ مساحة المثلث 123



(نعم الشيخ ١٨)



(الجينة ٢٠، الأقدس ١٨، شه. سيناء ١٦)


الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة d حيث :

$d(s) = m - s^2$ ، إذا كان $a = 9$ و $b = 4$ وحدات

أوجد : ١ قيمة m

٢ إحداثي كل من a ، b

٣ مساحة المثلث الذي رؤوسه a ، b ، c




(الدفعلية ١٨)

الشكل المقابل يمثل الدالة d : $d(s) = l - s^2$

، مساحة المثلث $a - b = 21$ وحدة مربعة

، $a(0, -7)$ أوجد إحداثي نقطة b ثم أوجد قيمة l

الشكل المقابل يوضح المخطط البياني لدالة الدرجة الثانية d :



(الدفعلية ١٦)

١ اكتب مجال الدالة d

ثم استنتج من الشكل :

٢ مدى الدالة d

٣ معادلة محور تماثل منحنى الدالة d

٤ القيمة العظمى للدالة d

٥ قيمة $d(1)$

٦ إذا كانت : $d(s) = a(s - 2)^2 + k$

فأوجد قيمة : $a + k$

الدالة

★ يقال لعلاقة من S إلى S إنها دالة إذا تحققت إحدى الحالات الآتية :

- ① كل عنصر من عناصر S يظهر مرة واحدة فقط كمسقط أول في أحد الأزواج المرتبة التي تنتمي إلى بيان العلاقة.
- ② كل عنصر من عناصر S يخرج منه سهم واحد فقط إلى أحد عناصر S وذلك في المخطط السهمي الممثل للعلاقة.
- ③ كل خط رأسى تقع عليه نقطة واحدة فقط من النقط التي تمثل العلاقة وذلك في المخطط البياني الممثل للعلاقة.

★ إذا كانت D دالة من S إلى S فإنها تكتب $D : S \rightarrow S$ ويكون :

- ① S هي مجال الدالة D
- ② S هي المجال المقابل للدالة D
- ③ مجموعة صور عناصر S بالدالة D هي مدى الدالة ويكون مدى الدالة \subseteq المجال المقابل للدالة.

دوال كثيرات الحدود

★ الدالة كثيرة الحدود هي دالة قاعدتها حد أو مقدار جبرى ويتوافر فيها الشرطان الآتيان معاً :

- ① كل من المجال والمجال المقابل للدالة هو مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R}
 - ② قوة (أس) المتغير فى أى حد من حدود قاعدتها هو عدد طبيعى.
- لاحظ أن : درجة الدالة كثيرة الحدود هي أكبر قوة للمتغير فى قاعدة الدالة.

★ الدالة الثابتة :

الدالة $D : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $D(x) = c$ ، $c \in \mathbb{R}$ تسمى دالة ثابتة ويمثلها بيانياً خط مستقيم يوازي محور السينات ويقطع محور الصادات فى النقطة $(0, c)$

★ الدالة الخطية :

الدالة $D : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $D(x) = ax + b$ ، $a \neq 0$ ، $b \in \mathbb{R}$ تسمى دالة خطية (دالة من الدرجة الأولى) يمثلها بيانياً خط مستقيم يقطع محور الصادات فى $(0, b)$ ويقطع محور السينات فى $(-\frac{b}{a}, 0)$

★ الدالة التربيعية :

الدالة $D : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $D(x) = ax^2 + bx + c$ ، $a \neq 0$ ، $b, c \in \mathbb{R}$ تسمى دالة تربيعية وهى دالة كثيرة حدود من الدرجة الثانية ويمثلها بيانياً منحنى نقطة رأسه هي : $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a})$

٣ (١) إذا كان بيان الدالة $d = \{(21, 7), (15, 5), (9, 3)\}$

١ اكتب مجال الدالة d ٢ اكتب مدى الدالة d ٣ اكتب قاعدة للدالة d

(ب) مثل بياناً الدالة $d : d(s) = -2s + 3$ وأوجد نقطتي تقاطع المستقيم الممثل للدالة d مع محوري الإحداثيات حيث $s \in \mathbb{R}$

٤ (١) إذا كانت $s = \{-1, 1, 0, 2\}$ ، E علاقة معرفة على s حيث « ١ E ٢ »

تعني أن « $١ = ٢$ » لكل $(١, ٢) \in s$

١ اكتب بيان E ومثلها بمخطط سهمي.

٢ هل العلاقة E دالة؟ ولماذا؟

(ب) مثل بياناً الدالة d حيث $d(s) = (s-2)^2 + 1$ متخذاً $s \in [0, 4]$ ومن الرسم استنتج:

١ إحداثيي رأس المنحنى.

٢ معادلة محور التماثل.

٣ القيمة العظمى أو الصغرى للدالة.

٥ (١) إذا كانت d ، r دالتين حيث $d(s) = -2s + 3$ ، $r(s) = s - 7$

١ أوجد: درجة الدالة d

٢ احسب قيمة $d(0) + r(0)$

(ب) الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة التربيعية

$d : d(s) = -s^2 - 4s - 4$ ، k ثابت $k \neq 0$.


١ $(0, 4)$ هي رأس المنحنى

٢ «و» هي نقطة الأصل

٣ $s, b \in \mathbb{R}$ محور السينات

٤ مساحة المثلث الذي رؤوسه $١, ٢, ٣$

٥ تساوى ٨ وحدات مربعة.



أوجد: ١ معادلة محور التماثل ، القيمة العظمى للدالة d

٢ إحداثيي نقطة b

٣ قيمة k

٣ (أ) مثل بياناً الدالة د حيث د (س) = $س^2 + 2س - 4$ متخذاً س $\in [-4, 2]$

ومن الرسم استنتج :

١ إيجاد رأس المنحنى.

٢ معادلة محور التماثل.

٣ القيمة العظمى أو الصغرى للدالة.

(ب) إذا كان المستقيم الممثل للدالة د حيث د : $س \leftarrow ع$ حيث د (س) = $2س - 3$ لـ

يقطع محور السينات فى النقطة (٦، م - ٢) فأوجد قيمة كل من : م ، لـ

٤ (أ) إذا كان : (س - ٢، ٩) = (٥، س + ص) أوجد قيمة : $\sqrt{3س + 2ص}$

(ب) إذا كانت : $\{2, 1\} = س$ ، $\{5, 2\} = ص$ ، $\{5, 4\} = ع$ ،

فأوجد : $(س - ص) \times ع$

٢ $ص(س \times ص) + ص(ع)$

٥ (أ) إذا كانت : $س = \{4, 5, 7\}$ وكانت ع دالة على س وكان بيان

$ع = \{(7, 4), (5, 6), (5, 9)\}$

أوجد : ١ القيمة العددية للمقدار : $3 + 23$ ٢ مدى الدالة ع

(ب) إذا كانت د : د (س) = $2س^2 - 5س + 2$ أوجد قيمة : د (٢) - د $(\frac{1}{2})$



مشروع بحثي

على الوحدة الأولى

أهداف المشروع

- تمثيل الدالة التربيعية بيانياً.
- الربط بين الرياضيات وتكنولوجيا الحاسب.

المطلوب

« أصبح الكمبيوتر الآن أحد الأدوات الهامة فى دراسة العلوم المختلفة ومنها الرياضيات »

فى ضوء ذلك قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلى :

- اكتب نبذة مختصرة عن لغة البرمجة فيجوال بيزك (Visual Basic).
- باستخدام أحد برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى مجال الرياضيات مثل Geogebra والذي يمكنك الوصول إليه من الموقع الإلكتروني www.geogebra.org :

١ مثل بيانياً الدالة د : د (س) = س^٢

٢ مثل بيانياً على نفس الشكل الدالة م : م (س) = (س - ١)^٢

٣ ثم مثل بيانياً على نفس الشكل الدالة ن : ن (س) = (س + ١)^٢


٤ قارن منحنى الدالة م مع منحنى الدالة د ، وقارن منحنى الدالة ن مع منحنى الدالة د ثم اكتب ماذا تلاحظ ؟

٥ توقع كيف سيكون شكل منحنى الدالة ل : ل (س) = (س - ٣)^٢

وكيف سيكون شكل منحنى الدالة و : و (س) = (س + ٤)^٢

الوحدة 2

النسبة والتناسب والتغير الطردى والتغير العكسى



أهداف الوحدة :

- يتعرف مفهوم النسبة.
- يتعرف خواص النسبة.
- يتعرف مفهوم التناسب.
- يتعرف خواص التناسب.
- يتعرف مفهوم التناسب المتسلسل.
- يستخدم خواص النسبة والتناسب في حل العديد من المشكلات.
- يتعرف مفهوم التغير الطردى.
- يتعرف مفهوم التغير العكسى.
- يميز بين التغير الطردى والتغير العكسى.
- يحل مسائل حياتية على التغير الطردى والتغير العكسى.
- يقدر دور الرياضيات في حل الكثير من المشكلات الحياتية.

دروس الوحدة :

- ♦ الدرس 1 النسبة والتناسب.
 - ♦ الدرس 2 تابع خواص التناسب.
 - ♦ الدرس 3 التناسب المتسلسل.
 - ♦ الدرس 4 التغير الطردى والتغير العكسى.
- مشروع بحثي** على الوحدة الثانية



يمكنك حل
الامتحانات
التفاعلية على
الدروس من خلال
مسح QR code
الخاص بكل امتحان

خواص النسبة

١ قيمة النسبة لا تتغير إذا ضرب حداها في أو قسما على عدد حقيقي لا يساوي الصفر.

أي أن:

$$a:b = \frac{a}{b} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c} \quad c \neq 0$$

$$\text{فمثلاً: } \frac{6}{2} : \frac{4}{2} = 6 : 4$$

$$\text{أي أن: } 3 : 2 = 6 : 4$$



3 : 2



6 : 4


$$a:b = \frac{a}{b} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c} \quad c \neq 0$$

$$\text{فمثلاً: } 2 : 1 = 4 : 2 = 8 : 4$$

$$\text{أي أن: } 8 : 4 = 2 : 1$$



8 : 4



2 : 1

٢ قيمة النسبة ($\neq 1$) تتغير إذا أضيف إلى حديها أو طرح منهما عدد حقيقي لا يساوي الصفر.

أي أن:

$$a:b \neq (a+c):(b+c) \quad c \neq 0$$

حيث $a \neq b$

$$\text{فمثلاً: } 3 - 8 : 2 - 0 \neq 8 : 0$$

$$\text{أي أن: } 0 : 2 \neq 8 : 0$$



0 : 2



8 : 0

$$a:b \neq (a+c):(b+c) \quad c \neq 0$$


حيث $a \neq b$

$$\text{فمثلاً: } 1 + 4 : 1 + 2 \neq 4 : 2$$

$$\text{أي أن: } 0 : 4 \neq 4 : 2$$



0 : 4



4 : 2

الدرس

1

النسبة والتناسب

أولاً النسبة

برسنا في المرحلة الابتدائية أن النسبة هي إحدى طرق المقارنة بين كميتين.

فمثلاً:

إذا قُسمت فطيرة إلى 4 أجزاء متساوية

وأكل هاني جزءاً واحداً منها فقط فإن:

• نسبة ما أكله هاني إلى الفطيرة بالكامل هي 1 : 4 وقد نُكتب $\frac{1}{4}$

• نسبة ما تبقى إلى الفطيرة بالكامل هي 3 : 4 وقد نُكتب $\frac{3}{4}$

• نسبة ما أكله هاني إلى ما تبقى من الفطيرة هي 1 : 3 وقد نُكتب $\frac{1}{3}$

وعموماً فإنه:

إذا كان a, b عددين حقيقيين فإن النسبة بين a و b تُكتب $a:b$ ، $\frac{a}{b}$ وتقرأ a إلى b حيث:

يُسمى a مقدم النسبة، يُسمى b تالي النسبة، يُسمى a ، b معاً حدى النسبة.

ثانياً التناسب

الجدول التالي يوضح مجموعتين من الأعداد :

| | | | | | |
|------------|---|----|----|----|----|
| المجموعة أ | ٢ | ٤ | ٧ | ٣ | ٦ |
| المجموعة ب | ٨ | ١٦ | ٢٨ | ١٢ | ٢٤ |

وإذا تأملنا هاتين المجموعتين يمكننا أن نلاحظ أن :

$$\frac{٢}{٨} = \frac{٤}{١٦} = \frac{٧}{٢٨} = \frac{٣}{١٢} = \frac{٦}{٢٤}$$

في هذه الحالة نقول إن أعداد المجموعة أ تتناسب مع الأعداد المناظرة لها في المجموعة ب وتسمى الصورة السابقة التي تعبر عن تساوي نسبتين أو أكثر بـ «التناسب».

تعريف التناسب

هو تساوي نسبتين أو أكثر.

أي أنه :

إذا كان : $\frac{أ}{ب} = \frac{ج}{د}$ فإن الكميات : أ ، ب ، ج ، د تكون متناسبة.

والعكس : إذا كان : أ ، ب ، ج ، د كميات متناسبة فإن : $\frac{أ}{ب} = \frac{ج}{د}$

ويُسمى : **١** بالاول المتناسب ، **ب** بالثاني المتناسب

، **ج** بالثالث المتناسب ، **د** بالرابع المتناسب.

كما يسمى : **أ ، ب** بطرفي التناسب ، **ج ، د** بوسطى التناسب.

فمثلاً : الأعداد ١ ، ٤ ، ٧ ، ٢٨ أعداد متناسبة لأن : $\frac{١}{٢٨} = \frac{٤}{٧}$

ويكون : **١** الاول المتناسب ، **٤** الثاني المتناسب ، **٧** الثالث المتناسب

، **٢٨** الرابع المتناسب ، **١ ، ٢٨** طرفي التناسب ، **٤ ، ٧** وسطى التناسب

خواص التناسب

خاصية ١

إذا كان : $\frac{أ}{ب} = \frac{ج}{د}$ فإن : $أ \times د = ب \times ج$ (حاصل ضرب الطرفين = حاصل ضرب الوسطين)

(السبب : إذا ضربنا كل نسبة في س فإننا نجد أن : $\frac{أ}{ب} \times س = \frac{ج}{د} \times س$)

أي أن : $أ \times د = ب \times ج$

مثال ١

١ أوجد الثالث المتناسب للكميات : ٣ ، ٤ ، ... ، ٢٠

٢ أوجد الرابع المتناسب للكميات : ١٨ ، ٢ ، ١٢ ، ٢١ ، ...

الحل

١ نفرض أن الثالث المتناسب هو س . \therefore الكميات : ٣ ، ٤ ، س ، ٢٠ متناسبة

$$\therefore \frac{٣}{٤} = \frac{س}{٢٠} \text{ ومن الخاصية السابقة : } \therefore ٣ \times ٢٠ = ٤ \times س$$

$$\therefore ٦٠ = ٤ \times س \quad \therefore س = \frac{٦٠}{٤} = ١٥$$

٢ نفرض أن س هو الرابع المتناسب

\therefore الكميات : ١٨ ، ٢ ، ١٢ ، ٢١ ، س متناسبة

$$\therefore \frac{١٨}{٢} = \frac{٢١}{س} \quad \therefore \frac{١٨ \times س}{٢} = ٢١$$

$$\therefore ٩س = ٤٢ \quad \therefore س = \frac{٤٢}{٩} = ١٤$$


$$\therefore ١٨ \times س = ٢ \times ٢١ \quad \therefore ١٨س = ٤٢$$

$$\therefore س = \frac{٤٢}{١٨} = ١٤$$

حاول بنفسك ١

إذا كانت الكميات : س ، ٢٣ ، ١٥ ، ٦٩ كميات متناسبة فأوجد : قيمة س

خاصية ٢


إذا كان: $١ \times ٤ = ٤ \times ١$ 

فإن: $\frac{١}{٤} = \frac{٤}{١}$


(السبب: إذا قسمنا كل نسبة على ٤ فإننا نجد أن: $\frac{٤ \times ١}{٤} = \frac{٤ \times ١}{٤}$)

أي أن: $\frac{١}{٤} = \frac{٤}{١}$


ويمكن أيضًا أن نستنتج أنه:

• إذا كان: $١ \times ٤ = ٤ \times ١$ 

فإن: $\frac{٤}{١} = \frac{١}{٤}$

• إذا كان: $١ \times ٤ = ٤ \times ١$ 

فإن: $\frac{٤}{١} = \frac{١}{٤}$

• إذا كان: $١ \times ٤ = ٤ \times ١$ 

فإن: $\frac{٤}{١} = \frac{١}{٤}$

مثال ٥

في كل مما يأتي أوجد $\frac{١٢}{٣}$ إذا كان:

١ $\frac{١}{٤} = \frac{٢}{٤}$ ص

٢ $١٢ \times ٣ = ٣ \times ٣$ ص

الحل

١ $\therefore ١٢ \times ٣ = ٣ \times ٣$ ص

٢ $\therefore \frac{١}{٤} = \frac{٢}{٤}$ ص

$\therefore \frac{١}{٤} = \frac{٢}{٤} = \frac{٢}{٤}$

$\therefore \frac{٢}{٤} = \frac{٢}{٤} \times \frac{٢}{٤} = \frac{١}{٢} \div \frac{٢}{٤} = \frac{١}{٢}$

مثال ١

أوجد العدد الذي إذا أضيف لكل من الأعداد ١، ١٣، ٧، ٣١ حصلنا على أعداد متناسبة.

الحل

نفرض أن العدد = س

$\therefore ١ + س، ١٣ + س، ٧ + س، ٣١ + س$ متناسبة

$\therefore \frac{١ + س}{١٣ + س} = \frac{٧ + س}{٣١ + س}$ $\therefore (١ + س)(٧ + س) = (٣١ + س)(١٣ + س)$

$\therefore ٧ + س + ١٣س + ١٣ = ٣١ + س + ٣٩س + ٣٩$ $\therefore ٩١ + س = ٣١ + ٤٠س$

$\therefore ٦٠ = ٣٩س$ $\therefore س = ١٥$ \therefore العدد المطلوب = ١٥

مثال ٣

إذا كان: $(٢ + س) : (٥ + س) = (٣ - س) : ٤$ فأوجد قيمة س:

الحل

$\therefore \frac{٢ + س}{٣ - س} = \frac{٥ + س}{٤}$

$\therefore ٤(٢ + س) = (٥ + س)(٣ - س)$

$\therefore ٨ + ٤س = ١٥ - ٣س - ٥س + ٣س$

$\therefore س = \frac{٢٥}{٧}$

مثال ٤

أوجد العدد الذي إذا أضيف إلى حدى النسبة ١٧ : ٢٢ فإننا نحصل على النسبة ٦ : ٧

الحل

نفرض أن العدد المطلوب = س

$\therefore \frac{١٧ + س}{٢٢ + س} = \frac{٦}{٧}$

$\therefore ٧(١٧ + س) = ٦(٢٢ + س)$

$\therefore ١١٩ + ٧س = ١٣٢ + ٦س$

$\therefore س = ١٣$ (العدد المطلوب)

حاول بنفسك ٢

أوجد العدد الحقيقي الذي إذا طُرح من حدى النسبة $\frac{٥}{٦}$ لأصبحت $\frac{٣}{٤}$

مثال ٦

إذا كان: $٤س - ٣ص : ٢س + ص = ٧ : ٤$ فأوجد في أبسط صورة: النسبة $س : ص$

الحل

$$\begin{aligned} \therefore \frac{٤س - ٣ص}{٢س + ص} &= \frac{٧}{٤} \\ \therefore ٢٨س - ٢١ص &= ٧س + ٧ص \\ \therefore ٢٨س - ٧س &= ٧ص + ٢١ص \\ \therefore ٢١س &= ٢٨ص \\ \therefore \frac{س}{ص} &= \frac{٢٨}{٢١} \end{aligned}$$

مثال ٧

إذا كان: $٢س - ٦ص = ٢س = ص$ فأوجد: $س : ص$

الحل

$$\begin{aligned} \therefore ٢س - ٦ص &= ٢س = ص \\ \therefore (٢س + ص) (س - ٢) &= ٠ \\ \therefore ٢س + ص = ٠ \text{ ومنها } ٢س &= -ص \\ \therefore ٢س - ٦ص &= ٠ \text{ ومنها } ٢س &= ٦ص \\ \therefore \frac{س}{ص} &= \frac{٦}{٢} = ٣ \end{aligned}$$

حاول بنفسك ٢

- ١ إذا كان: $٢٢ - ٥ص = ٠$ فأوجد: $\frac{س}{ص}$
- ٢ إذا كان: $\frac{س + ٢ص}{س - ٤ص} = \frac{٧}{٦}$ فأثبت أن: $\frac{س}{ص} = \frac{٢}{٣}$
- ٣ إذا كان: $٤٤ - ٢٩ص = ٠$ فأوجد: $\frac{س}{ص}$

خاصية ٣

إذا كان: $\frac{س}{ص} = \frac{١}{٤}$ فإن: $\frac{س}{ص} = \frac{١}{٤}$ أي أن: $\frac{\text{مقدم النسبة الأولى}}{\text{تالي النسبة الأولى}} = \frac{\text{مقدم النسبة الثانية}}{\text{تالي النسبة الثانية}}$


السبب: إذا ضربنا كل نسبة في $\frac{س}{ص}$ فإننا نجد أن: $\frac{س}{ص} \times \frac{س}{ص} = \frac{س}{ص} \times \frac{١}{٤}$

أي أن: $\frac{س}{ص} = \frac{١}{٤}$

فمثلاً: إذا كان: $\frac{س}{ص} = \frac{١}{٤}$ فإن: $\frac{٤}{٣} = \frac{١}{٤}$ و $\frac{٢}{٤} = \frac{١}{٢}$

مثال ٨

في الشكل المقابل:



أثبت قائم الزاوية في \triangle فيه:

$\triangle ABC$ ، D على AC بحيث $BD \perp AC$

$AD = ٣$ سم، $DC = ٤$ سم

أوجد: $AB : AC$

الحل

في $\triangle ABC$ ، D على AC :

$\angle B = ٩٠^\circ$ ، $\angle BDC = ٩٠^\circ$ ، $\angle BDC$ مشتركة في المثلثين

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle BDC$

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle BDC$

وينتج أن: $\frac{AB}{BC} = \frac{BC}{DC}$

$\therefore \frac{AB}{٤} = \frac{٣}{٣}$

$\therefore \frac{س}{٤} = \frac{٣}{٣}$

(وهو المطلوب)

خاصية ٤

إذا كان: $\frac{2}{3} = \frac{1}{2}$ فإن: $2 = 3$ ، $5 = 7$ (حيث m ثابت \neq صفر)

فمثلاً: إذا كان: $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ فإن: $2 = 1$ ، $3 = 1$ ، $4 = 1$ (حيث m ثابت \neq صفر)

مثال ۹

إذا كان $a : b = 3 : 5$ فأوجد النسبة : $220 - 7b : 150 + b$

الحل

$$\frac{r}{0} = \frac{1}{1} \therefore$$

$\therefore 1 = 2^0, 2 = 2^1, 3 = 2^0 + 2^1$ (حيث $0 \neq$ صفر)

وبالتعويض عن α ، β بدلالة μ $\therefore \frac{1}{\gamma} = \frac{\mu_{20}}{\mu_{50}} = \frac{\mu_{20} - \mu_{60}}{\mu_{50} + \mu_{40}} = \frac{-7 - 120}{-5 + 110}$

مثال آخر: بقسمة حدى النسبة $\frac{7-20}{-+15}$ على $-$ ثم التعويض عن قيمة $\frac{2}{5} = \frac{1}{-}$

$$\frac{1}{Y} = \frac{0}{1} = \frac{V - 1Y}{1 + 9} = \frac{V - \frac{r}{0} \times r}{1 + \frac{r}{0} \times 10} = \frac{V - \left(\frac{1}{0}\right)r}{1 + \left(\frac{1}{0}\right)10} = \frac{V - 1r}{1 + 10} \therefore$$

مثال ۱۰

إذا كان: $\frac{2}{3} = \frac{1}{1}$ ، $\frac{3}{5} = \frac{3}{5}$

فأثبت أن: $(١٧س + ٤ص)$ ، $(١١ص + ٥س)$ ، ١٢ ، ١٤ كميات متناسبة.

حل

$$\frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{1} \therefore$$

$m^2 = 1, m^2 = 2 \therefore m^2 = 3$
(حيث $m \neq 0$)

$\therefore \frac{r}{s} = \frac{r}{s}$ ، $\therefore s = 3$ ك ، $v = 5$ ك (حيث ك \neq صفر)
 [لاحظ أننا استخدمنا ثابتين مختلفين م ، ك ولا يجوز استخدام نفس الثابت]

97

وبالتعويض عن ٩، ب، س، ص

$$\frac{20 \times 2 \times 4 + 2 \times 2 \times 7}{2 \times 2 + 20 \times 2 \times 11} = \frac{17}{11} \therefore$$

$$\frac{7}{V} = \frac{2 \text{ m } 1.2}{2 \text{ m } 11.9} = \frac{2 \text{ m } 7.0 + 2 \text{ m } 4.2}{2 \text{ m } 9 + 2 \text{ m } 11.} = \frac{7}{V} = \frac{12}{18} \therefore$$

∴ (٢٧ ص + ٤ ص) ، (١١ ص + ١ ص) ، ١٢ ، ١٤ كميات متناسبة.

حاول بنفسك

إذا كان: $\frac{9}{5} = \frac{ص}{ح}$ فاثبت أن: $(2 - ح + ص)$ ، $(ح + 2 + ص)$ ، 12 ، 16 كميات متناسبة.

مثال ۱۱

عدنان حقيقان النسبة بينهما ٤ : ٧ وإذا طرح من كل منهما ١٦ أصبحت النسبة بين العددين الناتجين ٢ : ٥ أوجد العددين.

الحل

نفرض أن العددين هما ٢ ، ٣

$$\frac{\varepsilon}{V} = \frac{p}{T} \therefore$$

$$\frac{2}{5} = \frac{17 - 4m}{17 - 7m} \therefore 7m = 6, m = \frac{6}{7} \text{ (حيث } m \neq \text{ صفر)}$$

$$P_{14} - P_{20} = 1. + 22 \therefore \quad 1. - P_{20} = 22 - P_{14} \therefore$$

$$\lambda = \frac{\xi \lambda}{\gamma} = \mu \therefore \quad \mu \gamma = \xi \lambda \therefore$$

أي أن: العددين هما: ٣٢، ٥٦ $٥٦ = ٨ \times ٧ = ٧$ ، $٣٢ = ٨ \times ٤ = ٤$ ∴

حاول بنفسك

عددان صحيحان النسبة بينهما ٢ : ٥ وإذا طرح من العدد الأول ٢ وأضيف للثاني ١ صارت النسبة بينهما ١ : ٤ أوجد العددين.

1. $\frac{1}{0}$
 2. $\frac{1}{0}$
 3. $\frac{1}{0}$
 4. $\frac{1}{0}$
 5. $\frac{1}{0}$
 6. $\frac{1}{0}$
 7. $\frac{1}{0}$
 8. $\frac{1}{0}$
 9. $\frac{1}{0}$
 10. $\frac{1}{0}$

تمارين 5

على النسبة والتناسب

أسئلة كتاب الوزارة

١ أكمل ما يأتي :

- ١ إذا كان : ٩ ، ب ، ح ، د كميات متناسبة فإن : ح يسمى (دعياط)
- ٢ إذا كانت الكميات : ٩ ، ب ، ح ، د متناسبة فإن : $\frac{9}{\text{ب}}$ = (البجيدة)
- ٣ الرابع المتناسب للأعداد : ٤ ، ١٢ ، ١٦ ، ... هو (أحمد الشبيخ)
- ٤ الثاني المتناسب للأعداد : ٢ ، ... ، ٤ ، ٦ هو (دعياط)
- ٥ الثالث المتناسب للأعداد : ٨ ، ٦ ، ... ، ١٢ هو (دعياط)
- ٦ الأول المتناسب للأعداد : ... ، ٥ ، ٢٧ ، ٤٥ هو (دعياط)
- ٧ إذا كانت : ٣ ، ١ - ٩ ، ١ + ٩ ، ٥ متناسبة فإن : ٩ = (دعياط)
- ٨ قسم مبلغ بين شخصين بنسبة ٢ : ٣ فإذا كان نصيب أولهما ٣٠ جنيهاً فإن نصيب الآخر = جنيهاً. (ج. سيناء، ٠٩)
- ٩ إذا كان : ٧ س = ٣ ص فإن : $\frac{\text{س}}{\text{ص}}$ = (الوادي الجديد، ١١)
- ١٠ إذا كان : ٥ - ٩ = ٤ - ب فإن : $\frac{9}{\text{ب}}$ = (سوهاج، ٠٩)
- ١١ إذا كان : $\frac{٧-٢٥}{١١+٢٨} = ٠$ فإن : $\frac{\text{ب}}{٢}$ = (الفيوم، ١٢)
- ١٢ إذا كان : $\frac{٢}{٣} = \frac{٩}{\text{ب}}$ فإن : $\frac{٢}{٣}$ = (دعياط)

٢ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١ نسبة مساحة منطقة مربعة طول ضلعها ل سم إلى مساحة منطقة مربعة أخرى طول ضلعها ٢ ل سم كنسبة (المنوفية، ١٣)
- (أ) ٢ : ١ (ب) ٤ : ١ (ج) ٤ : ١ (د) ١ : ٤
- ٢ إذا كان : $\frac{٢٣}{٥} = \frac{١}{٣}$ فإن : $\frac{٩}{\text{ب}}$ = (الإسكندرية، ٢٠، البحر الأحمر، ١١)
- (أ) $\frac{٦}{٥}$ (ب) $\frac{٥}{٦}$ (ج) $\frac{٢}{٣}$ (د) $\frac{٣}{٢}$

٣ إذا كان : ٤ س = ٥ ص فإن : $\frac{٥ ص}{٤ س} = \dots\dots\dots$ (قنا ١١)

- (١) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

٤ إذا كان : ٢٢ = ٥ س فإن : $\frac{٢٢}{٥} = \dots\dots\dots$ (القبوض ١٧)

- (١) ٢ (ب) ٥ (ج) $\frac{٢}{٥}$ (د) $\frac{٥}{٨}$

٥ إذا كان : ٢ س = ٧ ص فإن : $\left(\frac{س}{ص}\right)^{-١} = \dots\dots\dots$ (القبوض ١٠٩)

- (١) $\frac{٢}{٧}$ (ب) $\frac{٧}{٢}$ (ج) $\frac{٤٩}{٤}$ (د) $\frac{٤}{٤٩}$

٦ إذا كانت : ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ متناسبة فإن : $\frac{٥}{٢} = \dots\dots\dots$ (القليبية ١٧)

- (١) $\frac{٢}{٣}$ (ب) $\frac{٢}{٤}$ (ج) ٢ (د) ٣

٧ إذا كانت : ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ كميات متناسبة

فإن : $\frac{١}{٢} = \dots\dots\dots$ (أسوان ١٧ ، دمياط ١٦)

- (١) ٢ (ب) $\frac{١}{٢}$ (ج) $\frac{١}{٣}$ (د) $\frac{١}{٤}$

٨ إذا كانت : ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ أربع كميات متناسبة

فإن : $\frac{١}{٢} = \dots\dots\dots$ (سوهاج ١٣)

- (١) $\frac{٢}{٧}$ (ب) $\frac{٦}{٣٥}$ (ج) $\frac{٢}{٥}$ (د) $\frac{٣}{٧}$

٩ إذا كانت : ٤ س = ٩ ص فإن : $\frac{س}{ص} = \dots\dots\dots$ (بنى سويف ١٦)

- (١) $\frac{٩}{٤}$ (ب) $\frac{٣}{٧}$ (ج) $\frac{٢}{٣} \pm$ (د) $\frac{٣}{٧} \pm$

١٠ إذا كان : $\frac{٢}{٣} = \frac{٢+٢}{٢-٢}$ فإن : $\frac{٢}{٣} = \dots\dots\dots$ (المنوفية ٢٠ ، الإسكندرية ١١)

- (١) $\frac{١}{٨}$ (ب) ٨ (ج) $\frac{١}{٨} -$ (د) ٨ -

١١ إذا كانت : ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ كميات متناسبة فإن : $\dots\dots\dots$

- (١) $\frac{١}{٢} = \frac{٢}{٣}$ (ب) $\frac{٤}{٢} = \frac{١}{٣}$ (ج) $\frac{١}{٤} = \frac{٢}{٣}$ (د) ٢ = ٣

١٢ $\frac{١٨ س - ٣ ص}{٥ ص} = \dots\dots\dots$

- (١) ٢٠ س - ٢ ص (ب) ٣٠ س - ٢ ص (ج) ٣٠ س - ٢ ص (د) ١٥ س - ٢ ص

$$\sqrt{2} + 9\sqrt{2} (j) \quad \sqrt{2} + 9\sqrt{2} (j) \quad \sqrt{2} + 9\sqrt{2} (j) \quad \sqrt{2} + 9\sqrt{2} (i)$$

$$\frac{2}{3} - (ج) \qquad \frac{2}{3} - (د) \qquad \frac{2}{3} (ب) \qquad \frac{2}{3} (ا)$$

١ الأول المتناسب للأعداد : $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \dots$

٣ الرابع المتناسب للكميات : $(١ + ٢)$ ، $(٢ - ٢)$ ، $(٢ - ٢)$ ، ...

$$x : 1 = (5 - x) : (3 - x) \quad \boxed{1}$$
$$3:1 = (1 + \sqrt{2}) : (1 - \sqrt{2}) \quad \boxed{3}$$

إذا كان : $\frac{1}{3} = \frac{s - 2ص}{s + 3ص}$ أوجد : $\frac{ص}{س}$

إذا كان: $\frac{2 - \text{ص}}{2 + \text{ص}} = \frac{2 - \text{ص}}{2 + \text{ص}}$ أثبت أن: $\frac{\text{ص}}{2} = \frac{\text{ص}}{\text{ص}}$

إذا كان : $s^2 - 4s + 3 = 0$ فافجد s : s

إذا كان: $3 - 2 = 10 - 7 + 7 = 2$ ، $s \neq 7$

فأوجد النسبة $س : ص$

٩ إذا كان : $\frac{س}{ص} = \frac{٢}{٣}$ أوجد قيمة النسبة : $\frac{٢س + ٣ص}{٦ص - س}$

(المنيا ٢٠، سوهاج ١٩) «٢/٤»

١٠ إذا كان : $\frac{٢}{٥} = \frac{٩}{٧}$ فأوجد قيمة : $٢٧ + ٩ : ٢٤ + ٢$ (القاهرة ٢٠، قنا ١٥) «٣»

١١ إذا كانت : $٢٤ = ٢$ فأوجد قيمة :

١ «٨» $\frac{٢٤ + ٢}{٢٢ - ٢}$ «٢» $\frac{٢ - ٢}{٢ - ٢}$ «١-»

١٢ إذا كان : $\frac{١}{٣} = \frac{١}{٤}$ ، $\frac{٧}{٢} = \frac{ح}{٤}$ فأوجد النسبة : $\frac{٢٢ + ح}{٢٢ - ح}$ «٤/٣»

١٣ إذا كان : $٧س - ٣ص : ٣ص + ١ : ٢$ فأوجد النسبة : $١٢س + ٩ص : ١١ص - ٣ص$ «١ : ٢»

١٤ إذا كان : $\frac{٢١س + ٩}{٧س + ٢} = \frac{٩}{٢}$ ، $س \neq ٠$ فأوجد قيمة : $\frac{٢ + ٩}{٢٢}$ «٥/١» (الإسماعيلية ١٣)

١٥ أوجد العدد الذي إذا أُضيف إلى كل من الأعداد ٣ ، ٥ ، ٨ ، ١٢ فإنها تكون متناسبة. (أسوط ١٨، سيناء ١٧) «٢»

١٦ أوجد العدد الذي إذا طُرح من كل من الأعداد ١٦ ، ٢١ ، ١٤ ، ١٨ حصلنا على أعداد متناسبة. «٦»

١٧ أثبت أن : $٩ ، ب ، ح ، د$ كميات متناسبة إذا كان :

١ «٩/١٠» $\frac{٩ + ح}{٤} = \frac{٩ + ب}{٢}$

٢ «٩/١٠» $\frac{ح}{٢ - ٤} = \frac{٩}{٢ - ب}$

٣ «٩/١٠» $\frac{٤ - ح}{٤ + ح} = \frac{٢ - ب}{٢ + ب}$

٤ «٩/١٠» $\frac{٢٢ - ٢ح}{٢٢ - ٢} = \frac{٢٢ - ٢ب}{٢٢ - ٢}$ حيث $٩ ، ب ، ح ، د$ كميات موجبة.

١٨ إذا كان $أ : ب : ح = ٥ : ٧ : ٣$ وكان $أ + ب = ٢٧,٦$

«١١,٥ ، ١٦,١ ، ٩,١»

فأوجد قيمة كل من $أ$ ، $ب$ ، $ح$

١٩ إذا كان $أ : ب : ح = ٣ : ٤ : ٥$ أوجد القيمة العددية للمقدار : $\frac{٢أ + ٢ب + ٢ح}{٢(أ + ب + ح)}$

«٦ : ٤ : ٣»

٢٠ إذا كان $أ٢ = ب٣ = ح٤$ فأوجد $أ : ب : ح$

٢١ أجب عما يأتي :

١ أوجد العدد الذي إذا أُضيف إلى حدى النسبة $٧ : ١١$

(الجيزة ١٩ ، الفيوم ١٨ ، القاهرة ١٧ ، الإسكندرية ١٤)

فإنها تصبح $٢ : ٣$

٢ أوجد العدد الذي إذا طُرح ثلاثة أمثاله من حدى النسبة $\frac{٤٩}{٦٩}$

(البحيرة ٢٠ ، الجيزة ١٢)

فإنها تصبح $\frac{٢}{٣}$

٣ أوجد العدد الذي إذا أُضيف مربعه إلى كل من حدى النسبة $٧ : ١١$

(المنوفية ٢٠ ، السويس ١٧)

فإنها تصبح $٤ : ٥$

٤ أوجد العدد الموجب الذي إذا أُضيف مربعه إلى حدى النسبة $٥ : ١١$

(بنى سويف ٢٠ ، الجيزة ١٩ ، كفر الشيخ ١٧)

فإنها تصبح $٣ : ٥$

٥ ما العدد الذي إذا طُرح من مقدم النسبة $١٥ : ١٣$ وأُضيف إلى تاليها

(الأقصر ٢٠)

فإنها تصبح $٣ : ٤$ ؟

٦ عدنان صحيحان النسبة بينهما $٧ : ٣$ ، إذا طُرح من كل منهما ٥ أصبحت

(الإسماعيلية ٢٠ ، الإسكندرية ١٨)

النسبة بينهما $١ : ٣$ ، أوجد العددين.

٧ عدنان صحيحان النسبة بينهما $٣ : ٢$ ، وإذا أُضيف للأول ٧ وطُرح من الثانى

١٢ صارت النسبة بينهما $٥ : ٣$ أوجد العددين. (مطروى ١٨ ، بنى سويف ١٧)

٨ عدنان حقيقيان موجبان النسبة بينهما $٧ : ٤$ ومربع أصغرهما يزيد عن خمسة أمثال

أكبرهما بمقدار ٣٩ أوجد العددين.

تطبيقات هندسية

« ٤٤٨ سم^٢ »

مستطيل النسبة بين بُعديه ٤ : ٧ ومحيطه ٨٨ سم أوجد مساحته.

٢٢


مثلث النسبة بين طول قاعدته وارتفاعه ٣ : ٢ ومساحته ٤٨ سم^٢

٢٣

« ١٢ سم ، ٨ سم »

أوجد طول قاعدته وارتفاعه.

٢٤ في الشكل المقابل :




قامت آلاء بتظليل $\frac{5}{9}$ مساحة الدائرة ، $\frac{2}{3}$ مساحة المثلث

أوجد النسبة بين :

« (الجيزة ٠٨) ٢ : ١ »

مساحة الدائرة : مساحة المثلث.

تطبيقات حياتية



٢٥ يبلغ طول ظل شجرة ٣ أمتار فى الوقت

الذى يكون فيه طول ظل إسلام ١٢٠ سم

فإذا كان طول إسلام ١٨٠ سم

أوجد ارتفاع الشجرة.

« ٤ $\frac{1}{3}$ م »



٢٦ في مجال اهتمام الدولة بالريف المصرى ،

رصدت الدولة مبلغ ١,٨٥ × ١٠^٦ جنيه لإحدى

القرى لبناء مدرسة ، ووحدة صحية ، ومركز

شباب ، فإذا كانت تكاليف المدرسة $\frac{2}{3}$ من تكاليف

الوحدة الصحية ، وتكاليف الوحدة الصحية $\frac{5}{6}$ من

تكاليف مركز الشباب ، فما هى تكاليف كل منها ؟

« ١٠ × ٧,٥ ، ١٠ × ٥ ، ١٠ × ٦ »

١٠٣



٢٧ إذا كانت نسبة النجاح فى إحدى المحافظات للشهادة الإعدادية هى ٨٣٪ وكانت نسبة النجاح للبنين ٧٩٪ ، ونسبة النجاح للبنات ٨٩٪ فأوجد النسبة بين عدد البنين إلى عدد البنات فى هذه المحافظة.

«٢ : ٣»



٢٨ قطعة من السلك طولها ١٥٢ سم قُسمت إلى جزئين النسبة بينهما كنسبة ١١ : ٨ ، وصُنع من الجزء الأكبر دائرة ومن الجزء الأصغر مربع. أوجد النسبة بين مساحة المربع ومساحة الدائرة. ($\frac{22}{7} = \pi$)

«٢٢ : ٧٧»

للمتفوقين



٢٩ أربعة أعداد متناسبة ، الرابع متناسب يساوى مربع الثانى المتناسب ، الأول متناسب ينقص عن الثانى المتناسب بمقدار ٢ ، والثالث المتناسب يساوى ٨ أوجد الأعداد الأربعة.

«٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ ، ٤ - ، ٢ - ، ٨ ، ٤»

٣٠ إذا كانت : س ، ص ، ع ، ل أربعة أعداد متناسبة ،

$$\text{وكان : } س + ص = ٨ ، ص + ع = ١٤ ، ع + ل = ٢٤$$

فأوجد قيمة كل من : س ، ص ، ع ، ل

«٣ ، ٥ ، ٩ ، ١٥»

٣١ أوجد العدد الموجب الذى إذا أُضيف معكوسه الضربى إلى تالى النسبة $\frac{2}{3}$ أصبحت $\frac{3}{5}$

«٣»

تابع خواص التناسب

في هذا الدرس سوف نتناول خاصية (٥) من خواص التناسب ، وقبل دراسة هذه الخاصية سوف نتناول ملاحظة هامة في التناسب تساعد في حل المسائل.

١١ ملاحظة هامة

* إذا كانت a, b, c, d كميات متناسبة وفرضنا أن : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$

فإن : ① $a = b$ ، ② $c = d$ ، ③ $e = f$

فمثلاً : إذا كان : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{1}{2}$ فإن : $\frac{a}{2} = b$ ، $\frac{c}{2} = d$ ، $\frac{e}{2} = f$

* وبصفة عامة إذا كانت $a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z$ كميات متناسبة

وفرضنا أن : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = \frac{i}{j} = \frac{k}{l} = \frac{m}{n} = \frac{o}{p} = \frac{q}{r} = \frac{s}{t} = \frac{u}{v} = \frac{w}{x} = \frac{y}{z}$

فإن : ① $a = b$ ، ② $c = d$ ، ③ $e = f$ ، ④ $g = h$ ، ⑤ $i = j$ ، ⑥ $k = l$ ، ⑦ $m = n$ ، ⑧ $o = p$ ، ⑨ $q = r$ ، ⑩ $s = t$ ، ⑪ $u = v$ ، ⑫ $w = x$ ، ⑬ $y = z$

مثال ١

إذا كانت : $a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z$ كميات متناسبة

فأثبت أن : ① $\frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2} = \frac{c^2 + d^2}{c^2 - d^2} = \frac{e^2 + f^2}{e^2 - f^2} = \frac{g^2 + h^2}{g^2 - h^2} = \frac{i^2 + j^2}{i^2 - j^2} = \frac{k^2 + l^2}{k^2 - l^2} = \frac{m^2 + n^2}{m^2 - n^2} = \frac{o^2 + p^2}{o^2 - p^2} = \frac{q^2 + r^2}{q^2 - r^2} = \frac{s^2 + t^2}{s^2 - t^2} = \frac{u^2 + v^2}{u^2 - v^2} = \frac{w^2 + x^2}{w^2 - x^2} = \frac{y^2 + z^2}{y^2 - z^2}$

$$\frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2} = \frac{c^2 + d^2}{c^2 - d^2} = \frac{e^2 + f^2}{e^2 - f^2} = \frac{g^2 + h^2}{g^2 - h^2} = \frac{i^2 + j^2}{i^2 - j^2} = \frac{k^2 + l^2}{k^2 - l^2} = \frac{m^2 + n^2}{m^2 - n^2} = \frac{o^2 + p^2}{o^2 - p^2} = \frac{q^2 + r^2}{q^2 - r^2} = \frac{s^2 + t^2}{s^2 - t^2} = \frac{u^2 + v^2}{u^2 - v^2} = \frac{w^2 + x^2}{w^2 - x^2} = \frac{y^2 + z^2}{y^2 - z^2}$$

الحل

١ نفرض أن: $\frac{1}{x} = \frac{2}{y} = \frac{3}{z}$ ، $\therefore \frac{1}{x} = \frac{2}{y}$ ، $\frac{1}{x} = \frac{3}{z}$ ، $\frac{2}{y} = \frac{3}{z}$

\therefore الطرف الأيمن = $\frac{2x^2 + 3x^2}{2x^2 - 3x^2} = \frac{5x^2}{-x^2} = -5$ ، الطرف الأيسر = $\frac{2^2 + 3^2}{2^2 - 3^2} = \frac{13}{-5}$

٢ نفرض أن: $\frac{1}{x} = \frac{2}{y} = \frac{3}{z}$ ، $\therefore \frac{1}{x} = \frac{2}{y}$ ، $\frac{1}{x} = \frac{3}{z}$ ، $\frac{2}{y} = \frac{3}{z}$

(١) $\therefore \frac{1}{x} = \frac{2}{y} = \frac{3}{z} = \frac{2+3}{2+3} = \frac{5}{5} = 1$ ، $\therefore x = 1$ ، $y = 2$ ، $z = 3$

(٢) $\therefore \frac{1}{x} = \frac{2}{y} = \frac{3}{z} = \frac{2^2 + 3^2}{2^2 - 3^2} = \frac{13}{-5}$ ، $\therefore x = -\frac{5}{13}$ ، $y = -\frac{10}{13}$ ، $z = -\frac{15}{13}$

من (١) ، (٢) ينتج أن: $\frac{1}{x} = \frac{2}{y} = \frac{3}{z} = 1$ ، $\therefore x = 1$ ، $y = 2$ ، $z = 3$

مثال ٢

إذا كانت: $\frac{1}{x} = \frac{2}{y} = \frac{3}{z}$ ، $\therefore \frac{1}{x} = \frac{2}{y}$ ، $\frac{1}{x} = \frac{3}{z}$ ، $\frac{2}{y} = \frac{3}{z}$ ، $\therefore x = 1$ ، $y = 2$ ، $z = 3$

الحل

نفرض أن: $\frac{1}{x} = \frac{2}{y} = \frac{3}{z}$ ، $\therefore \frac{1}{x} = \frac{2}{y}$ ، $\frac{1}{x} = \frac{3}{z}$ ، $\frac{2}{y} = \frac{3}{z}$ ، $\therefore x = 1$ ، $y = 2$ ، $z = 3$

$\therefore \frac{1}{x} = \frac{2}{y} = \frac{3}{z} = \frac{2^2 + 3^2}{2^2 - 3^2} = \frac{13}{-5}$ ، $\therefore x = -\frac{5}{13}$ ، $y = -\frac{10}{13}$ ، $z = -\frac{15}{13}$

$\therefore \frac{1}{x} = \frac{2}{y} = \frac{3}{z} = 1$ ، $\therefore x = 1$ ، $y = 2$ ، $z = 3$

$\therefore \frac{1}{x} = \frac{2}{y} = \frac{3}{z} = \frac{2^2 + 3^2}{2^2 - 3^2} = \frac{13}{-5}$ ، $\therefore x = -\frac{5}{13}$ ، $y = -\frac{10}{13}$ ، $z = -\frac{15}{13}$

$\therefore \frac{1}{x} = \frac{2}{y} = \frac{3}{z} = 1$ ، $\therefore x = 1$ ، $y = 2$ ، $z = 3$

حاول بنفسك ١

إذا كان: $\frac{1}{x} = \frac{2}{y} = \frac{3}{z}$ ، $\therefore \frac{1}{x} = \frac{2}{y}$ ، $\frac{1}{x} = \frac{3}{z}$ ، $\frac{2}{y} = \frac{3}{z}$ ، $\therefore x = 1$ ، $y = 2$ ، $z = 3$

خاصية ٥

نعلم أن: $\frac{3}{0} = \frac{7}{10} = \frac{9}{10}$

فإذا جمعنا مقدمات وتوالى النسبتين الأولى والثانية نحصل على النسبة $\frac{7+9}{10+10} = \frac{16}{20} = \frac{4}{5}$ وهي تساوى $\left(\frac{3}{0}\right)$ إحدى نسب التناسب المعطى.

كذلك إذا جمعنا مقدمات وتوالى النسبتين الثانية والثالثة نحصل على النسبة

إحدى النسب $\frac{7}{10} = \frac{9}{10} = \frac{7+9}{10+10} = \frac{16}{20} = \frac{4}{5}$

وإذا جمعنا مقدمات وتوالى النسبتين الأولى والثالثة نحصل على النسبة

إحدى النسب $\frac{3}{0} = \frac{7}{10} = \frac{9}{10} = \frac{3+7+9}{0+10+10} = \frac{19}{20}$

وإذا جمعنا مقدمات وتوالى النسب الثلاث نحصل على النسبة

إحدى النسب $\frac{3}{0} = \frac{7}{10} = \frac{9}{10} = \frac{3+7+9}{0+10+10} = \frac{19}{20}$

ولما كانت النسبة لا تتغير إذا ضرب حدها في أى عدد حقيقى خلاف الصفر ،

فإذا ضربنا حدى النسبة الأولى فى أى عدد مثل ٢

وضربنا حدى النسبة الثانية فى أى عدد آخر مثل (-٤)

فإن التناسب السابق يظل صحيحاً أى يكون $\frac{3}{0} = \frac{14}{-40} = \frac{18}{-40}$

فإذا جمعنا مقدمات وتوالى النسبتين الأولى والثانية نحصل على النسبة

إحدى النسب $\frac{3}{0} = \frac{14}{-40} = \frac{18}{-40} = \frac{3+14-18}{0-40-40} = \frac{-3}{-80} = \frac{3}{80}$

وإذا جمعنا مقدمات وتوالى النسب الثلاث نحصل على النسبة

إحدى النسب $\frac{3}{0} = \frac{14}{-40} = \frac{18}{-40} = \frac{3+14-18}{0-40-40} = \frac{-3}{-80} = \frac{3}{80}$

من النقاط السابقة يمكن أن نقول إنه : إذا كانت لدينا مجموعة من النسب المتساوية فإنه يمكننا الحصول على العديد من النسب الأخرى التى كل منها يساوى أى نسبة من النسب الأصلية وذلك عن طريق جمع مقدمات وتوالى كل النسب أو بعضها سواء مباشرة أو بعد ضرب حدى كل نسبة فى أى عدد حقيقى لا يساوى الصفر.

أى أنه :

إذا كان : $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \dots$ وكانت : $\frac{1}{3}, \frac{2}{6}, \frac{3}{9}, \dots$ أعدادًا حقيقية لا تساوى الصفر فإن : $\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{3}{9} = \dots$ إحدى النسب.

ملاحظة : يمكن حل المسألة الأولى فى مثال (١) باستخدام الخاصية السابقة كالتالى :

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6} \quad \therefore \frac{1}{3} = \frac{2}{6}$$

بضرب حدى النسبة الأولى فى ٢ والنسبة الثانية فى ٣

فإن مجموع المقدمات : مجموع التوالى = إحدى النسب

$$\therefore \frac{1+2}{3+6} = \frac{1}{3}$$

ويضرب حدى النسبة الأولى فى ٧ والنسبة الثانية فى ٥

فإن مجموع المقدمات : مجموع التوالى = إحدى النسب

$$\therefore \frac{1+7}{3+5} = \frac{1}{3}$$

من (١) ، (٢) :

$$\frac{1+7}{3+5} = \frac{1+2}{3+6} = \frac{1}{3}$$

مثال ٣

$$\text{إذا كان : } \frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{3}{9} \quad \text{فأثبت أن : } \frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{3}{9}$$

الحل

بضرب حدى النسبة الثانية فى (١-) وجمع مقدمات وتوالى النسب الثلاث :

$$\therefore \frac{1+2+3}{3+6+9} = \frac{1}{3}$$

(١)

بضرب حدى النسبة الثالثة فى (١-) وجمع مقدمات وتوالى النسب الثلاث :

$$\therefore \frac{1+2+3}{3+6+9} = \frac{1}{3}$$

(٢)

مثال ٤

$$\text{إذا كان : } \frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{3}{9} \quad \text{فأثبت أن : } \frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{3}{9}$$

الحل

بجمع مقدمات وتوالى النسب الثلاث :

فإن مجموع المقدمات : مجموع التوالى = إحدى النسب

$$\therefore \frac{1+2+3}{3+6+9} = \frac{1}{3}$$

(١)

$$\therefore \frac{1+2+3}{3+6+9} = \frac{1}{3}$$

ويضرب حدى النسبة الأولى فى (٣) والثالثة فى (٢) وجمع المقدمات والتوالى للنسب الثلاث :

فإن مجموع المقدمات : مجموع التوالى = إحدى النسب

$$\therefore \frac{1+2+3}{3+6+9} = \frac{1}{3}$$

(٢)

$$\therefore \frac{1+2+3}{3+6+9} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \frac{1+2+3}{3+6+9} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \frac{1+2+3}{3+6+9} = \frac{1}{3}$$

مثال ٥

إذا كان : $\frac{٢+٧ح}{٥ع+س} = \frac{٧ح+٤ب}{٥ع+٢ص} = \frac{٤ب+٢}{س+٢ص}$ فأثبت أن : $\frac{س}{ص} = \frac{٢}{٤}$

الحل

بضرب حدى النسبة الثانية فى (١-) وجمع مقدمات وتوالى النسب الثلاث :

$$١) \therefore \frac{٢+٧ح}{٥ع+س} = \frac{٧ح+٤ب}{٥ع+٢ص} = \frac{٢+٧ح+٧ح-٤ب-٤ب+٢}{٥ع+س+٥ع+٢ص-٢ص-٢ص+٢ص} = \frac{٢+١٤ح-٨ب}{١٠ع+٢ص}$$

وبضرب حدى النسبة الثالثة فى (١-) وجمع مقدمات وتوالى النسب الثلاث :

$$٢) \therefore \frac{٢+١٤ح-٨ب}{١٠ع+٢ص} = \frac{٢+١٤ح-٨ب}{١٠ع+٢ص} = \frac{٢+١٤ح-٨ب}{١٠ع+٢ص} = \frac{٢+١٤ح-٨ب}{١٠ع+٢ص}$$

من (١) ، (٢) :

$$\therefore \frac{س}{ص} = \frac{٢}{٤}$$

$$\therefore \frac{س}{ص} = \frac{٢}{٤}$$

حاول بنفسك ٢

إذا كان : $\frac{س}{٢-٤} = \frac{ص}{٢-٤} = \frac{ع}{٢٢-٤}$ فأثبت أن : $\frac{س+٢ص+ع}{٢٤-٤} = \frac{س+٢ص+ع}{٢٢-٤}$

(١) إذا كان : $\frac{س}{٢-٤} = \frac{ص}{٢-٤} = \frac{ع}{٢٢-٤}$ فأثبت أن : $\frac{س+٢ص+ع}{٢٤-٤} = \frac{س+٢ص+ع}{٢٢-٤}$

(٢) إذا كان : $\frac{س}{٢-٤} = \frac{ص}{٢-٤} = \frac{ع}{٢٢-٤}$ فأثبت أن : $\frac{س+٢ص+ع}{٢٤-٤} = \frac{س+٢ص+ع}{٢٢-٤}$

(٣) إذا كان : $\frac{س}{٢-٤} = \frac{ص}{٢-٤} = \frac{ع}{٢٢-٤}$ فأثبت أن : $\frac{س+٢ص+ع}{٢٤-٤} = \frac{س+٢ص+ع}{٢٢-٤}$

(٤) إذا كان : $\frac{س}{٢-٤} = \frac{ص}{٢-٤} = \frac{ع}{٢٢-٤}$ فأثبت أن : $\frac{س+٢ص+ع}{٢٤-٤} = \frac{س+٢ص+ع}{٢٢-٤}$

المسوحة ضوئياً بـ CamScanner

تمارين 6

على خواص التناسب

اختبار
تفاعلي



أسئلة كتاب الوزارة

أكمل ما يأتي :

(الفويص ٠٩)

١ إذا كان : $\frac{1}{2} = \frac{3}{5} = \frac{4}{7}$ فإن : $\frac{4+1}{5+2} = \dots\dots\dots$

٢ إذا كان : $\frac{1}{2} = \frac{3}{5} = \frac{4}{7}$ فإن : $\frac{1-2+3}{2-3+4} = \dots\dots\dots$

٣ $\frac{1}{2} = \frac{3}{5} = \frac{4}{7}$ فإن : $\frac{1-2+3}{2-3+4} = \dots\dots\dots$

٤ إذا كان : $\frac{1}{2} = \frac{3}{5} = \frac{4}{7}$ فإن : $\frac{1-2+3}{2-3+4} = \dots\dots\dots$

(الفاهمة ٠٩)

٥ إذا كان : $\frac{1}{2} = \frac{3}{5} = \frac{4}{7}$ فإن : $\frac{1-2+3}{2-3+4} = \dots\dots\dots$

(الدفعلية ٠٨)

٦ $\frac{1}{2} = \frac{3}{5} = \frac{4}{7}$ فإن : $\frac{1-2+3}{2-3+4} = \dots\dots\dots$

(دمياط ٠٨)

٧ إذا كان : $\frac{1}{2} = \frac{3}{5} = \frac{4}{7}$ فإن : $\frac{1-2+3}{2-3+4} = \dots\dots\dots$

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(الفاهمة ١٧)

١ إذا كانت : $\frac{1}{2} = \frac{3}{5} = \frac{4}{7}$ حيث $m \neq 0$ فإن : $\frac{1-2+3}{2-3+4} = \dots\dots\dots$

(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥

(بورسعيد ٠٩)

٢ إذا كانت : $\frac{1}{2} = \frac{3}{5} = \frac{4}{7}$ فإن : $\frac{1-2+3}{2-3+4} = \dots\dots\dots$

(أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٦

(الغبية ١٧)

٣ إذا كان : $\frac{1}{2} = \frac{3}{5} = \frac{4}{7}$ فإن : $\frac{1-2+3}{2-3+4} = \dots\dots\dots$

(أ) ٩ (ب) ١٣ (ج) ١٤ (د) ٨

٤ إذا كانت : $\frac{1}{2} = \frac{3}{5} = \frac{4}{7}$ فإن : $\frac{1-2+3}{2-3+4} = \dots\dots\dots$

(أ) ٥ (ب) ٥ (ج) ٥ (د) ٥

٥ إذا كان: $\frac{ب}{٥} = \frac{٩}{٤}$ ، $٤٦ = ب٣ + ٩٢$ ، فإن : $٩ = \dots\dots\dots$

(د) ٨

(ج) ٥

(ب) ٤

(أ) ٢

(الغريبة ١٧)

٦ إذا كان: $\frac{٩}{٣} = \frac{٢}{ب}$ ، $\frac{٤}{٥} = \frac{٩}{ب}$ فإن : $ب : ح = \dots\dots\dots$

(د) ٤ : ٣

(ج) ٦ : ٥

(ب) ٥ : ٦

(أ) ٣ : ٤

٣ إذا كانت : ٩ ، $ب$ ، $ح$ ، و كميات متناسبة فأثبت أن :

(أسبوط ١٧)

$$\frac{٥+ب٣}{٥٢-ب٥} = \frac{ح+٩٣}{ح٢-٩٥} \quad ١$$

(أقر الشيخ ١٨ ، السويست ١٦)

$$\frac{٥٢-ب٣}{٥٣+ب٥} = \frac{ح٢-٩٣}{ح٣+٩٥} \quad ٢$$

(المنوفية ١١)

$$\frac{٩}{ب} = \frac{٢٢+٢٢}{٢٢+٢٢} \quad ٣$$

(الغريبة ١٨ ، القليوبية ١٧ ، المنوفية ١١)

$$\frac{٢٢}{ب} = \frac{٢٢+٢٢}{٢٢+٢٢} \quad ٤$$

(السويست ١٨ ، الإسكندرية ١٤)

$$\frac{٢(٢-٩)}{٥-ب} = \frac{٢٢}{ب} \quad ٥$$

$$\frac{٢٢-٢٢٢}{٥٣-٢٢} = \frac{٢(٢+٩)}{٥+ب} \quad ٦$$

$$\frac{٩}{ب} = \frac{٢٢٢-٢٢٢}{٢٥٥-٢٢} \quad ٧$$

حيث : ٩ ، $ب$ ، $ح$ ، و كميات موجبة.

$$\frac{٢+٩}{٥+ب} = \frac{٢٢٢-٢٢٢}{٢٥٣-٢٥} \quad ٨$$

(القليوبية ١٩)

$$\frac{٢٢+٢٢-٢}{٥+ب} = \frac{٢٢٢+٢٢-٢٢}{٢٢} \quad ٩$$

(الإسماعيلية ١١)

٤ إذا كان: $\frac{٩}{ب} = \frac{٢}{ب} = \frac{٢}{و}$ فأثبت أن :

$$\frac{٢٢-٢}{٢٢-٢} = \frac{٢٢+٢}{٢٢+٢} \quad ١$$

$$\frac{٨-٢}{٨-٢} = \frac{٤-٢+٢٢}{٤-٢+٢٢} \quad ٢$$

$$\frac{٢}{ب} = \frac{٢٢٢-٢٢٢+٢٢٢+٢٢}{٢٢٢-٢٢٢+٢٢٢+٢٢} \quad ٣$$

$$\frac{٢+٢٢}{٥+ب} = \frac{٢٢٢-٢٢٢}{٢٢٢-٢٢٢} \quad ٤$$

٥ إذا كان : $\frac{ع}{٥} = \frac{ص}{٤} = \frac{س}{٣}$ فأثبت أن :

(بنى سويف ٢٠، بوسعيد ١٩، ش. سيناء ١٨، الجيزة ١٥)

$$\frac{١}{٢} = \frac{٢ص - ع}{٣س - ٢ص + ع}$$

(دمياط ١٩، سوهاج ١٦، المنيا ١٢)

$$٢س - ٣ص + ٢ع = ٢س + ٣ص$$

٦ إذا كان : $\frac{ع}{٣} = \frac{ص}{٢} = \frac{س}{١}$ أثبت أن : $\frac{٣}{٨} = \frac{س + ص - ٢ع}{٣س - ع}$ (أسبوط ١٧)

٧ إذا كان : $\frac{ح}{٤} = \frac{ب}{٣} = \frac{أ}{٢}$ فأثبت أن : $٢٢ - ٥ب - ٣ح =$ إحدى النسب.

$$\frac{٢٢ - ٥ب - ٣ح}{٣س} = \frac{ح}{٤} = \frac{ب}{٣} = \frac{أ}{٢}$$

فأوجد : قيمة س (القليوبية ٢٠، أسوان ١٩، الأقصر ١٨، قنا ١٧، الغربية ١٦) «٧»

$$\frac{ب}{٤س - ٤ص} = \frac{أ}{٤س + ٤ص}$$

أثبت أن : $\frac{ب - أ}{٥س + ٣ص} = \frac{ب + أ}{٥س - ٣ص}$ (الدقهلية ١٩، دمياط ١٢)

$$\frac{ع + ص}{٧} = \frac{س + ص}{١٩} \quad \text{أثبت أن :} \quad \frac{ع - س}{٦} = \frac{ع + ٢ص + س}{١٣}$$

$$\frac{س + ص}{ع} = \frac{س}{ص} = \frac{ص}{س - ع}$$

فأثبت أن : كلاً من هذه النسب يساوى ٢ (ما لم تكن س + ص = ٠)

ثم أوجد س : ص : ع (البحيرة ١٨) «٣ : ٢ : ٤»

$$\frac{ع}{ب + أ - ح} = \frac{ص}{أ + ح - ب} = \frac{س}{ح + ب - أ}$$

فأثبت أن : $\frac{ع + ص}{ب} = \frac{س + ص}{أ}$ (بوسعيد ١٩)

$$\frac{ع}{أ - ح - ٢} = \frac{ص}{ح - ب - ٢} = \frac{س}{ب + أ - ٢}$$

فأثبت أن : $\frac{ع + ٢ص + س}{ب + أ - ٢} = \frac{٢س + ص}{٢٤ + أ - ح}$ (مطروح ١٩، القليوبية ١٨، البحيرة ١٧)

١٤ إذا كان : $\frac{ب}{ص - ٢} = \frac{٢}{ص - ٢}$ فأثبت أن : $\frac{س}{ص} = \frac{ب + ٢}{ص - ٢ + ٢}$

١٥ إذا كان : $\frac{ب}{ص + ٢} = \frac{٢}{ص + ٢} = \frac{٢}{ص - ٣} = \frac{٢}{ص + ٤}$ فأثبت أن : $\frac{٧}{١٧} = \frac{ب + ٢}{ص + ٤}$

١٦ إذا كان : $\frac{٢}{٧} = \frac{ب}{٧} = \frac{٢}{٣}$ فأوجد قيمة : $\frac{ب + ٢}{ص - ب}$ (لش. سيناء ٩٠)

١٧ إذا كان : $\frac{س + ع}{٨} = \frac{ع + ص}{٥} = \frac{س + ص}{٧}$

فأثبت أن : $٥ = \frac{س + ص + ع}{س - ع}$ (المثوبة ٦)

١٨ إذا كان : $\frac{٢ + ح}{٧} = \frac{ح + ب}{٥} = \frac{ب + ٢}{٤}$

فأثبت أن : $\frac{٢}{٣} = \frac{ح + ب + ٢}{٨}$ (ألف الشبلة ٥)

١٩ إذا كان : $\frac{س + ع}{٦} = \frac{ع + ص}{٨} = \frac{س + ص}{٣}$

فأثبت أن : $\frac{١٧}{٥٠} = \frac{س + ص + ع}{س + ٢ + ص + ٣ + ع}$ (ألف الشبلة ٢٠)

٢٠ إذا كان : $\frac{س + ع}{٧} = \frac{ع + ص}{٨} = \frac{س + ص}{٥}$

فأثبت أن : $\frac{ع}{٥} = \frac{ص}{٣} = \frac{س}{٢}$ (الوادي الجديد ١٧)

٢١ إذا كان : $\frac{س + ص - ع}{٨} = \frac{س - ص}{١١} = \frac{س + ص}{٢٥}$

فأثبت أن : $س : ص : ع = ١٨ : ٧ : ١٧$

٢٢ إذا كان : $\frac{٢ + ح + ٥}{س + ع + ١٠} = \frac{٥ + ب + ٣}{ع + ١٠ + ص + ٦} = \frac{ب + ٢}{ص + ٦}$

فأثبت أن : $\frac{س}{ص} = \frac{٢}{ب}$ ثم أوجد : $ب : ص : ح$

« س : ٢ : ص : ٢ : ع »

٢٣ إذا كان : $\frac{ب}{ص + ٢} = \frac{٢}{ص - ٢} = \frac{٢}{ص + ٤}$

فأثبت أن : $١٣ س + (٢ - ح) (٢٢ - ب) + ٥ ص + (٢ + ب) = \text{صفر}$

إذا كان: $\frac{ص}{٢} = \frac{س}{٧}$

فأثبت أن: (٢س - ٣ص)، (س + ٢ص)، ١٠، ٢٦ متناسبة. (الأقصر ١٩)

إذا كان: $\frac{٢}{٥} = \frac{١}{٢}$ ، $\frac{٢}{٧} = \frac{١}{٣}$ ، $\frac{٢}{٧} = \frac{١}{٣}$

فأوجد قيمة المقدار: $١ + ب + ح$ بدلالة ٢

«٩٥»


إذا كان: $\frac{٢}{٣} = \frac{١}{٢}$ ، $\frac{٢}{٥} = \frac{١}{٣}$ ، $٧٥ = ح + ب + ١$

(البحر الأحمر ١٦) «١٨، ٢٧، ٣٠»

فأوجد قيمة كل من: ١، ب، ح

تطبيق هندسي

في الشكل المقابل:



إذا كان: $\Delta أ ب ح \sim \Delta د ه و$

بحيث: $١ = ح = ٢$ وكان محيط $\Delta د ه و = ٢٢$ سم

«٣٣ سم»

فأوجد: محيط $\Delta أ ب ح$

للمتفوقين

إذا كان: $\frac{ح}{س - ع + ص} = \frac{ب}{س + ص - ع} = \frac{١}{س - ص + ع}$

فأثبت أن: كل نسبة $\frac{١س + ٢ص + ٣ح}{٢ع + ٣ص + ٤س}$

إذا كان: $\frac{٢س + ٣ص}{س} = \frac{٤ص + ع}{ص} = \frac{٤ع + ٣س}{ع}$ فأوجد النسبة س : ص : ع

«٣ : ٣ : ١»

ثم أثبت أن: $\frac{٤}{٣} = \frac{٢س + ٣ص + ٤ع}{س - ٢ص + ٣ع}$

إذا كان: $\frac{١ - ح}{٢} = \frac{٢ - ب}{٣} = \frac{٢ + ١}{٥}$

فأثبت أن: $١ = ٢ - ب + ح = ٠$

$$\frac{٥}{٧} = \frac{١ - ب - ٢}{٢ + ب - ح} \quad [٢]$$

مثال ١

أوجد الوسط المتناسب بين كل كميتين :

١. ٢٠ ، ٥ ٢. ٢ ل ٢ م ٣. ٣ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢

الحل

١. الوسط المتناسب $\pm = \sqrt{20 \times 5} = \pm 10$

٢. الوسط المتناسب $\pm = \sqrt{2 \times 2} = \pm 2$

٣. الوسط المتناسب $\pm = \sqrt[3]{3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2} = \pm 3$

مثال ٢

أوجد الثالث المتناسب لكل كميتين :

١. ١٨ ، ١٢ ٢. ٨ - من ٢ ص ٤ ، ٤ - من ٢ ص

الحل

١. نفرض أن الثالث المتناسب هو ح

$\therefore \frac{18}{12} = \frac{12}{ح} \Rightarrow ح = \frac{18 \times 12}{12} = 27$

٢. نفرض أن الثالث المتناسب هو ح

$\therefore \frac{٨ - من ٢ ص ٤}{ح} = \frac{٤ - من ٢ ص ٤}{ح}$

$\therefore ح = \frac{٤ - من ٢ ص ٤ \times ٨ - من ٢ ص ٤}{٨ - من ٢ ص ٤ - ٤ - من ٢ ص ٤} = \frac{١٦ - من ٢ ص ٤}{٨ - من ٢ ص ٤} = ٢ - من ٢ ص$

حاول بنفسك ١

١. أوجد الوسط المتناسب بين ١٨ ، ٣٢ ٢. أوجد الأول المتناسب للعددين ٨ ، ١٦

الدرس

3

التناسب المتسلسل

تعريف

يقال إن الكميات ١ ، ٢ ، ٣ ، ح في تناسب متسلسل إذا كان :

$\frac{١}{٢} = \frac{٢}{٣}$ أو $\frac{٢}{٣} = \frac{٣}{ح}$

في هذا التناسب يسمى ١ بالأول المتناسب ، ح بالثالث المتناسب.

أما ٢ فتسمى بالوسط المتناسب بين ١ ، ح

فمثلاً : الأعداد ٤ ، ٦ ، ٩ تكون تناسباً متسلسلاً

لأن : $\frac{٤}{٦} = \frac{٦}{٩}$ أو لأن : $٩ \times ٤ = ٦^2$

حيث ٦ هو الوسط المتناسب ، ٤ الأول المتناسب ، ٩ الثالث المتناسب.

لاحظ أنه

- إذا كان ١ ، ٢ ، ٣ ، ح في تناسب متسلسل فإن : $١ = ٢ = ح$ أي $١ = ٢ = ح$
- والكميتان ١ ، ح إما أن تكونا موجبتين معاً أو سالبتين معاً.
- لأي عددين س ، ص موجبتين معاً أو سالبتين معاً يوجد وسطان متناسبان هما : $٢ - من س$ و $٢ - من ص$

مثال ٤

إذا كانت ب وسطاً متناسباً بين أ ، ح فأثبت أن :

$$\frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح} \quad ١$$

الحل

ب وسط متناسب بين أ ، ح ، أ ، ب ، ح ، ح ففى تناسب متسلسل.

$$\text{نفرض أن : } \frac{ب}{أ} = \frac{ب}{ح} = م \quad \therefore \frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح} = ١$$

$$(١) \quad \frac{١-م}{م} = \frac{(١-م) ح}{م ح} = \frac{ح-أ}{م ح} = \frac{ب-أ}{م} \quad ١$$

$$(٢) \quad \frac{١-م}{م} = \frac{(١+م) (١-م) ح}{(١+م) ح} = \frac{(١-م) ح}{(١+م) ح} = \frac{ح-أ}{ح+أ} = \frac{ب-أ}{ب+أ}$$

$$\therefore \text{من (١) ، (٢) ينتج أن : } \frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح}$$

$$(١) \quad \frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح} \quad \therefore \frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح} = ١$$

$$(ب-أ) (ب+ح) = (ب-ح) (ب+أ)$$

$$ب(ب+ح) - أ(ب+ح) = ب(ب+أ) - ح(ب+أ)$$

$$(٢) \quad ب(ب+ح) - أ(ب+ح) = ب(ب+أ) - ح(ب+أ)$$

$$\therefore \text{من (١) ، (٢) ينتج أن : } \frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح}$$

حاول بنفسك ٢

إذا كانت أ ، ب ، ح ففى تناسب متسلسل أثبت أن : $\frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح}$

ملاحظة

إذا كان : أ ، ب ، ح ففى تناسب متسلسل وفرضنا أن : $\frac{ب}{أ} = \frac{ب}{ح} = م$

$$\therefore \frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح}$$

(١)

فإن : $\frac{ب}{أ} = \frac{ب}{ح} = م$ وبالتعويض عن ب من (١)

$$\therefore \frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح}$$

$$\therefore \frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح}$$

أى أنه :

$$\text{إذا كان : } \frac{ب}{أ} = \frac{ب}{ح} = م \quad \text{فإن : } \frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح}$$

مثال ٣

إذا كانت أ ، ب ، ح ففى تناسب متسلسل فأثبت أن : $\frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح}$

الحل

$$\text{نفرض أن : } \frac{ب}{أ} = \frac{ب}{ح} = م \quad \therefore \frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح}$$

$$\therefore \frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح} = ١$$

$$\frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح} = ١$$

$$\frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح} = ١$$

$$\text{من (١) ، (٢) ينتج أن : } \frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح}$$

طالع آخر :

$$\therefore \frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح}$$

$$\therefore \text{الطرف الأيمن} = \frac{ب-أ}{ب+أ} = \frac{ب-ح}{ب+ح} = \frac{ب-أ}{ب+أ}$$

تعميم تعريف التناسب المتسلسل

الكميات a, b, c, d, \dots تكون في تناسب متسلسل إذا كان: $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = \dots$

فمثلاً: الأعداد ١٦، ٢٤، ٣٦، ٥٤ في تناسب متسلسل.

$$\text{لأن } \frac{16}{24} = \frac{24}{36} = \frac{36}{54} \quad \left(\frac{2}{3} = \text{كل نسبة} \right)$$

ملاحظة

إذا كانت a, b, c, d, \dots في تناسب متسلسل وفرضنا أن: $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = \dots = \frac{1}{m}$

| | | |
|-----|---|--|
| (١) | $\therefore c = \frac{b}{m}$ | فإن: $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{1}{m}$ |
| | $\therefore b = \frac{a}{m}$ وبالتعويض من (١) | $\therefore \frac{a}{\frac{a}{m}} = \frac{1}{m}$ |
| (٢) | $\therefore d = \frac{c}{m}$ | $\therefore b = \frac{a}{m}$ |
| | $\therefore c = \frac{a}{m^2}$ وبالتعويض من (٢) | $\therefore \frac{a}{\frac{a}{m^2}} = \frac{1}{m}$ |
| | $\therefore d = \frac{a}{m^3}$ | $\therefore \frac{a}{\frac{a}{m^3}} = \frac{1}{m}$ |

أى أنه:

إذا كان: $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = \frac{1}{m}$ فإن:

$$\left. \begin{array}{l} c = \frac{b}{m} \\ d = \frac{c}{m} \\ e = \frac{d}{m} \end{array} \right\}$$

مثال ٥

إذا كانت a, b, c, d, \dots في تناسب متسلسل فأثبت أن: $\frac{a-b}{b-c} = \frac{b-a}{a-c}$

الحل

نفرض أن: $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = \frac{1}{m}$

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{1}{m}, \quad \frac{b}{c} = \frac{1}{m}, \quad \frac{c}{d} = \frac{1}{m}$$

$$(١) \quad 1 + m = \frac{(1+m)(1+m)}{1+m-m^2} = \frac{(1+m)^2}{(1+m-m^2)} = \frac{1+m^2+m}{1+m-m^2} = \frac{1+m}{1-m}$$

$$(٢) \quad 1 + m = \frac{(1+m)(1-m)}{(1-m)} = \frac{(1-m)^2}{(1-m)} = \frac{1-m^2}{1-m} = \frac{1-m}{1-m}$$

من (١)، (٢) ينتج أن: $\frac{1-m}{1-m} = \frac{1+m}{1-m}$

حاول بنفسك

إذا كانت a, b, c, d, \dots في تناسب متسلسل فأثبت أن: $\frac{a+b}{b+c} = \frac{b+c}{c+d}$

مثال ٦

إذا كانت الكميات a, b, c, d, \dots في تناسب متسلسل

فأثبت أن: $(b^2 - c^2) : (c^2 - d^2) = (a^2 - b^2) : (b^2 - c^2)$

الحل

نفرض أن: $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = \frac{1}{m}$

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{1}{m}, \quad \frac{b}{c} = \frac{1}{m}, \quad \frac{c}{d} = \frac{1}{m}$$

ولإثبات أن: $(b^2 - c^2) : (c^2 - d^2) = (a^2 - b^2) : (b^2 - c^2)$

يعنى إثبات أن: $(b^2 - c^2) : (c^2 - d^2) = (a^2 - b^2) : (b^2 - c^2)$

$$\therefore (b^2 - c^2) : (c^2 - d^2) = (a^2 - b^2) : (b^2 - c^2)$$

$$(١) \quad \frac{b^2 - c^2}{c^2 - d^2} = \frac{a^2 - b^2}{b^2 - c^2}$$

$$(b^2 - c^2)(b^2 - c^2) = (a^2 - b^2)(c^2 - d^2)$$

$$(٢) \quad \frac{b^2 - c^2}{c^2 - d^2} = \frac{a^2 - b^2}{b^2 - c^2}$$

من (١) ، (٢) ينتج أن : $(٢ - ب) (٣ - ح) = (٢ - ب) (٤ - د)$

∴ $(٢ - ب) (٣ - ح)$ وسط متناسب بين $(٢ - ب)$ ، $(٣ - ح)$ ، $(٤ - د)$

حل آخر : ∴ $٢ ، ب ، ٣ ، ح ، ٤$ في تناسب متسلسل

$$\therefore \frac{٣}{٤} = \frac{ب}{٣} = \frac{٢}{ب}$$

وبطرح مقدم وتالي النسبة الثانية من مقدم وتالي النسبة الأولى :

$$\therefore \frac{ب - ٢}{٣ - ب} = \text{إحدى النسب}$$

وبطرح مقدم وتالي النسبة الثالثة من مقدم وتالي النسبة الثانية :

$$\therefore \frac{٣ - ب}{٤ - ح} = \text{إحدى النسب}$$

$$\text{من (١) ، (٢) ينتج أن : } \frac{٣ - ب}{٤ - ح} = \frac{ب - ٢}{٣ - ب}$$

∴ $(٢ - ب) (٣ - ح)$ وسط متناسب بين $(٢ - ب)$ ، $(٣ - ح)$ ، $(٤ - د)$

(١) $٢ = ب ، ٣ = ح ، ٤ = د$: (فكرة الحل) : أثبت بنفسك !
(٢) $٢ = ب ، ٣ = ح ، ٤ = د$: (فكرة الحل) : أثبت بنفسك !
٣ (٨)

تمارين 7

على التناسب المتسلسل

اختبار
تفاعله



أسئلة كتاب الوزارة

1 أوجد الوسط المتناسب بين :

(الجينة ٠٩)

$$٨- ، ٢- \boxed{٣}$$

$$٢٥ ، ٩ \boxed{٢}$$

$$٢٧ ، ٣ \boxed{١}$$

$$٢(م-ل) ، ٢(م+ل) \boxed{٦}$$

$$٢٨ ، ٩٢ \boxed{٥}$$

$$١٢٥ ، \frac{1}{٥} \boxed{٤}$$

2 أوجد الثالث المتناسب لكل مما يأتي :

$$٣- ، ٢- \boxed{٣}$$

$$٥- ، ٢- \boxed{٢}$$

$$١٢ ، ٦ \boxed{١}$$

3 إذا كانت وسطاً متناسباً بين ٢ ، ح فأثبت أن :

(الإسماعيلية ١٧)

$$\frac{٢}{ح} = \frac{٢٢+٢٣}{٢٢+٢٣} \boxed{٢}$$

(الجينة ١٤)

$$\frac{٢}{ح} = \frac{١}{ح} \boxed{١}$$

(القاهرة ٢٠ ، القليوبية ١٨)

$$\frac{٢}{ح} = \frac{٢٢+٢٣}{٢٢+٢٣} \boxed{٤}$$

$$\frac{٢٣+٢}{٢+٢٣} = \frac{٢-٢}{٢-٢} \boxed{٣}$$

(المنوفية ١١)

$$\frac{٢٢}{ح} = \frac{٢٢+٢٣}{٢٢+٢٣} \boxed{٦}$$

$$\frac{ح}{٢} = ٢ \left(\frac{ح-٢}{٢-٢} \right) \boxed{٥}$$

$$\frac{٢}{ح} = \frac{ح}{٢} = \frac{٢٢-٢٣}{٢٢-٢٣} \boxed{٨}$$

$$\frac{٢}{ح} = \frac{٢٢-٢٣}{٢٢-٢٣} \boxed{٧}$$

$$\frac{٢٢-٢٣}{٢٢-٢٣} = \frac{٢٢+٢٣+٢٣}{٢٢+٢٣+٢٣} \boxed{٩}$$

(الرقيلية ١٩ ، أسوان ١٦ ، بورسعيد ١٧)

$$\frac{٢٢}{ح} = \frac{٢}{ح} + \frac{٢}{ح} \boxed{١٠}$$

$$\frac{٢}{ح} = \frac{٢+٢+٢}{٢+٢+٢} \boxed{١١}$$

(الغربية ١٧)

$$\frac{٢}{ح+٢} = \frac{٢}{(ح+٢)-٢} \boxed{١٢}$$

٤ إذا كانت : $أ، ب، ح، د$ في تناسب متسلسل فأثبت أن :

$$\frac{د - أ}{د - ب} = \frac{أ + ب}{أ + ح} \quad (٢)$$

$$\frac{د + ب}{د + ح} = \frac{ب - أ}{ب - ح} \quad (١)$$

$$\frac{د + ب - أ}{ب - أ} = \frac{د - أ}{أ + ب + ح} \quad (٤)$$

$$\frac{د - ب}{د + ح - ب} = \frac{أ - ب}{أ + ب - ح} \quad (٣)$$

$$\frac{د}{ب} = \frac{د - ب}{ب - ح} \quad (٥)$$

$$\frac{ب}{د} = \frac{د - ب}{د - ح} \quad (٦)$$

$$\frac{د + ب}{ب} = \frac{د - ب}{ب - ح} \quad (٧)$$

$$\frac{د}{د + ب} = \frac{ب}{ب + ح} \quad (٨)$$

$$\frac{د - ب + ب}{د - ب} = \frac{د - ب + ب}{د - ب} \quad (١٠)$$

(الدفعلية ١١)

$$\frac{د}{ب} = \frac{د - ب + ب}{د - ب + ح} \quad (٩)$$

$$\frac{د + ب}{د + ح} = \frac{د - ب + ب}{د - ب + ح} \quad (١٢)$$

$$\frac{د}{د + ح} = \frac{د - ب + ب}{د - ب + ح} \quad (١١)$$

$$١ - \frac{د}{ب} + \frac{ب}{د} = \frac{د + ب}{(د + ح)} \quad (١٤)$$

(الشرقية ١٥)

$$\frac{د}{ب} = \frac{د + ب}{د + ح} \quad (١٣)$$

٥ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(البجيرة ١١)

١ الثالث المتناسب للعددين ٩ ، ١٢ هو

١٠.٨ (د)

١٦ (ج)

٨ (ب)

١٦- (أ)

(ج. سيناء ١٧)

٢ الوسط المتناسب بين س ، ص هو

(د) س ص

(ج) $\sqrt{س ص}$

(ب) $\sqrt{س} - \sqrt{ص}$

(أ) $\sqrt{س} + \sqrt{ص}$

٣ إذا كانت : $ل، م، ع$ في تناسب متسلسل فإن : $ل =$

(د) $\frac{م}{ع}$

(ج) $\frac{م}{ع}$

(ب) م ع

(أ) $\sqrt{م ع}$

٤ إذا كان العدد ٦ هو الوسط المتناسب الموجب للعددين م ، ٢

فإن : م = (أسوأ/أفضل)

۳۶ (د) ۱۸ (ج) ۱۲ (ب) ۸ (ا)

٥ إذا كان : $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = \frac{6}{15} = \frac{8}{20}$ فإن : $2 = \dots\dots\dots$ (المناسبة ١٢)

٢٥ × ٢ (ج) ١٠ (د) ٤٠ (ب) ٢٢ × ٥ (ا)

٦ إذا كانت : $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{1}{1.5}$ فإن : $\frac{1}{5} = \dots\dots\dots$ (الشرقية ١٣)

۱۶ (۲) ۱۷ (۳) ۱۸ (۴) ۱۹ (۵)

(٧) إذا كانت : β_6^2 , β_{72} ، حركات متناسبة فإن : $H = \dots\dots\dots$

$$\frac{2}{3} \text{ (ج)} \qquad \frac{2}{3} \text{ (د)} \qquad ۱۲۲ \text{ (ب)} \qquad ۳ - (۱)$$

⬆ إذا كان : ٩ ، ٢ ، ٤ ، ٦ في تناسب متسلسل

فإن : $2 + \dots = \dots$ (الفعلية ٢٠)

٩ (ج) - ٦ (ج) ٤ (ب) ٢ (١)

٩ الوسط المتناسب بين $(٢ - س)$ ، $(٢ + س)$ هو

$$\sqrt[2]{s-4} \quad \sqrt[2]{s-4} \pm (ج) \quad \sqrt[2]{s-4} \quad \sqrt[2]{s+2} (i)$$

١٠ العدد الذي إذا أُضيف لكل من الأعداد ١ ، ٢ ، ٦ تصبح في تناسب متسلسل

هو.....

٤ (ج) ٣ (د) ٢ (هـ) ١ (ا)

إذا كان : ٢ ، ٣ ، ٩ ، ب في تناسب متسلسل أوجد قيمة كل من : ٢ ، ب

(الأفصل ١٦) "١، ٢٧"

إذا كان: ٣، ل، ١٢، م في تناسب متسلسل أوجد قيمة كل من: ل، م «٦ ±، ٢٤ ±»

٨ أكمل ما يأتي :

١ إذا كانت : ٧ ، س ، $\frac{1}{ص}$ في تناسب متسلسل فإن : س^٢ ص =

٢ الثالث المتناسب للكميتين : ٩ (١ + س) ، ٦ (١ - س) هو

٣ الوسط المتناسب للكميتين : ٩ س^٢ - ٢٥ ص^٢ ، $\frac{٣س + ٥ص}{٣س - ٥ص}$ هو

٤ إذا كان : $\frac{ص}{س} = \frac{س}{ع} = \frac{٢}{٥}$ فإن : ص = ع

٥ إذا كان : ١ ، ب ، ح ، د ، هـ في تناسب متسلسل وكل نسبة من النسب تساوى

الثابت م فإن : $\frac{١}{هـ} = \dots\dots\dots$

٦ إذا كانت : ١ ، ب ، ح كميات متناسبة فإن : $\frac{٢ب + ٢ح}{٢ب + ٢ح} = \dots\dots\dots$

٧ العدد الحقيقي س الذي يجعل س + ١ ، س + ٥ ، س + ١٢ متناسبة هو

٨ إذا كانت : ٢ ، ٤ + س ، ١٨ كميات متناسبة ، س \in ح _ فإن : س =

٩ أوجد العدد الذي إذا طرح من الأعداد ٣ ، ٧ ، ١٩ فإنها تكون تناسباً متسلسلاً.

(الأقصر ١٧) «١»

١٠ إذا كان ب وسطاً متناسباً بين ١ ، ح وكان : ١ = ح = ٤

فأوجد قيمة : ٢ + ب + ح^٢

(الفيزياء ١٧) «٢١»

١١ إذا كانت ب وسطاً متناسباً بين ١ ، ح وكانت ح وسطاً متناسباً بين ب ، د

فأثبت أن : $\frac{٢}{ب} + \frac{٢}{ح} + \frac{٢}{د} = \frac{٢}{ب} + \frac{٢}{ح} + \frac{٢}{د}$

١٢ إذا كان : ص^٢ = س ع

فأثبت أن : $\frac{ص}{ع} = \frac{س(ص - ع)}{ص(ص - ع)}$

١٣ إذا كان : ب^٢ = ١ ح ، ح^٢ = ب د

أثبت أن : $\frac{٢٢ + ٢٣}{٢٤ - ٢٣} = \frac{٢٢ + ٢٣}{٢٤ - ٢٣}$

١٤ إذا كان : $\frac{2}{2} = \frac{2}{2}$

أثبت أن : ب وسط متناسب بين ٢ ، ح حيث ٢ ح كمية موجبة. (الإسكندرية ١٥ ، بنى سوف ١٥)

١٥ إذا كان : ٢ ، ب ، ح ، د فى تناسب متسلسل

أثبت أن : (ب + ح) وسط متناسب بين : (٢ + د) ، (د + ح)

١٦ إذا كانت : ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ كميات موجبة فى تناسب متسلسل

فأثبت أن : $\sqrt{\frac{5}{8}} = \sqrt{\frac{6}{7}}$

١٧ إذا كان : ب وسطاً متناسباً بين ٢ ، ح أثبت أن : $\frac{2}{2} = \frac{2}{2}$

تطبيقات هندسية

١٨ س ، ص ، ع أطوال أضلاع متناسبة فى مثلث ، س + ص = ١٥ سم

« ٣ : ٢ »

ص + ع = ٢٢,٥ سم فأوجد س : ص

١٩ أ ب ح مثلث فيه : $\angle C = 60^\circ$ فإذا كانت قياسات زواياه د ، ب ، د ح على

« ٦٠ ، ٦٠ »

الترتيب فى تناسب متسلسل فأوجد : د (٢) ، د (ب)

للمتفوقين

٢٠ إذا كان : $\frac{2}{2} = \frac{2}{2} = \frac{2}{2}$

« $\frac{1}{2}$ »

فأوجد مجموعة الحل للمعادلة : ٢ - ٢ - ٢ - ٢ - ٢ = ٠


٢١ إذا كانت ٥ وسطاً متناسباً بين س ، ص

« ٥ ، ٢ »

فأوجد الوسط المتناسب بين : $(\frac{1}{2} + \frac{1}{2})$ ، $(\frac{1}{2} + \frac{1}{2})$

مثال ١

بين أيًا من الأشكال البيانية الآتية يمثل تغيرًا طرديًا بين s ، v :



الحل

الأشكال البيانية التي تمثل تغيرًا طرديًا بين s ، v هي (ج) ، (هـ) ، (ز) لأن كلاً منها عبارة عن مستقيم يمر بنقطة الأصل.

مثال ٢

إذا كان: $٢٤ = ٢٤ + ٢٤$ فأثبت أن: $٢٤ \propto ٢٤$

الحل

لإثبات أن: $٢٤ \propto ٢٤$ نثبت أن: $٢٤ = ٢٤$ بحيث $٢٤ \neq ٠$

$$\therefore ٢٤ = ٢٤ + ٢٤ \quad \therefore ٢٤ = ٢٤ + ٢٤ - ٢٤ \quad \therefore ٢٤ = ٢٤ - ٢٤ + ٢٤$$

$$\therefore ٢٤ = ٢٤ \quad \therefore ٢٤ = ٢٤$$

حاول بنفسك ١

إذا كان: $\frac{١}{٢} = \frac{٢ - ٥}{٩ - ٣}$ لجميع قيم $s \in \mathbb{R}$ ، $v \in \mathbb{R}$ أثبت أن: $s \propto v$



الدرس

4

التغير الطردى والتغير العكسى

أولاً التغير الطردى

تعريف

يقال إن v تتغير طرديًا مع s وتكتب $v \propto s$

إذا كان: $v = ks$ (أى: $\frac{v}{s} = k$) حيث k ثابت $k \neq 0$

والعلاقة $v = ks$ بين v و s بيانيًا خط مستقيم يمر بنقطة الأصل $(0, 0)$


فمثلاً: محيط المربع (C) يتغير طرديًا مع طول ضلعه (L) وتكتب $C \propto L$

لأن: $C = 4L$ ، $\therefore \frac{C}{L} = 4$

والجدول التالى يوضح بعض قيم L وقيم C المناظرة لها

| طول الضلع (L) | ١ | ٣ | ٤ |
|-----------------|---|----|----|
| المحيط (C) | ٤ | ١٢ | ١٦ |

والشكل المقابل يمثل بيانيًا العلاقة بين C ، L



خاصية

إذا كان : ص ٣٠

وأخذ المتغير من القيمتين ١، ٣، وأخذ المتغير من القيمتين ١، ٣، ص

$$\frac{\frac{ص}{١}}{\frac{ص}{٣}} = \frac{١}{٣}$$

السبب : ص ٣٠

فإن : ص = م حيث م ثابت ≠ ٠

عند ص = ١، ص = ٣، فإن : ص = م

وعند ص = ٣، ص = ١، فإن : ص = م

بقسمة (١) على (٢) : $\frac{ص}{١} = \frac{ص}{٣}$

$$\frac{ص}{١} = \frac{ص}{٣}$$

مثال ٣

إذا كانت : ص ٣٠ وكانت : ص = ٢٠ عند ص = ٧ فأوجد : ص عندما ص = ١٤

الحل

ص ٣٠

$$\frac{ص}{١} = \frac{ص}{٣}$$

حيث : ص = ٢٠، ص = ٧، ص = ؟، ص = ١٤

$$\frac{٧}{١٤} = \frac{٢٠}{ص}$$

$$٤٠ = \frac{١٤ \times ٢٠}{٧}$$

طالع آخر : ص ٣٠

ص = م حيث م ثابت ≠ ٠

$$٧ \times م = ٢٠$$

$$ص = \frac{٢٠}{٧}$$

$$١٤ \times \frac{٢٠}{٧} = ص$$

ص = ٢٠ عندما ص = ٧

$$\frac{٢٠}{٧} = م$$

وعندما ص = ١٤

$$٤٠ = ص$$

مثال ٤

إذا كان ص ، ص متغيرين حيث ص ٣٠ المعكوس الضربى للمقدار $\frac{١}{٣}$

وأخذت ص القيمة ١٨ عندما أخذت ص القيمة ٢

فأوجد العلاقة بين : ص ، ص ثم أوجد قيم : ص عندما ص ∈ {٠، ١، ٤}

الحل

ص ٣٠ المعكوس الضربى للمقدار $\frac{١}{٣}$

ص = م حيث م ثابت ≠ ٠

ص = ١٨ عندما ص = ٢

$$١٨ \times م = ٢$$

$$\frac{٩}{٤} = \frac{١٨}{٢} = م$$

عندما ص = ٠، ص = ٠ × $\frac{٩}{٤}$ = ٠

$$١٤٤ = ٦٤ \times \frac{٩}{٤} = ص$$

مثال ٥

إذا كان (ع) يرمز لحجم مخروط دائري قائم ارتفاعه ثابت وكان (ع) يتغير بتغير مربع طول نصف قطر قاعدة المخروط (نق) وكان حجم المخروط ٤٧٧ سم^٣ عندما كان طول نصف قطر قاعدته ١٥ سم فأوجد حجم المخروط عندما يكون طول نصف قطر قاعدته ١٠ سم

الحل

ص ٣٠

$$\frac{ع}{١٠} = \frac{ع}{١٥}$$

$$\frac{ع}{١٠} = \frac{ع}{١٥}$$

حيث : ع = ٤٧٧ سم^٣، نق = ١٥ سم، ع = ؟، نق = ١٠ سم

$$\frac{٤٧٧}{١٥} = \frac{ع}{١٠} \Rightarrow ع = \frac{٤٧٧ \times ١٠}{١٥} = ٣١٨$$

حاول بنفسك ٢

إذا كانت : ص ٣٠ وكانت ص = ٢ عندما ص = ٤٠ فأوجد قيمة : ص عندما ص = ٣

ثانيًا التغير العكسي

تعريف

يقال إن ص تتغير عكسيًا مع س وتكتب ص $\propto \frac{1}{S}$

إذا كانت $\frac{P}{S} = (أى : س = ص = م)$ حيث م ثابت \neq صفر

فمثلًا: السرعة المنتظمة (ع) تتغير عكسيًا مع الزمن (ز) بفرض ثبوت المسافة المقطوعة لأن:

$$ع = \frac{ف}{ز} \text{ ، } ع \propto \frac{1}{ز} \text{ ، } ع \propto \frac{1}{ز}$$

وفى هذه الحالة نقول أن السرعة تتغير طرديًا بتغير المعكوس الضربى للزمن (ز) فنكتب:

$$ع \propto \frac{1}{ز}$$

مثال ٦

إذا كان: $٢٠ - ٢٠ = ٢٠ - ٢٠ = ٢٠ - ٢٠$ فأثبت أن: ٢٠ تتناسب عكسيًا مع ٢٠

الحل

لإثبات أن: ٢٠ تتناسب عكسيًا مع ٢٠ نثبت أن: $٢٠ = م$ حيث م ثابت \neq صفر

$$\therefore ٢٠ - ٢٠ = ٢٠ - ٢٠ = ٢٠ - ٢٠$$

$$\therefore ٢٠ - ٢٠ = ٢٠ - ٢٠ = ٢٠ - ٢٠$$

$$\therefore ٢٠ - ٢٠ = ٢٠ - ٢٠ = ٢٠ - ٢٠$$

حاول بنفسك ٢

إذا كان: $٢٠ - ٢٠ = ٢٠ - ٢٠ = ٢٠ - ٢٠$ فأثبت أن: $٢٠ \propto \frac{1}{٢٠}$

خاصية

إذا كان: ص $\propto \frac{1}{س}$

وأخذ المتغير س القيمتين $س_١$ ، $س_٢$ وتبعًا لذلك أخذ المتغير ص القيمتين $ص_١$ ، $ص_٢$

على الترتيب فإن: $\frac{ص_١}{ص_٢} = \frac{س_٢}{س_١}$

السبب: \therefore ص $\propto \frac{1}{س}$ فإن: ص = $\frac{م}{س}$ حيث م ثابت $\neq ٠$

(١) عند $س = س_١$ ، ص = $ص_١$ فإن: $ص_١ = \frac{م}{س_١}$

(٢) وعند $س = س_٢$ ، ص = $ص_٢$ فإن: $ص_٢ = \frac{م}{س_٢}$

بقسمة (١) على (٢): $\therefore \frac{ص_١}{ص_٢} = \frac{\frac{م}{س_١}}{\frac{م}{س_٢}} = \frac{س_٢}{س_١}$

مثال ٧

إذا كان طول مستطيل (ل) يتغير عكسيًا بتغير عرضه (ع) بفرض ثبوت مساحة المستطيل ،

وكانت ل = ١٢ سم عندما ع = ٨ سم فأوجد قيمة: ل عندما ع = ٣ سم

الحل

$$\therefore ل \propto \frac{1}{ع}$$

$$\therefore \frac{ل}{ل_١} = \frac{ع_٢}{ع_١} \text{ حيث } ل_١ = ١٢ \text{ سم ، } ع_١ = ٨ \text{ سم ، } ل_٢ = ٣ \text{ سم ، } ع_٢ = ؟$$

$$\therefore \frac{ل}{١٢} = \frac{٨}{٣} \text{ ، } \therefore ل = \frac{٨ \times ١٢}{٣} = ٣٢ \text{ سم}$$

ط م أم :

$$\therefore \text{ل } x = \frac{1}{x}$$

$$\therefore \text{ل} = 12 \text{ عندما } \text{ع} = 8$$

$$\therefore \text{ل} = 96 \text{ عندما } \text{ع} = 96$$

$$\therefore \text{ل} = 96 \text{ عندما } \text{ع} = 96$$

$$\therefore \text{ل} = \text{ع} = \text{م} \text{ حيث } \text{م} \text{ ثابت } \neq$$

$$\therefore \text{م} = 12 \times 8 = 96$$

$$\text{ع} \text{ عندما } \text{ع} = 2 \text{ سم}$$

$$\therefore \text{ل} = \frac{96}{3} = 32 \text{ سم}$$

مثال ٨

إذا كانت ص تتغير عكسيًا بتغير س وكانت ص = 6 عندما س = 2.5 ، فأوجد العلاقة بين : س ، ص ثم أوجد قيمة : ص عندما س = 5

الحل

$$\therefore \text{ص} = \frac{1}{\text{س}}$$

$$\therefore \text{س} = \text{ص} = \text{م}$$

$$\text{حيث } \text{م} \text{ ثابت } \neq$$

$$\therefore \text{ص} = 6 \text{ عندما } \text{س} = 2.5 \therefore \text{م} = 2.5 \times 6 = 15$$

$$\therefore \text{العلاقة بين س ، ص هي : } \text{س} \text{ ص} = 15$$

$$\text{ع} \text{ عندما } \text{س} = 5$$

$$\therefore \text{ص} = 15$$

$$\therefore \text{ص} = \frac{15}{5} = 3$$

مثال ٩

إذا كانت : ص = 1 + س حيث س تتغير عكسيًا مع س وكانت ص = 17 عندما س = 1/2 أوجد العلاقة بين : س ، ص ثم أوجد قيمة : ص عندما س = 2

الحل

$$\therefore \text{س} \text{ تتغير عكسيًا مع س}$$

$$\therefore \text{س} = \frac{\text{م}}{\text{س}} \text{ حيث } \text{م} \text{ ثابت } \neq$$

$$\therefore \text{ص} = 1 + \frac{\text{م}}{\text{س}}$$

$$\therefore \text{ص} = 17 \text{ عندما } \text{س} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore 17 = 1 + \frac{\text{م}}{\frac{1}{2}} \text{ وبطرح ١ من الطرفين}$$

$$\therefore \text{م} = \frac{1}{2} \times 16 = 8$$

$$\text{ع} \text{ عندما } \text{س} = 2$$

$$\therefore \text{ص} = 1 + \frac{8}{2} = 5$$

$$\therefore 17 = 1 + \frac{\text{م}}{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore \frac{\text{م}}{\frac{1}{2}} = 16$$

$$\therefore \text{ص} = 1 + \frac{8}{2}$$

حاول بنفسك ٤

إذا كانت ص تتناسب عكسيًا مع س وكانت ص = 2 عندما س = 6 احسب قيمة : ص عندما س = 1

تمارين 8

على التغير الطردى والتغير العكسي

أسئلة كتاب الوزارة

١ أكمل ما يأتي :

١ إذا كانت : x ص فإن : y =

٢ إذا كانت : $y = \frac{4}{x}$ حيث m ثابت $m \neq 0$ فإن : x =

٣ إذا كانت : x ص فإن : $y = \frac{1}{x}$ =

٤ إذا كانت : x ص تتغير عكسياً مع y فإن : $y = \frac{1}{x}$ =

٥ إذا كانت : $y = \frac{3}{x}$ ص فإن : x =

٦ إذا كانت : x ص فإن : $y = \frac{5}{x}$ ص تتغير عكسياً مع =

٧ إذا كانت : $y = 2 - x$ ص = فإن : x =

٨ إذا كان : $y = 2 - x$ ص = فإن : x =

٩ إذا كانت : x ص وكانت $y = 2$ عندما $x = 8$ فإن : y =

فإن : y = عندما $x = 12$

١٠ إذا كانت : x ص وكانت $y = \frac{1}{x}$ وكانت $y = 3$ عندما $x = 20$ فإنه عندما $x = 12$ فإن : y =

فإنه عندما $x = 12$ فإن : y =

١١ إذا كانت : x ص وكانت $y = 2$ عندما $x = 4$ فإن : y =

١٢ إذا كانت : x ص وكانت $y = 6$ عندما $x = 4$ فإن : y =

فإن : $y = \frac{ص}{x}$ = (في أبسط صورة)

١٣ إذا كانت : $y = \frac{m}{x}$ حيث m ثابت $m \neq 0$ فإن : y تتغير مع x عند ثبوت x ،

فإن : y تتغير مع x عند ثبوت y ،

فإن : y تتغير مع x عند ثبوت y ،

٢ إذا كانت : y ص تتغير طردياً مع x ، وكانت $y = 20$ عندما $x = 7$ فأوجد : x عندما $y = 40$

١٢ إذا كانت : ص \propto (س + ١) وكانت : س = ٣ عندما ص = ٢

(مطوية ١٠٩) «ص = $\frac{1}{4}(س + ١)$ »

فأوجد العلاقة بين : س ، ص

١٣ إذا كان : $\frac{٥س - ٣ص}{٣س + ٥ص} = ١$ لجميع قيم س \exists ع ، ص \exists ع ، فأثبت أن : ص \propto س

١٤ إذا كان : $\frac{٢+٣}{٦} = \frac{٢+٣}{٦}$ فأثبت أن : ٩ \propto ح (الفيوم ١٧)

١٥ إذا كان : $\frac{٢١س - ٧ص}{٧س - ٤ع} = \frac{٢١س - ٧ص}{٧س - ٤ع}$ فأثبت أن : ص \propto ع (دمياط ١٩ ، القليوبية ١٨ ، القاهرة ١٥)

١٦ إذا كانت : س^٢ ص^٢ - ٦س ص + ٩ = ٠

(ج. سيناء ١٤ ، دمياط ١٣)

فأثبت أن : ص تتغير عكسياً مع س

١٧ إذا كان : ٤س^٢ + ٩س^٢ = ١٢س^٢ أثبت أن : ٩ تتغير طردياً بتغير س (مطوية ١٧)

١٨ إذا كان : س^٢ ص^٢ - ١٤س^٢ + ٤٩ص^٢ = ٠ ، فأثبت أن : ص \propto $\frac{١}{س}$ (الإسكندرية ١٩)

١٩ إذا كان : (٤س + ٧ص) \propto (س + ٢ص) حيث س \exists ع ، ص \exists ع

فأثبت أن : ص \propto س

٢٠ إذا كان : $\left(\frac{١}{س} - \frac{١}{ص}\right) \propto س - ص$ حيث ٩ ثابت ، س \neq ص \neq ٠

فأثبت أن : س تتغير عكسياً مع ص

٢١ بين أيًا من الجداول الآتية يمثل تغيراً طردياً ، وأيها يمثل تغيراً عكسياً ، وأيها لا يمثل تغيراً

طردياً أو عكسياً مع ذكر السبب في كل حالة :

| س | ص | س | ص | س | ص | س | ص |
|---|----|----|----|----|----|-----|----|
| ٣ | ٢٠ | ٥ | ٩ | ٢ | ٩ | ٢ | ٦ |
| ٥ | ١٢ | ١٠ | ١٨ | ٤ | ١٨ | ٢- | ٩- |
| ٤ | ١٥ | ١٥ | ٢٧ | ١٢ | ٥٤ | ١٨- | ١ |
| ٦ | ١٠ | ٢٥ | ٤٥ | ١٦ | ٧٢ | ٩ | ٢- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| س | ٢ | ٤ | ٦ |
| ص | ٦ | ٣ | ٢ |

٢٢ من بيانات الجدول المقابل
أجب عن الأسئلة الآتية :

- ١ بين نوع التغير بين ص ، س
٢ أوجد ثابت التناسب. (الإسماعيلية ١٨ ، دمياط ١٦)
٣ أوجد قيمة ص عندما س = ٣
٤ أوجد قيمة س عندما ص = $2\frac{2}{5}$ « ١٢ ، ٤ ، ٥ »

| | | | | | |
|---|----|---|----|----|----|
| س | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ |
| ص | ١٢ | ٩ | ٣٦ | ٤٨ | ٧٢ |

٢٣ في الجدول المقابل :

- ١ بين نوع التغير بين : ص ، س
٢ أوجد قيمتي : ٩ ، ٣
« ٣ = ٣ ، ٢٤ = ٩ »

٢٤ إذا كانت : ص = ع + ٥ ، وكانت ع تتغير عكسياً مع س ، وكانت ص = ٦ عندما س = ٢
فأوجد العلاقة بين : س ، ص ثم أوجد : ص عندما س = ١

(المنوفية ١٧) « ص = $5 + \frac{2}{3}س$ ، ٧ »

٢٥ إذا كانت : ص = ٩ + س حيث ٩ ثابت ، س تتغير طردياً بتغير س

وكانت : ص = ٣ عندما س = ٠ ، ص = ٥ عندما س = ٢

- ١ أوجد العلاقة بين : س ، ص
٢ أوجد : قيمة ص عندما س = ٧

« ص = $3 + \frac{2}{3}س$ ، $7\frac{2}{3}$ »

٢٦ إذا كانت : ص = ٩ - س وكانت ص $\propto \frac{1}{س}$ وكانت ٩ = ١٨ عندما س = $\frac{2}{3}$

فأوجد العلاقة بين : ص ، س ثم استنتج قيمة : ص عندما س = ١

(الأقصر ١٩ ، كفر الشيخ ١٨ ، السويس ١٨) « ص = $\frac{4}{س}$ ، ٤ »

٢٧ إذا كانت : ص = ٢ + س وكانت ٩ تتغير عكسياً مع س وكانت ٩ = ٥ عندما س = ٢

- أوجد : ١ العلاقة بين ص ، س
٢ قيمة ص عندما س = ٥ (الشرقية ١٧)


« ص = $2 + \frac{1}{س}$ ، ٤ »

٢٨ إذا كانت : $س = ل + ٩$ وكانت ل ∞ ص فأوجد العلاقة بين : ل ، ص

علمًا بأن $س = ٢٤$ عندما $ص = ٥$ ثم أوجد قيمة : ص عندما $ل = ١٢$ « $ل = ٣$ ص = ٤ »

٢٩ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ الشكل البياني الذي يمثل التغير الطردى بين س ، ص هو (الشرقية ١٦)



٢ العلاقة التي تمثل تغيرًا طرديًا بين المتغيرين ص ، س هي (سوحاح ٢٠)

(ا) $س = ٥$ (ب) $ص = س + ٣$ (ج) $\frac{س}{٣} = \frac{٤}{ص}$ (د) $\frac{س}{٢} = \frac{٥}{ص}$

٣ أى العلاقات التالية تمثل تغيرًا عكسيًا بين المتغيرين س ، ص ؟ (البحيرة ١٥)

(ا) $ص = س + ٥$ (ب) $ص = ٤س$ (ج) $\frac{س}{٥} = \frac{٥}{ص}$ (د) $س = ١١$

٤ إذا كانت : ص تتغير عكسيًا مع $س^٢$ ، ل ثابت التناسب فإن :

(ا) $ص = ل = س^٢$ (ب) $ص = ل - س^٢$

(ج) $ص = \frac{ل}{س^٢}$ (د) $ص = \frac{ل}{س}$

٥ إذا كانت : س ، ص كميتين متغيرتين وكان : $\frac{س_١}{ص_١} = \frac{س_٢}{ص_٢} = ١$

فإن : ص ∞

(ا) $س$ (ب) $\frac{١}{س}$ (ج) $س^٢$ (د) $\frac{١}{س^٢}$

٦ إذا كانت : ص ∞ س وكانت $ص = ٥$ عندما $س = ٣$ فإن ثابت التغير =

(ا) ١٥ (ب) ٥ (ج) ٣ (د) $\frac{٥}{٣}$

٧ إذا كانت ص تتغير عكسيًا مع س وكانت $س = \sqrt[٣]{٣}$ عندما $ص = \frac{٢}{٣\sqrt[٣]{٣}}$

فإن ثابت التناسب يساوى (الوادي الجديد ٢٠ ، البحيرة ١٦ ، بني سويف ١٥)

(ا) $\frac{٢}{٣}$ (ب) $\frac{٢}{٣}$ (ج) ٢ (د) ٦

٨ إذا كان : $s = 0$ ثابت فإن : s تتغير عكسياً مع (الإسماعيلية ١٠٨)
 (أ) $\frac{1}{s}$ (ب) s^0 (ج) s (د) s^2

٩ إذا كانت : $s \propto \frac{1}{\sqrt{s}}$ فإن : s تتناسب (مطروحة ١٠٩)

(أ) طردياً مع s^2 (ب) عكسياً مع s^2

(ج) عكسياً مع s (د) عكسياً مع \sqrt{s}

١٠ إذا كانت : $s^2 + 4s = 4$ فإن : (الإسماعيلية ١١٥)

(أ) $s \propto s$ (ب) $s \propto s^2$ (ج) $s \propto \frac{1}{s}$ (د) $s \propto \frac{1}{s^2}$

١١ إذا كانت : $s^2 + \frac{1}{s} = \frac{1}{s}$ فإن : (المنوفية ١١٦)

(أ) $s \propto s$ (ب) $s \propto s$ (ج) $s \propto s^2$ (د) $s \propto \frac{1}{s}$

١٢ إذا كانت : $s = 3 - 6$ فإن : $s \propto$ (الشرقية ١١٤)

(أ) s (ب) s^2 (ج) $s - 2$ (د) $s - 3$

١٣ إذا كانت : $\frac{s+2}{s} = \frac{s+3}{s}$ حيث $s \neq 0$ فإن : $s \neq 0$

..... (الإسماعيلية ١١٤)

(أ) s (ب) $\frac{1}{s}$ (ج) $s + 2$ (د) $s + 5$

١٤ إذا كان : $s - s = \frac{2}{s} - \frac{2}{s}$ حيث $s \neq 0$ فإن : $s \neq 0$

(أ) $s \propto s + 1$ (ب) $s \propto s$ (ج) $s \propto \frac{1}{s}$ (د) $s \propto \frac{1}{s^2}$

١٥ إذا كانت التكلفة الكلية (ص) لرحلة ما بعضها ثابت (ف) والآخر يتناسب طردياً مع (الإسماعيلية ١١١)

عدد المشتركين (س) فإن : $s \propto$

(أ) $s = 4$ (ب) $s = \frac{4}{s}$

(ج) $s = 4 + \frac{4}{s}$ (د) $s = 4 + m$ (م ثابت $\neq 0$)

تطبيق هندسي

٣٠ إذا كان (ع) ارتفاع أسطوانة دائرية قائمة (حجمها ثابت) يتغير عكسياً بتغير طول نصف قطر قاعدتها (نق) ، وكان $ع = ٢٧$ سم عندما $نق = ١٠,٥$ سم فأوجد : ع عندما $نق = ١٥,٧٥$ سم

(بوسعيد ٢٠) ١٢٠

تطبيقات حياتية



٣١ تسير سيارة بسرعة ثابتة بحيث تتناسب المسافة

المقطوعة طردياً مع الزمن ، فإذا قطعت السيارة

١٥٠ كيلومتراً في ٦ ساعات

، فكم كيلومتراً تقطعها السيارة في ١٠ ساعات ؟

(القليوبية ١٣) ٢٥٠



٣٢ إذا كان وزن جسم على القمر (و) يتناسب طردياً مع

وزنه على الأرض (ر) ، وكان الجسم يزن ٨٤ كيلو جراماً

على الأرض ، ووزنه ١٤ كيلو جراماً على القمر ،

فكم يكون وزن الجسم على القمر إذا كان وزنه على الأرض ١٤٤ كيلو جراماً ؟

« ٢٤ كيلو جراماً »



٣٣ إذا كان عدد الساعات (ن) اللازمة لإنجاز عمل ما

يتناسب عكسياً مع عدد العمال (س) الذين يقومون بهذا

العمل ، فإذا أنجز العمل ٦ عمال في ٤ ساعات ، فما

الزمن الذي يستغرقه ٨ عمال لإنجاز هذا العمل ؟



(أسبوط ١٢) « $\frac{1}{3}$ ساعة »

٣٤ إذا كانت المسافة التي تقطعها دراجة بخارية (ف)

تتغير طردياً بتغير مربع الزمن (ن)
وكانت ف = $\frac{81}{16}$ كم عندما ن = $\frac{1}{4}$ ساعة
فأوجد : قيمة ن عندما ف = ١٤٤ كم



« ٧,٢ سم / ث »

٣٥ إذا كان مقدار السرعة ع التي يخرج بها الماء من فوهة

خرطوم يتغير عكسياً بتغير مربع طول نصف قطر فوهة
الخرطوم نق وكانت ع = ٥ سم / ث عندما نق = ٣ سم
أوجد : ع عندما نق = ٢,٥ سم



« ١٣ ثقل كجم »

٣٦ إذا كان وزن جسم يتغير عكسياً مع مربع بعده عن مركز
الأرض وأطلق قمر صناعي يزن ٥٠٠ ثقل كجم فكم يزن عندما
يكون على ارتفاع ٦٤٠ كم عن سطح الأرض مقرباً لأقرب ثقل
كجم ؟ (اعتبر طول نصف قطر الأرض ٦٣٩٠ كيلو متراً)

للمتفوقين

٣٧ إذا كانت : س \propto ص ، ع \propto ل

فأثبت أن : (س + ص) (ع + ل) \propto (س - ص) (ل - ع)

٣٨ إذا كانت : (ب + ٩) \propto $\frac{٩}{ب}$ ، (٢٤ - ب + ٢) \propto $\frac{٢}{ب}$

فأثبت أن : ٢٤ + ٢ = مقدار ثابت.

ملخص الوحدة الثانية



النسبة

★ قيمة النسبة لا تتغير إذا ضرب حذاها في (أو قُسما على) عدد حقيقي لا يساوي الصفر.

★ قيمة النسبة ($\neq 1$) تتغير إذا أضيف إلى حديها (أو طرح منهما) عدد حقيقي لا يساوي الصفر.

✳ إذا كانت النسبة بين عددين هي ١ : ٣

فإن : العدد الأول = a ، العدد الثاني = b حيث : $m \in \mathbb{Z}^*$

التناسب

☆ إذا كانت: $\frac{1}{p} = \frac{q}{r}$

فإن : ١، ب، ح، و كميات متناسبة.

★ إذا كانت: ٢، ب، ح، و كميات متناسبة فإن: $\frac{٢}{ب} = \frac{ح}{و}$

★ إذا كانت: ٢، ٣، ٤، ٥ كميات متناسبة فإن: $\frac{٢}{٥} = \frac{٣}{٤}$

★ إذا كانت: $\frac{1}{p} = \frac{q}{r}$

فإن : $٢ \times ٥ = ٥ \times ٢$

أي أن: حاصل ضرب الطرفين = حاصل ضرب الوسطين.

★ إذا كان : $٢ \times ٤ = ٨$ $٣ \times ٥ = ١٥$

فإن: $\frac{ب}{أ} = \frac{د}{ج}$, $\frac{د}{ب} = \frac{ج}{أ}$, $\frac{ج}{د} = \frac{أ}{ب}$, $\frac{أ}{د} = \frac{ب}{ج}$

☆ إذا كانت: $\frac{1}{p} = \frac{q}{s}$

فإن : $\frac{4}{5} = \frac{1}{5}$

أي أن: $\frac{\text{مقدم النسبة الأولى}}{\text{مقدم النسبة الثانية}} = \frac{\text{تالي النسبة الأولى}}{\text{تالي النسبة الثانية}}$

★ إذا كانت: $\frac{1}{r} = \frac{c}{s}$

فإن: $2 = \text{حم}$ ، $3 = \text{م}$ حيث م ثابت $\neq \text{صف}$

★ إذا كانت: a, b, c ، كميات متناسبة وفرضنا أن: $\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z}$

فإن: $\boxed{2 = \text{سم}}$, $\boxed{5 = \text{ح}}$

❖ إذا كانت: $\frac{1}{c} = \frac{a}{b} = \frac{d}{e} = \dots$ وكانت a, b, c, d, e, \dots أعداداً حقيقية لا تساوي الصفر

فإن:
$$\frac{\dots + \text{د}_{٢٢} + \text{ح}_{٢٢} + \text{ا}_{١٢}}{\dots + \text{و}_{٢٢} + \text{س}_{٢٢} + \text{ب}_{١٢}} = \text{إحدى النسب.}$$

• يقال إن الكميات a ، b ، c ، d متناسبة متسلسلة إذا كان: $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$

يسمى ٢ الأول المتناسب ، ح الثالث المتناسب ، أما فتسمى الوسط المتناسب بين ١ ، ح

ويكون: $\sqrt{2} = 1.414$ اي: $\sqrt{2} \pm = 1.414$

إذا كان: $m = \frac{h}{\lambda} = \frac{c}{\nu} = \frac{1}{\frac{\nu}{c}}$ فإن: $h\nu = mc^2$ ، $h\nu = mc^2$ ، $h\nu = mc^2$

التغير الطردى والتغير العكسى

التغير الطردى

• إذا كانت : ص تتغير طردياً مع س
وتكتب ص \propto س فإن :

① ص = م ح (أى أن : $\frac{ص}{ح} = م$)

• حیث م ثابت \neq

$$\frac{15}{15} = \frac{5}{5} \text{ (2)}$$

٢) العلاقة بين س ، ص يمثلها بياناً خط مستقيم يمر بنقطة الأصل.

• لإثبات أن $\forall x \in S$ نثبت أن :

ص = م س حیث م ثابت \neq .

التغير العكسي

• إذا كانت : ص تتغير عكسياً مع س
وتكتب ص $\propto \frac{1}{س}$ فإن :

① ص = $\frac{م}{س}$ (أى أن : س ص = م)

• حيث $m \neq 0$

$$\frac{15}{15} = \frac{16}{16} \quad (2)$$

٣) العلاقة بين س ، ص ليست علاقة خطية.

• لإثبات أن $\infty \frac{1}{x}$ نثبت أن :

س ص = م حیث م ثابت \neq .



امتحانات على الوحدة الثانية

النموذج الأول

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : $٤س = ٩ص$ فإن : $\frac{س}{ص} = \dots\dots\dots$

- (١) $\frac{٩}{٤}$ (ب) $\frac{٣}{٢}$ (ج) $\frac{٢}{٣} \pm$ (د) $\frac{٢}{٣} \pm$

٢ إذا كانت : $٥س = ٥ص$ فإن : $\dots\dots\dots$

- (١) $ص \propto س$ (ب) $ص \propto س^٢$ (ج) $ص \propto \frac{١}{س}$ (د) $ص \propto \frac{١}{س^٢}$

٣ إذا كان : $\frac{١}{٢} = \frac{٢}{٣}$ فإن : $\frac{١-٢}{١+٢} = \dots\dots\dots$

- (١) $\frac{١}{٥}$ (ب) $\frac{١}{٣}$ (ج) $\frac{٢}{٥}$ (د) $\frac{٣}{٥}$

٤ إذا كان : $\frac{س}{٢} = \frac{ص}{٣} = \frac{٤س-٢ص}{ع}$ فإن : $ع = \dots\dots\dots$

- (١) $٢-$ (ب) $\frac{١}{٢}-$ (ج) $\frac{١}{٢}$ (د) ٢

٥ الثاني المتناسب للكميات : $١٢س$ ، $٢١ص$ ، $١٤س$ هو $\dots\dots\dots$

- (١) $٨س$ (ب) $٨ص$ (ج) $٢٤ص$ (د) $٢٤س$

٦ إذا كانت : $ص \propto س$ ، وكانت $س = ١$ عندما $ص = ٤$ فإن ثابت التناسب = $\dots\dots\dots$

- (١) ١ (ب) $٤-$ (ج) ٤ (د) $\frac{١}{٤}-$

٢ (١) إذا كان : $\frac{١}{٤} = \frac{٢}{٣}$ أوجد قيمة : $\frac{٢+٢}{٢-٢}$

(ب) إذا كانت : $ب$ وسطاً متناسباً بين ٢ ، ٢ ، ٢

فأثبت أن : $\frac{١}{ب} = \frac{٢+٢}{٢+٢}$ حيث ٢ ، $ب$ ، ٢ كميات موجبة.

٣ (أ) إذا كانت : ص تتغير عكسياً مع س^٢ وكانت : س = ٣ عندما ص = ٤

فأوجد : ١ العلاقة بين ص ، س ٢ قيمة س عندما ص = ٩

(ب) إذا كانت : ٢ ، ب ، ح ، د كميات متناسبة فأثبت أن : $\frac{2+b}{c-d} = \frac{2+c}{d+b}$

٤ (أ) إذا كان : $\frac{2}{s+2} = \frac{c}{2-s} = \frac{c}{s+4}$ فأوجد قيمة : $\frac{2+c}{c+2}$

(ب) إذا كانت : ص = ٣ + ٢ وكانت ١ $\times \frac{1}{s}$ وكانت ص = ٥ عندما س = ١

فأوجد العلاقة بين : س ، ص ثم أوجد : ص عندما س = ٢

٥ (أ) إذا كان : ٢ ، ب ، ح ، د في تناسب متسلسل فأثبت أن : $\frac{2}{s+2} = \frac{2}{s+2} = \frac{2}{s+2}$

(ب) أوجد العدد الموجب الذي إذا أضيف مربعه إلى مقدم النسبة ٢٩ : ٤٦ وطرح مربعه من تاليها فإننا نحصل على النسبة ٣ : ٢

النموذج الثاني

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : ٢ ، ب ، ح ، د كميات متناسبة فإن : $\frac{2}{s} = \frac{b}{c} = \frac{d}{h}$

(أ) $\frac{2}{b}$ (ب) $\frac{2}{c}$ (ج) $\frac{2}{d}$ (د) $\frac{2}{h}$

٢ إذا كانت : ٢ ، ٦ ، س + ١٥ متناسبة فإن : س =

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

٣ إذا كان : س ص = ١٢ فإن : ص تتغير طردياً مع

(أ) $\frac{1}{s}$ (ب) س - ١٢ (ج) س (د) س + ١٢

٤ إذا كانت : ص تتناسب عكسياً مع س وكانت س = ٣ $\sqrt{2}$ عندما ص = $\frac{2}{3\sqrt{2}}$

فإن ثابت التناسب =

(أ) $\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{2}{3}$ (ج) ٢ (د) ٦

٥ إذا كان : $\frac{1}{2} = \frac{2}{5} = \frac{3}{7}$ $m = \frac{2}{5}$ (حيث $m \in \mathbb{R}^*$) فإن : $\frac{1}{2} = \frac{2}{5} = \frac{3}{7}$
 (أ) m (ب) $\frac{3}{7}$ (ج) $\frac{2}{5}$ (د) $\frac{1}{2}$

٦ إذا كان : $\frac{1}{3} = \frac{2}{5}$ فإن : $10 - 3 - 7 = \dots$
 (أ) 3 (ب) 9 (ج) 7 (د) 10

٢ (أ) إذا كانت : $\frac{1}{m-2} = \frac{2}{2-m}$ فأثبت أن : $1, 2, 3, 4$ متناسبة.

(ب) إذا كانت : $1 - 2 = 3$ وكانت 1 تتغير عكسياً مع 2 وكان : $4 = 2$ عندما $3 = 2$

أوجد : ١ العلاقة بين : $3, 4$ قيمة 2 عندما $3 = 8$

٣ (أ) إذا كان : $\frac{1}{5} = \frac{2}{3} = \frac{3}{4}$ أثبت أن : $\frac{1}{2} = \frac{2}{3} = \frac{3}{4}$

(ب) إذا كانت : $1, 2, 3, 4$ كميات متناسبة أثبت أن : $\frac{1}{2} = \frac{2}{3} = \frac{3}{4}$

٤ (أ) إذا كانت : $10 = 3$ أوجد قيمة : $\frac{9+27}{2+4}$

(ب) إذا كانت : 3 وسطاً متناسباً بين $1, 2$ أثبت أن : $\frac{1}{2} = \frac{2}{3}$

٥ (أ) إذا كانت : $4 = 2 + 2$ $3 = 4$

١ أثبت أن : $3 \propto 4$ ٢ أوجد قيمة : 3 عندما $3 = 8$

(ب) إذا كان : $1 : 2 = 3 : 4 = 5 : 3$ أثبت أن : $\frac{1}{3} = \frac{2}{4} = \frac{3}{5}$

مشروع بحثي

على الوحدة الثانية

أهداف المشروع

- استخدام خواص النسبة والتناسب لحل المشكلات.
- التمييز بين التغير الطردى والتغير العكسي.
- استخدام الرياضيات في حل المشكلات الحياتية.
- الربط بين الرياضيات والدراسات الاجتماعية.
- الربط بين الرياضيات والعلوم.

المطلوب

« يعتبر مقياس الرسم من أهم عناصر الخريطة، وهو أحد تطبيقات النسبة والتناسب »

في ضوء ذلك قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي :

- عرف مقياس الرسم وتكلم عن أهميته.
- الصق خريطة لمصر موضحة عليها مقياس الرسم.
- حدد محافظتين على هذه الخريطة ثم قس المسافة بينهما ، وباستخدام مقياس الرسم الموضح على الخريطة احسب المسافة الحقيقية بين هاتين المحافظتين.
- ابحث عن قانون حساب السرعة المنتظمة ، ثم احسب الزمن الذي تستغرقه سيارة تسير بسرعة منتظمة ١٢٠ كم/س لقطع المسافة بين هاتين المحافظتين.
- ما نوع التغير بين المسافة والزمن بفرض ثبوت السرعة ؟

فيما يلي بعض الأمثلة لكل منهما مع استعراض مميزات وعيوب كل مصدر :

| ١ المصادر الأولية (الميدانية) | ٢ المصادر الثانوية (التاريخية) |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> المقابلة الشخصية. الاستبيانات واستطلاعات الرأي. الملاحظة والقياس. | <ul style="list-style-type: none"> نشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. قاعدة بيانات الموظفين بإحدى الشركات. وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت. |
| الدقة. | توفير الوقت والجهد والمال. |
| تحتاج إلى وقت ومجهود وتكلفة كبيرة كما تحتاج إلى عدد كبير من الباحثين في المجتمعات الكبيرة. | عدم الدقة أحياناً لبعض المصادر. |

أساليب جمع البيانات

يتوقف الأسلوب المستخدم في جمع البيانات على الهدف المراد لأجله جمع هذه البيانات كما يتوقف على حجم المجتمع الإحصائي.

ويعرف المجتمع الإحصائي بأنه : جميع الأفراد التي تجمعها خصائص عامة واحدة ، مثل :

• تلاميذ مدرسة ما تمثل مجتمعاً إحصائياً تكون مفردته التلميذ.

• عمال مصنع ما تمثل مجتمعاً إحصائياً تكون مفردته العامل.

وفيما يلي سوف نستعرض أسلوبين لجمع البيانات :

١ أسلوب الحصر الشامل :

ويقوم على جمع البيانات حول الظاهرة محل الدراسة من جميع مفردات المجتمع

الإحصائي ، ويستخدم لحصر جميع مفردات المجتمع.

٢ أسلوب العينات :

ويقوم على جمع البيانات حول الظاهرة محل الدراسة من عينة ممثلة للمجتمع كله وإجراء

البحث عليها ، ثم تعميم النتائج على المجتمع كله.



الدرس

1

جمع البيانات

يقوم الباحث الإحصائي بجمع البيانات وتبويبها وتمثيلها بيانياً وتحليلها بغرض الوصول إلى نتائج تؤخذ في ضوءها القرارات المناسبة أي أنه بقدر دقة البيانات تكون دقة النتائج وسلامة القرارات لذلك فإنه يجب اتباع أسلوب علمي صحيح في جمع البيانات ، وجمع البيانات الإحصائية يتطلب معرفة مصادر جمع هذه البيانات وتحديد أسلوب جمعها.

مصادر جمع البيانات

تنقسم مصادر جمع البيانات إلى :

١ مصادر أولية (ميدانية) :

وهي المصادر التي يحصل منها الباحث على البيانات بشكل مباشر.

٢ مصادر ثانوية (تاريخية) :

وهي المصادر التي يحصل منها الباحث على البيانات التي تم تجميعها وتسجيلها من قبل بواسطة بعض الهيئات أو المؤسسات أو الأشخاص.

وفيما يلي بعض الأمثلة لكل أسلوب من الأسلوبين مع استعراض مميزات وعيوب كل منهما :

| أسلوب الحصر الشامل | أسلوب العينات |
|---|--|
| أمثلة لاستخدامات <ul style="list-style-type: none"> • الانتخابات. • التعداد العام للسكان. • عمل قاعدة بيانات للعاملين في إحدى المؤسسات. | <ul style="list-style-type: none"> • عينة من دم مريض لإجراء بعض الفحوصات الطبية. • عينة من بعض منتجات مصنع لبحث مدى مطابقتها للمواصفات. |
| مميزاته <ul style="list-style-type: none"> • الدقة. • الشمول. • عدم التحيز. • التمثيل التام لكل مفردات المجتمع الإحصائي. | <ul style="list-style-type: none"> • توفير الوقت والجهد والتكاليف. • الطريقة الوحيدة لجمع بيانات عن المجتمعات الكبيرة الغير محدودة (مثل بحث مكونات رمال الصحراء). • الطريقة الوحيدة لدراسة بعض المجتمعات المحدودة التي يؤدي فيها أسلوب الحصر الشامل إلى خسائر فادحة (مثل فحص دم مريض لأن فحص الدم كله يؤدي إلى الوفاة). |
| عيوبه <ul style="list-style-type: none"> • يحتاج في بعض الأحيان إلى وقت طويل وتكلفة باهظة. | <ul style="list-style-type: none"> • عدم دقة نتائجه في بعض الحالات خاصة في حالة أن تكون العينة المختارة غير ممثلة للمجتمع الإحصائي تمثيلاً صادقاً (عينة متحيزة). |

وفيما يلي سوف نتعرض لمفهوم العينة وأنواعها وكيفية اختيارها :

مفهوم العينة

العينة هي جزء صغير من مجتمع كبير تشبه المجتمع وتمثله.

كيفية اختيار العينات

النوع العينات عن طريق كيفية اختيارها



وفيما يلي نتطرق لكل نوع بشيء من التفصيل :

أولاً: الاختيار المتحيز (العينات غير العشوائية) :

وهو يعنى اختيار مفردات بعينها من مفردات المجتمع الإحصائي دون غيرها بحيث تناسب أهداف البحث وتُعرف بالعينة العمدية.

فمثلاً : عند دراسة مدى استيعاب تلاميذ مدرسة

ما لموضوع ما في مادة الجبر ، يجب أن نحلل

نتائج الاختبار في ذلك الموضوع باختيار تلاميذ

سبق لهم دراسة الموضوع نفسه دون سائر التلاميذ

، ولا يعتبر هذا الاختيار عشوائياً.

ثانياً : الاختيار العشوائي (العينات العشوائية) :

وهو اختيار عينة من مفردات المجتمع الإحصائي بحيث تكون كل مفردة من مفردات

المجتمع لها نفس الفرصة في الاختيار ، وفيما يلي أهم أنواع العينات العشوائية :

١ العينة العشوائية البسيطة. ٢ العينة العشوائية الطبقية.

١ العينة العشوائية البسيطة

وتستخدم مع المجتمعات المتجانسة الغير مقسمة بطبيعتها إلى فئات أو طبقات ، ويتم اختيارها بطريقتين حسب عدد مفردات المجتمع كما يلي :

(١) الطريقة الأولى (إذا كان حجم المجتمع صغيراً) : وتتم هذه الطريقة كما يلي :



١ تُعطى كل مفردة في مجتمع الدراسة رقماً ثم يكتب هذا

الرقم في قصاصة ورق بحيث تكون جميع القصاصات

متماثلة أى لا تميز فيها من حيث اللون أو المقاس.

٢ تُطبق كل قصاصة بطريقة متماثلة بحيث لا يظهر الرقم

نهائياً ثم توضع في صندوق وتُخلط جيداً.

٣ يتم اختيار العينة باختيار ورقة من الصندوق دون النظر داخله ثم تُقلب الأوراق

جيداً ونختار ورقة ثانية ، وهكذا حتى ننتهي من اختيار العدد المطلوب للعينة.

وتعتبر هذه الطريقة مناسبة مثلاً لاختيار عينة مكونة من ١٠ عمال في مصنع به ٥٠ عاملاً.

العينة العشوائية الطبقية

وتستخدم في حالة المجتمعات الإحصائية الغير متجانسة أى المقسمة بطبعتها إلى مجموعات نوعية تختلف فى الصفات، وفى هذه الحالة لا نستطيع أن نختار العينة بطريقة العينة العشوائية البسيطة لأن ذلك قد يجعل العينة بها عدد أكبر من مفردات طبقات بعينها دون الأخرى مما يجعل العينة غير ممثلة لجميع طبقات مجتمع الدراسة ولذلك نقوم بالخطوات التالية :

- ١- نقسم مفردات المجتمع الإحصائى إلى طبقات تبعاً للصفات المكونة للمجتمع.
- ٢- نحصى عدد مفردات كل طبقة من هذه الطبقات ونوجد نسبتها إلى عدد مفردات المجتمع الكلى.
- ٣- لتكوين العينة فإننا نختار من كل طبقة عدداً معيناً من المفردات بحيث تكون النسبة التى تمثل كل طبقة فى العينة هى نفس نسبة الطبقة فى المجتمع الكلى ، وذلك باستخدام القانون التالى :

$$\text{عدد مفردات الطبقة فى العينة} = \frac{\text{عدد مفردات الطبقة الكلى}}{\text{عدد مفردات المجتمع الكلى}} \times \text{عدد مفردات العينة}$$

« مقرباً الناتج لأقرب وحدة »

فمثلاً : عند دراسة المستوى الدراسى لطلاب مدرسة بها ٥٠٠ طالب وطالبة وكانت نسبة البنين إلى البنات ١ : ٤ وأردنا اختيار عينة مكونة من ٥٠ طالباً فلابد من اختيار ١٠ طلاب من طبقة البنين و ٤٠ طالبة من طبقة البنات لتكون العينة ممثلة لطبقات المجتمع محل الدراسة.

مثال ١٧

مصنع به ٣٠٠ عامل ويريد المسئولون عن إعداد المجلة الشهرية الخاصة بهذا المصنع تطوير هذه المجلة فى ضوء معرفة آراء العاملين من خلال استبيان تم إعداده لهذا الغرض يُعطى هذا الاستبيان لعينة عشوائية ١٠٪ من إجمالى عدد العاملين بهذا المصنع. وضح كيف يتم اختيار هذه العينة باستخدام الآلة الحاسبة.

(ب) الطريقة الثانية (إذا كان حجم المجتمع كبيراً) :

يتم ترقيم جميع مفردات المجتمع ثم نختار العينة من هذه المفردات باستخدام خاصية الرقم العشوائى الموجود بالآلة الحاسبة العلمية مثل الموضحة بالصورة المقابلة ، ويتم ذلك بالضغط على المفاتيح التالية بالترتيب من اليسار لليمين :



فيظهر رقم عشري بين ٠,٠٠٠٠ ، ٠,٩٩٩ وفى حالة ظهور رقم عشري واحد بعد العلامة نضيف صفيرين لجعله جزءاً من ألف (٠,٢٠٠ ← ٠,٢) وفى حالة ظهور رقمين عشريين بعد العلامة نضيف صفراً على اليمين لجعله جزءاً من ألف (٠,٦٤٠ ← ٠,٦٤) ثم نأخذ تلك الأرقام بعد تجاهل العلامة العشرية ونختار المفردة الممثلة لها ومع تكرار الضغط على مفتاح [=] يتوالى ظهور الأرقام وتُسبَعِد الأرقام الأكبر من عدد مجتمع الدراسة كما يتم استبعاد الأرقام التى تم اختيارها من قبل إلى أن نصل إلى عدد العينة الذى نريده وتعتبر نسبة ١٠٪ نسبة مناسبة لإجراء أى استبيان.

وتعتبر هذه الطريقة مناسبة لاختيار عينة مكونة من ٢٥ طالباً من مدرسة بها ٩٠٠ طالب.

مثال ۲



قام أحد المصانع بإنتاج ٢٠٠ جهاز تليفزيون
من النوع «أ» و ٣٠٠ من النوع «ب»
و ٥٠٠ من النوع «ج» فإذا أردنا سحب عينة
طبقة مكونة من ٥٠ تليفزيون بحيث تكون
ممثلة لكل الأنواع المنتجة لفحصها
فاحسب عدد مفردات كل طبقة في العينة.

الحل

- العدد الإجمالي للتليفزيونات = ٢٠٠ + ٣٠٠ + ٥٠٠ = ١٠٠٠ تليفزيون.
- عدد مفردات النوع «أ» في العينة = $\frac{٢٠٠}{١٠٠٠} \times ٥٠ = ١٠$ تليفزيونات.
- عدد مفردات النوع «ب» في العينة = $\frac{٣٠٠}{١٠٠٠} \times ٥٠ = ١٥$ تليفزيون.
- عدد مفردات النوع «ح» في العينة = $\frac{٥٠٠}{١٠٠٠} \times ٥٠ = ٢٥$ تليفزيون.

حاول بنفسك

مدرسة بها ٣٠٠ طالب ، ٥٠٠ طالبة أرادت عمل استبيان على عينة عددها ٢٤ طالباً وطالبة تمثل فيها كل طبقة بحسب حجمها . احسب عدد مفردات كل طبقة في العينة.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

◀ الحل

∴ عدد العاملين بالمصنع = ٣٠٠ عامل

∴ عدد العينة العشوائية = $30 \times \frac{10}{100} = 3$ عاملاً

أي أننا نريد اختيار ٢٠ عاملاً لإجراء هذا الاستبيان ويتم اختيارهم بطريقة عشوائية كالتالي:

١ يعطى كل عامل من العاملين بالمصنع رقماً من ١ إلى ٣٠٠

٢) نستخدم الآلة الحاسبة العلمية لاختيار ٣٠ رقمًا بالطريقة السابق ذكرها والتي تنحصر بين صفر ، ٢٠١ والأرقام العشوائية التي تظهر أكبر من ٣٠٠ يتم استبعادها.

فمثلاً: بالضغط على المفاتيح
ON → SHIFT → Rand → = بالترتيب من اليسار لليمين:

- إذا حصلنا على الكسر العشري ٠,٠٤٩ يكون رقم الشخص المختار هو ٤٩
- إذا حصلنا على الكسر العشري ٠,١٣٢ يكون رقم الشخص المختار هو ١٣٢
- إذا حصلنا على الكسر العشري ٠,١٢ يكون رقم الشخص المختار هو ١٢٠
- إذا حصلنا على الكسر العشري ٠,٤٥٣ يتم استبعاده لأن رقم ٤٥٣ خارج نطاق الأعداد من ١ إلى ٣٠٠ وهكذا حتى نحصل على ٣٠ رقمًا.

* ونفرض أن الآلة الحاسبة أخرجت الأرقام

الموضحة في الجدول المقابل يكون العمال
الذين يحملون هذه الأرقام هم العينة المختارة
لإجراء هذا الاستبيان.

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 272 | 259 | 141 | 12. | 132 | 49 |
| 198 | 74 | 213 | 4 | 207 | 208 |
| 13 | 172 | 47 | 107 | 2 | 131 |
| 28 | 9 | 12 | 10 | 3 | 8 |
| 1.2 | 118 | 279 | 24 | 14 | 41 |

١ مصادر جمع البيانات هي ،

٢ تعتبر المقابلة الشخصية من المصادر للبيانات.

٣ بيانات الطلاب المسجلة فى مكتب شئون الطلاب من المصادر للبيانات.

٤ نشرات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء من المصادر للبيانات.

٥ الملاحظة المباشرة من المصادر للبيانات.

٦ الأسلوب المناسب لفحص دم مريض هو أسلوب

٧ الأسلوب المناسب لفحص إنتاج مصنع هو أسلوب

٨ الأسلوب المناسب لمعرفة تعداد السكان هو أسلوب

٩ الأسلوب المناسب لمعرفة نسبة الغياب فى إحدى المدارس هو أسلوب

١٠ إذا كان المجتمع محل البحث مقسماً إلى أميين ويقرأون ويكتبون وحاملى المؤهلات المتوسطة وحاملى المؤهلات فوق المتوسطة وحاملى المؤهلات العليا فإن العينة المختارة لإجراء بحث ما تسمى بالعينة

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ من المصادر الثانوية لجمع البيانات

(أ) المقابلة الشخصية.

(ب) الاستبيانات.

(ج) قاعدة بيانات الموظفين.

(د) الملاحظة والقياس.

٢ من المصادر الأولية لجمع البيانات

(أ) نشرات مراكز الإحصاء.

(ب) بيانات طلاب المدرسة بالسنة الماضية.

(ج) الاستبيانات.

(د) سجلات بيانات موظفى إحدى المؤسسات.

٣ يعتبر أسلوب الحصر الشامل مناسباً لـ

(أ) بحث مكونات رمال الصحراء الغربية.

(ب) فحص نسبة العذوبة لمياه أحد الآبار.

(ج) بحث نسبة وجود أحد المعادن فى مناطق التعدين.

(د) معرفة عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية فى امتحان الرياضيات بالفصل.

٤ اختيار عينة من طبقات المجتمع الإحصائي تسمى بالعينة

(البجيرة ١٧، بوسعيد ١٦، الإسكندرية ١٤)

(أ) العشوائية. (ب) الطبقة. (ج) العمدية. (د) العنقودية.

٥ مصنع به ١٢٥ عاملاً وهم ٧٥ فنياً ، ٥٠ مهندساً أخذت عينة طبقية حجمها ٥٠ فرداً تمثل فيها كل طبقة بحسب حجمها فإن عدد المهندسين فى هذه العينة يساوى مهندساً.

(المنوفية ١٦)

(أ) ٣٠ (ب) ٢٠ (ج) ٢٥ (د) ١٥

أى من مصادر البيانات الإحصائية التالية أولية وأيها ثانوية :

١ استطلاع آراء تلاميذ فصلك عن المكان الذى يريدون أن يذهبوا إليه فى الرحلة القادمة.

٢ أن تقوم بإحصاء عدد المقاعد الموجودة فى كل فصل من فصول مدرستك.

٣ أن تقوم بعمل بحث عن أعداد الناجحين فى كل مادة من المواد الدراسية فى مدرستك فى الدور الأول العام الماضى من واقع سجلات مدرستك.

٤ أن تذهب لإحدى المؤسسات الحكومية بمحافظتك لجمع بيانات عن عدد المواليد

المسجلين فى كل مكتب صحة خلال شهر مارس العام الماضى.

٥ البحث فى مواقع الإنترنت عن نتائج إحدى الفرق الرياضية فى مسابقة الدورى

المصرى العام ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩

٦ قارن بين أسلوبى الحصر الشامل والعينات مبيناً مزايا وعيوب كل منهما.

اذكر الأسلوب المناسب «الحصر الشامل أم العينات» لجمع البيانات فى كل من المجتمعات الإحصائية التالية :

١ مستوى تحصيل فصل دراسى مكون من ٢٥ طالباً.


٢ مدى صلاحية المياه بأحد الآبار للشرب.

٣ نسبة وجود البترول بأحد المواقع الاستكشافية.

٤ مدى انتشار مرض ما فى ثمار أحد المحاصيل الزراعية.

٥ تعداد المصانع بإحدى المدن الصناعية.

٦ قامت إدارة أحد المصانع باستطلاع رأى ٢٠٠ عامل لمعرفة ما يفضلون تناوله فى فترة الراحة ، وقد تم إعطاء رقم لكل عامل من ١ إلى ٢٠٠ ثم اختيار عينة تمثل ١٠٪ لسؤالهم عما يفضلون من :



- مشروبات ساخنة.
- وجبات خفيفة.
- منتجات.

حدد باستخدام آلتك الحاسبة أرقام العمال المستهدفين فى هذه العينة.

٧ تقوم إحدى المدارس الإعدادية بدراسة عن كيفية ذهاب التلاميذ إلى المدرسة فإذا كان عدد تلاميذ المدرسة ٣٢٠ تلميذاً وتم إعطاء كل تلميذ رقماً من ١ إلى ٣٢٠ واختيار ١٠٪ منهم كعينة لسؤالهم عن طريقة الوصول للمدرسة ما بين :



• تاكسى.



• أتوبيس عام.



• سيراً على الأقدام.



• سيارة خاصة.



• دراجة.

حدد أرقام العينة باستخدام الآلة الحاسبة.



٨ ترغب إدارة أحد الفنادق فى معرفة آراء ٣٠٠ نزيل بالفندق فى مستوى الخدمة المقدمة لهم ، فقامت بإعطاء كل نزيل رقماً من ٢٠١ إلى ٥٠٠ ، واختيار ١٠٪ منهم كعينة عشوائية لسؤالهم عن مستوى الخدمة. حدد باستخدام آلتك الحاسبة أرقام النزلاء المستهدفين فى هذه العينة.

٩ إذا كان هناك في إحدى الكليات الجامعية ٤٠٠٠ طالب بالسنة الأولى ، ٣٠٠٠ طالب بالسنة الثانية ، ٢٠٠٠ طالب بالسنة الثالثة ، ١٠٠٠ طالب بالسنة الرابعة ، وأردنا سحب عينة طبقية حجمها ٥٠٠ طالب تمثل فيها كل طبقة بحسب حجمها ، فاحسب عدد مفردات كل طبقة في العينة.

«٥٠٠ ، ١٠٠ ، ١٥٠ ، ٢٠٠»

١٠ أحد مصانع السيارات يقوم بإنتاج ٣ موديلات من السيارات في العام وتعدادها هو ٣٠٠ سيارة من الموديل الأول ، ٥٠٠ من الموديل الثاني ، ٢٠٠ من الموديل الثالث ، فإذا أرادت إدارة المصنع أخذ عينة تقدر بـ ٥٪ من الإنتاج الإجمالي لها تمثل فيها كل موديل حسب حجم إنتاجه.

«١٠٠ ، ٢٥٠ ، ١٥٠ ، ٥٠٠»

١١ يراد سحب عينة عشوائية طبقية تمثل فيها كل طبقة حسب حجمها من مجتمع مكون من ٥٠٠٠ مفردة ومقسم إلى طبقتين تعداد الطبقة الأولى منهما ١٥٠٠ مفردة فإذا كانت المفردات التي تمثل الطبقة الثانية بالعينة ١٤٠ مفردة.

«٢٠٠»

١٢ يراد سحب عينة عشوائية طبقية تمثل فيها كل طبقة حسب حجمها من مجتمع مكون من ٤٠٠٠ مفردة ، ومقسم إلى ثلاث طبقات بيانها كالتالي :

| رقم الطبقة | ١ | ٢ | ٣ |
|-------------------|-------|-------|------|
| عدد مفردات الطبقة | ١٢٠٠٠ | ٢٠٠٠٠ | ٨٠٠٠ |

فإذا كان عدد مفردات الطبقة الأولى في العينة ٢٤٠ مفردة ، أوجد حجم العينة كلها. «٨٠٠»

١٣ مجتمع به ٢٠٠٠ مفردة مقسمة إلى ٤ طبقات يراد سحب عينة تمثل فيها كل طبقة حسب حجمها فقام الباحث بتصميم الجدول التالي :

| رقم الطبقة | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | الإجمالي |
|---|-------|-------|-------|-------|----------|
| عدد مفردات الطبقة | ٥٠٠ | ٧٠٠ | | ٤٥٠ | ٢٠٠٠ |
| عدد المفردات التي تمثل الطبقة في العينة | | | ٧ | | |

«٤٠٠ ، ٩٠ ، ١٤٠ ، ١٠٠ ، ٣٥٠»

أكمل هذا الجدول.

• في الحالة السابقة واضح أن المجموعتين مختلفتان ، وبالرغم من ذلك وجدنا أن لهما نفس الوسط الحسابي والوسيط والمنوال ، وهذا لا يعني أن المجموعتين بالضرورة متماثلتان .
لذلك فإن مقاييس النزعة المركزية وحدها غير قادرة على وصف مجموعة من التوزيعات التكرارية والبيانات الإحصائية وصفاً كاملاً ، لذلك نحتاج بجانب مقاييس النزعة المركزية التي تعتمد على تعيين قيمة واحدة تتمركز حولها باقى البيانات إلى نوع آخر من المقاييس يعتمد على تعيين درجة تجانس (تقارب) أو تشتت (تباعد) البيانات عن بعضها البعض .
فمثلاً فى المثال السابق :

درجات المجموعة ١ متقاربة فتنحصر مفرداتها بين ٢٦ ، ٣٥ درجة بينما
درجات المجموعة ٢ متباعدة فتنحصر مفرداتها بين ٨ ، ٤٩ درجة
، أى أن درجات المجموعة ٢ أكثر تشتتاً من درجات المجموعة ١

وتعرف هذه المقاييس بمقاييس التشتت وسوف ندرس منها هنا المدى والانحراف المعياري .
(التشتت لأى مجموعة من القيم :

يُقصَد به التباعد أو الاختلاف بين مفرداتها ، ويكون التشتت صغيراً إذا كان الاختلاف بين المفردات قليلاً ، ويكون التشتت كبيراً إذا كان الاختلاف بين المفردات كبيراً (أى إذا كانت الفروق بين القيم كبيرة) ، كما يكون التشتت صغراً إذا تساوت جميع المفردات .
أى أن : التشتت لمجموعة من القيم هو مقياس درجة تباعد هذه القيم وهو يعبر عن مدى تجانس المجموعات .

مقاييس التشتت

١ المدى (أبسط مقاييس التشتت)

يُعرف مدى مجموعة من المفردات بأنه الفرق بين أكبر مفردة وأصغر مفردة فى المجموعة .
أى أن : المدى = أكبر مفردة - أصغر مفردة

فمثلاً :

* إذا كانت قيم المجموعة ١ هى ٦٠ ، ٥٨ ، ٦٢ ، ٦١ ، ٥٩ فإن : المدى = ٦٢ - ٥٨ = ٤
* إذا كانت قيم المجموعة ٢ هى ٧٢ ، ٧٨ ، ٤٦ ، ٦٥ ، ٣٩ فإن : المدى = ٧٨ - ٣٩ = ٣٩
ولذلك يقال إن المجموعة ٢ أكثر تشتتاً من المجموعة ١



التشتت

• درست سابقاً بعض المقاييس الإحصائية التي عُرفت باسم مقاييس النزعة المركزية كالوسط الحسابي والوسيط والمنوال ، ونعلم أن كلاً منها يعطى وصفاً للتوزيعات التكرارية والبيانات الإحصائية من خلال تعيين قيمة عددية واحدة تتجمع حولها باقى القيم .
فى بعض الحالات لا يكون كافياً استخدام مقاييس النزعة المركزية وحدها لإعطاء وصف واضح للبيانات ، ولتوضيح ذلك ندرس الحالة الآتية :
مجموعتان من التلاميذ تتكون كل منهما من ٥ تلاميذ ، أُعطيت كل مجموعة اختباراً نهايته العظمى ٥٠ درجة فكانت درجات التلاميذ كالتالى :

المجموعة ١ : ٣٥ ، ٣٥ ، ٣٥ ، ٢٦ ، ٢٩
المجموعة ٢ : ٣٣ ، ٣٥ ، ٤٩ ، ٣٥ ، ٨



تذكر أن

• الوسط الحسابي = مجموع قيم المفردات / عدد هذه المفردات
• المنوال لمجموعة من القيم هو القيمة الأكثر شيوعاً بين هذه القيم .
• الوسيط لمجموعة من القيم هو القيمة التي تتوسط مجموعة القيم بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً .

• عند حساب الوسط الحسابي والوسيط والمنوال لدرجات التلاميذ فى كل مجموعة على حدة نجد النتائج الموضحة فى الجدول التالى :

| | الوسط الحسابي | الوسيط | المنوال |
|------------|---------------|--------|---------|
| المجموعة ١ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٥ |
| المجموعة ٢ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٥ |

مميزات المدى

طريقة سهلة وبسيطة وتعطى فكرة سريعة عن تباعد وتقارب المفردات ويُعتبر أبسط وأسهل طرق قياس التشتت.

عيوب المدى

١ لا يعكس أثر جميع المفردات لأن حسابه يعتمد على أكبر وأصغر مفردة فقط (أي أن حسابه يعتمد على مفردتين فقط مع إهمال باقى المفردات) وبالتالي لا يعطى صورة صادقة لتشتت المجموعة.

٢ يتأثر كثيراً بالقيم المتطرفة ، فمثلاً مدى مجموعة القيم : ٢١ ، ٢٢ ، ٦١ ، ٢٤ ، ٢٦ هو (٢١ - ٦١ = ٤٠) بينما عند استبعاد المفردة ٦١ منها فإن المدى يصبح (٢٦ - ٢١ = ٥) أى $\frac{1}{8}$ المدى السابق لذلك فإن مقياس المدى هو مقياس تقريبي لا يُعتمد عليه.

٢ الانحراف المعياري

هو أهم وأدق مقياس التشتت وأوسعها انتشاراً ، ويمكن حسابه عن طريق : أخذ الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي ويرمز له بالرمز σ وتقرأ (سيجما)

أولاً حساب الانحراف المعياري لمجموعة من المفردات

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

حيث \bar{x} تشير إلى مفردة من المفردات.

\bar{x} وتقرأ (س بار) تشير إلى الوسط الحسابي للمفردات.

n تشير إلى عدد المفردات ، \sum تشير إلى عملية الجمع.

مثال ١ احسب الانحراف المعياري لمجموعة القيم : ٨ ، ٩ ، ٧ ، ٦ ، ٥

الحل

$$\bar{x} = \frac{5 + 6 + 7 + 9 + 8}{5} = \frac{35}{5} = 7$$

١ نوجد الوسط الحسابي للقيم (\bar{x})
٢ نكون الجدول المقابل :

| س | س - \bar{x} | (س - \bar{x}) ^٢ |
|---------|---------------|-------------------------------|
| ٨ | ١ = ٨ - ٧ | ١ |
| ٩ | ٢ = ٩ - ٧ | ٤ |
| ٧ | ٠ = ٧ - ٧ | ٠ |
| ٦ | ١ - = ٦ - ٧ | ١ |
| ٥ | ٢ - = ٥ - ٧ | ٤ |
| المجموع | | ١٠ |

٣ نقوم بحساب الانحراف المعياري كما يلي :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{10}{5}} = \sqrt{2} = 1.41$$

١ حاول بنفسك

إذا كانت : ٢٥ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٣٠ ، ٢٨ ، ٣٠ تمثل درجات أحد التلاميذ في اختبار الجبر في ستة شهور مختلفة أوجد : ١ الوسط الحسابي . ٢ الانحراف المعياري .

ثانياً حساب الانحراف المعياري لتوزيع تكراري

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2 \cdot k}{\sum k}}$$

حيث : \bar{x} تمثل القيمة أو مركز المجموعة ، k تكرار القيمة أو المجموعة

$$\bar{x} = \frac{\sum (x \cdot k)}{\sum k}$$

حساب الانحراف المعياري لتوزيع تكرارى بسيط

مثال ٢

الجدول الآتى يبين توزيع أعمار ٢٠ شخصاً بالسنين :

| العمر | ١٥ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٥ | ٣٠ | المجموع |
|-------------|----|----|----|----|----|----|---------|
| عدد الأشخاص | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ١ | ٤ | ٢٠ |

أوجد الانحراف المعياري للأعمار.

الحل

١ نوجد الوسط الحسابى للأعمار
(\bar{x}) وذلك باستخدام
الجدول المقابل :

| العمر (س) | عدد الأشخاص (ك) | س × ك |
|-----------|-----------------|-------|
| ١٥ | ٢ | ٣٠ |
| ٢٠ | ٣ | ٦٠ |
| ٢٢ | ٥ | ١١٠ |
| ٢٣ | ٥ | ١١٥ |
| ٢٥ | ١ | ٢٥ |
| ٣٠ | ٤ | ١٢٠ |
| المجموع | ٢٠ | ٤٦٠ |

$$\therefore \text{الوسط الحسابى } (\bar{x}) = \frac{\text{مجموع (س × ك)}}{\text{مجموع ك}} = \frac{٤٦٠}{٢٠} = ٢٣ \text{ سنة.}$$

٢ تكون الجدول التالى :

| س | ك | س - \bar{x} | (س - \bar{x}) ^٢ | (س - \bar{x}) ^٢ × ك |
|---------|----|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ١٥ | ٢ | ٨ = ٢٣ - ١٥ | ٦٤ | ١٢٨ |
| ٢٠ | ٣ | ٣ = ٢٣ - ٢٠ | ٩ | ٢٧ |
| ٢٢ | ٥ | ١ = ٢٣ - ٢٢ | ١ | ٥ |
| ٢٣ | ٥ | ٠ = ٢٣ - ٢٣ | ٠ | ٠ |
| ٢٥ | ١ | ٢ = ٢٣ - ٢٥ | ٤ | ٤ |
| ٣٠ | ٤ | ٧ = ٢٣ - ٣٠ | ٤٩ | ١٩٦ |
| المجموع | ٢٠ | | | ٣٦٠ |

٣ نقوم بحساب الانحراف المعيارى كما يلى :

$$\text{الانحراف المعيارى } \sigma = \sqrt{\frac{\text{مجموع (س - } \bar{x} \text{)}^2 \times \text{ك}}{\text{مجموع ك}}} = \sqrt{\frac{٣٦٠}{٢٠}} = \sqrt{١٨} = ٤,٢٤ \text{ سنة.}$$

١٦٨

كامل بنفسك ٢

التوزيع التكرارى التالى يوضح عدد أيام غياب الطلاب فى أحد الفصول :

| عدد أيام الغياب | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | المجموع |
|-----------------|---|---|---|---|---|---------|
| عدد الطلاب | ٥ | ٧ | ٧ | ٥ | ٦ | ٣٠ |

احسب الوسط الحسابى والانحراف المعيارى لعدد أيام الغياب.

حساب الانحراف المعياري لتوزيع تكرارى ذى مجموعات

مثال ٣

فيما يلى التوزيع التكرارى للحافز الأسبوعى لعدد ١٠٠ عامل
فى أحد المصانع :



| الحوافز بالجنيه | -٣٥ | -٤٥ | -٥٥ | -٦٥ | -٧٥ | -٨٥ |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| عدد العمال | ١٠ | ١٤ | ٢٠ | ٢٨ | ٢٠ | ٨ |

أوجد الانحراف المعيارى لهذا التوزيع.

تذكر أن

$$\text{مركز المجموعة} = \frac{\text{الحد الأدنى} + \text{الحد الأعلى}}{٢}$$

١ نوجد الوسط الحسابى للحوافز (\bar{x}) وذلك باستخدام الجدول التالى :

| المجموعات | مراكز المجموعات (س) | التكرارات (ك) | س × ك |
|-----------|---------------------|---------------|-------|
| -٣٥ | ٤٠ | ١٠ | ٤٠٠ |
| -٤٥ | ٥٠ | ١٤ | ٧٠٠ |
| -٥٥ | ٦٠ | ٢٠ | ١٢٠٠ |
| -٦٥ | ٧٠ | ٢٨ | ١٩٦٠ |
| -٧٥ | ٨٠ | ٢٠ | ١٦٠٠ |
| -٨٥ | ٩٠ | ٨ | ٧٢٠ |
| المجموع | | ١٠٠ | ٦٥٨٠ |

$$\therefore \text{الوسط الحسابى } (\bar{x}) = \frac{\text{مجموع (س × ك)}}{\text{مجموع ك}} = \frac{٦٥٨٠}{١٠٠} = ٦٥,٨ \text{ جنيه.}$$

١٦٩

استخدام الآلة الحاسبة في حساب الانحراف المعياري

يمكن استخدام الآلة الحاسبة CASIO [fx-82 ES, fx-85 ES, fx-500 ES, fx-95 ES Plus, fx-991 ES Plus] في حساب الانحراف المعياري والخطوات التالية توضح كيفية حل المثال السابق (المثال ٢) باستخدام الحاسبة:

سوف نستخدم هنا الآلة الحاسبة (fx-95 ES Plus)

خطوة (١)


وقبل إدخال بيانات المثال السابق يجب أولاً ضبط نظام الآلة بضغط المفاتيح التالية من اليسار:



فتظهر لنا شاشة على الشكل

خطوة (٢)

نقوم بإدخال القيم (س) في حالة التوزيع التكراري البسيط أو مراكز المجموعات (س) في حالة التوزيع التكراري ذي المجموعات في العمود الأول (x) وبالنسبة للمثال السابق ندخل مراكز المجموعات ٤٠، ٥٠، ٦٠، ٧٠، ٨٠، ٩٠ بضغط الأزرار التالية من اليسار:



فتظهر لنا شاشة على الشكل

٢ تكون الجدول التالي:

| س | ك | س - س | (س - س)² | (س - س)² × ك |
|---------|-----|-------------------|----------|--------------|
| ٤٠ | ١٠ | ٤٠ - ٦٥,٨ = -٢٥,٨ | ٦٦٥,٦٤ | ٦٦٥٦,٤ |
| ٥٠ | ١٤ | ٥٠ - ٦٥,٨ = -١٥,٨ | ٢٤٩,٦٤ | ٣٤٩٤,٩٦ |
| ٦٠ | ٢٠ | ٦٠ - ٦٥,٨ = -٥,٨ | ٣٣,٦٤ | ٦٧٢,٨ |
| ٧٠ | ٢٨ | ٧٠ - ٦٥,٨ = ٤,٢ | ١٧,٦٤ | ٤٩٣,٩٢ |
| ٨٠ | ٢٠ | ٨٠ - ٦٥,٨ = ١٤,٢ | ٢٠١,٦٤ | ٤٠٣٢,٨ |
| ٩٠ | ٨ | ٩٠ - ٦٥,٨ = ٢٤,٢ | ٥٨٥,٦٤ | ٤٦٨٥,١٢ |
| المجموع | ١٠٠ | | | ٢٠٠٣٦ |

٣ نقوم بحساب الانحراف المعياري بالتعويض في القانون التالي:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (س - \bar{س})^2}{ن}} = \sqrt{\frac{٢٠٠٣٦}{١٠٠}} = \sqrt{٢٠٠,٣٦} = ١٤,١٥ \text{ جنيه.}$$

ملاحظات

- الانحراف المعياري يتأثر بكافة القيم ولا يتأثر فقط بالقيمتين الصغرى والكبرى كالمدي، لذلك فهو أكثر تعبيراً من المدي عن مقدار تشتت المجموعة.
- الانحراف المعياري له نفس وحدة القياس المستخدمة في البيانات المعطاة.
- القيم الأكثر تجانساً تكون أقل تشتتاً ويكون الانحراف المعياري لها أصغر.
- إذا كان الانحراف المعياري = صفر فمعنى ذلك أن كل قيم المفردات متساوية وهي حالة التجانس التام (التشتت المنعدم).

حاول بنفسك

احسب:

| المجموعات | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ |
|-----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| التكرار | ١١ | ٩ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |

- الوسط الحسابي.
- الانحراف المعياري.
- التوزيع التكراري المقابل.

تمارين 10

على التشتت

اختبار
تفاعلي



أسئلة كتاب الوزارة

أكمل ما يأتي :

- ١ من مقاييس التشتت ،
(سوهاج ١١)
- ٢ أبسط مقاييس التشتت هو
(دمياط ١١)
- ٣ لأي مجموعة من القيم إذا تساوت جميع المفردات فإن التشتت يساوي
(دمياط ١١)
- ٤ إذا كان الانحراف المعياري لتسعة من القيم هو ٣ فإن : $\sqrt{s - s}$ لهذه القيم هو
(سوهاج ١٨)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١ الفرق بين أكبر المفردات وأصغرها لمجموعة من المفردات يسمى
(بوسعيد ١٩، الشرقية ١٨، سوهاج ١٨)
- (أ) المدى. (ب) الوسط الحسابي. (ج) الوسيط. (د) الانحراف المعياري.
٢ الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي
(القليوبية ٢٠، الفيوم ١٩، بوسعيد ١٨، كفر الشيخ ١٨)
يسمى
(أ) المدى. (ب) الوسط الحسابي.
(ج) الانحراف المعياري. (د) المنوال.
- ٣ الوسط الحسابي لمجموعة القيم : ٧ ، ٣ ، ٦ ، ٩ ، ٥ يساوي
(الفيوم ١٨، الإسكندرية ١٧، ش. سيناء ١٧)
- (أ) ٣ (ب) ٦ (ج) ٤ (د) ١٢
٤ المدى لمجموعة القيم : ٢٣ ، ٢٢ ، ١٥ ، ١٨ ، ١٧ هو
(القاهرة ١٥)
- (أ) ٨ (ب) ١٨ (ج) ١٩ (د) ٢٣
٥ إذا كانت ٦٧ هي أكبر مفردات مجموعة ما وكان المدى يساوي ٢٧ فإن أصغر مفردات
(المنيا ١٦)
هذه المجموعة هي
(أ) ٦٧ (ب) ٤٠ (ج) ٢٧ (د) ٩٤

(الأقصر ١٦، دهباط ١٣)

٦ القيمة الأكثر تكرارًا لمجموعة من البيانات هي

(أ) الوسيط. (ب) المدى. (ج) المنوال. (د) المتوسط الحسابي.

٧ إذا كان الوسط الحسابي للأعداد : ٣ - ٣، ٣ - ٣، ١ - ٢، ١ - ٢، ٢ + ٢، ٢ + ٢ = (الإسكندرية ١١)

(أ) ٥ - (ب) ١٠ (ج) ٥ (د) $\frac{1}{5}$ ٨ إذا كان المدى للقيم : ٦ + ٦، ٦ - ٦، ٦ + ٥، ٦ - ٦، ٢ - ٦، ٢ + ٦ هو ١٤ حيث $\exists \text{ ك}$ (الشرقية ٢٠)فإن : $\text{ك} = \dots\dots\dots$

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

٩ إذا كان مدى القيم : ٢، ٧، ٩، ٦، ٨ حيث $٩ < \dots$ (الشرقية ١٤)فإن : $٩ = \dots\dots\dots$

(أ) ٤ (ب) ٩ (ج) ١ - (د) ١٠

١٠ أى من القيم الآتية للعدد ٩ تجعل مدى مجموعة القيم : ٥٣، ٩، ٥٨، ٥٧، ٦٠، ٥٥ يساوى ٩ ؟ (الاقطية ١٦)

(أ) ٦٣ (ب) ٦١ (ج) ٥١ (د) ٥٠

(الإسكندرية ٢٠، السويس ١٩)

١١ $\frac{\text{مجموع قيم المفردات}}{\text{عدد هذه القيم}} = \dots\dots\dots$

(أ) المدى. (ب) الانحراف المعياري.

(ج) الوسط الحسابي. (د) المنوال.

١٢ إذا كان : $٢ \text{ س} + ٢ \text{ ص} = ١٠$ ، $\text{س} \exists \text{ ح}$ ، $\text{ص} \exists \text{ ح}$ (السويس ١٦)

فإن الوسط الحسابي بين س، ص هو

(أ) $\frac{2}{5}$ (ب) $\frac{5}{3}$ (ج) ٥ (د) ٢

(القليوبية ١٥)

١٣ أكثر المجموعات الآتية تشتتًا هي المجموعة

(أ) ٢٨، ١٧، ٣٠، ٣٦، ٢٠ (ب) ٢٠، ٢٩، ١٩، ٣٧، ٤٣

(ج) ٣١، ٣٥، ٢٦، ٣٧، ٤١ (د) ٢٥، ٣٩، ١٩، ٥، ٢٧

(المنيا ١٨، دمياط ١٤)

١٤ أكثر مقاييس التشتت انتشاراً وأدقها

- (أ) المدى.
(ب) الوسط الحسابي.
(ج) الانحراف المعياري.
(د) الوسيط.

(الأقصر ٢٠، ح. سيناء ١٧)

١٥ إذا كانت جميع المفردات متساوية في القيمة فإن

- (أ) $\bar{x} - s < 0$
(ب) $\bar{x} - s > 0$
(ج) $\sigma = 0$
(د) $\bar{x} = s$

١٦ إذا كان : $\text{مح}(\bar{x} - s) = 48$ لمجموعة من القيم عددها يساوي ١٢

(المنوفية ١٩، القاهرة ١٧)

فإن : $\sigma = \dots\dots\dots$

- (أ) -٤ (ب) -٢ (ج) ٢ (د) ٤

٢ أكمل الجدول التالي ثم أجب :

| المجموعة ب | المجموعة أ | |
|---|---|-------------------|
| ٨٠، ٦٠، ٥٥، ٥٠، ٣٥، ٢٠ | ٥٨، ٥٥، ٥٢، ٥٠، ٤٥، ٤٠ | القيم |
| $\dots = \frac{\dots + \dots + \dots + \dots + 35 + 20}{6}$ | $\dots = \frac{\dots + \dots + \dots + \dots + 45 + 40}{6}$ | الوسط الحسابي |
| | | الوسيط |
| $\dots = \dots - \dots$ | $\dots = \dots - \dots$ | المدى |
| | | الانحراف المعياري |

أي المجموعتين أكثر تجانساً ؟

٣ احسب الانحراف المعياري لكل من البيانات التالية :

(بوسعيد ٢٠، المنوفية ١٩، الغربية ١٨، المنوفية ١٧) «٩، ٣»
(دمياط ٢٠، الأقصر ١٩) «٧، ١»
«١٥، ٣»
«١، ٣»

- ١ «١٦، ٣٢، ٥، ٢٠، ٢٧»
٢ «٧٢، ٥٣، ٦١، ٧٠، ٥٩»
٣ «١٥، ١٢، ٩، ٢٧، ٦»
٤ «٢٢، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ١٨»

٥ أى المجموعات التالية أكثر تشتتًا ؟ (باستخدام الانحراف المعياري)

المجموعة (أ) : ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١

المجموعة (ب) : ٢١ ، ٢٠ ، ١١ ، ١٩

المجموعة (ج) : ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٥

٦ احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل من البيانات التالية :

١ ٧٣ ، ٥٤ ، ٦٢ ، ٧١ ، ٦٠

(قنا ٢٠ ، أسبوط ١٧) « ٦٤ ، ٧٠ ، ٧١ »

٢ ١٣ ، ١٤ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٢ لأقرب ثلاثة أرقام عشرية.

(الشرقية ١٧) « ١٧ ، ٢٠ ، ٢١ »

٣ ٧٠ ، ٧٦ ، ٧٠ ، ٦٤ ، ٧٠ ، ٦١ ، ٦٥

« ٦٨ ، ٦٩ »

٤ ١٠ ، ٣٧ ، ٩ ، ٨ ، ١٦ ، ١٥ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٢ ، ٢٣

« ١٦ ، ١٧ »

٧ القيم التالية تمثل درجات خمسة طلاب فى أحد الاختبارات : ٨ ، ٩ ، ٦ ، ١٢ ، ١٠ أوجد :
١ الوسط الحسابي لدرجات الطلاب.
٢ الانحراف المعياري لدرجات الطلاب.

(الدقهلية ١٧) « ٩ ، ١٠ »

٨ الجدول المقابل يبين درجات الحرارة على بعض المدن :

١ احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجة الحرارة العظمى.
٢ احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجة الحرارة الصغرى.

| المدينة | عظمى | صغرى |
|-------------|------|------|
| الإسماعيلية | ٢٥ | ١١ |
| السويس | ٢٦ | ١٢ |
| العريش | ٢٤ | ١٠ |
| نخل | ٢٤ | ٦ |
| طابا | ٢٢ | ٧ |
| الطور | ٢٦ | ١٦ |
| الغردقة | ٢٧ | ١٥ |
| رفح | ٢٦ | ١١ |

« ٢٥ ، ١٠ ، ١١ ، ٢٠ »

التوزيع التكرارى التالى يبين عدد أطفال بعض الأسر فى إحدى المدن الجديدة :

(المنوفية ٢٠، الإسكندرية ١٩، البحيرة ١٦)

| عدد الأطفال | صفر | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|-------------|-----|----|----|----|---|
| عدد الأسر | ٨ | ١٦ | ٥٠ | ٢٠ | ٦ |

« ١، ٢ »

احسب الوسط الحسابى والانحراف المعيارى لعدد الأطفال.

فيما يلى التوزيع التكرارى لعدد الوحدات التالفة التى وجدت فى ١٠٠ صندوق فى

(سوهاج ١٨، البحيرة ١٧، البحيرة ١٤)

الوحدات المصنعة :

| عدد الوحدات التالفة | صفر | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|---------------------|-----|----|----|----|----|----|
| عدد الصناديق | ٣ | ١٦ | ١٧ | ٢٥ | ٢٠ | ١٩ |

« ١، ٤ »

أوجد الانحراف المعيارى للوحدات التالفة.

التوزيع التكرارى الآتى يبين عدد الأهداف التى سجلها ٣٠ لاعباً من ٥ ضربات جزاء لكل منهم

فى أحد التدريبات :

| عدد الأهداف التى تم تسجيلها | صفر | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|-----------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| عدد اللاعبين | ٢ | ٤ | ٥ | ٨ | ٧ | ٤ |

« ١، ٤، ٢، ٩ »

أوجد الوسط الحسابى والانحراف المعيارى لعدد الأهداف المسجلة.

فيما يلى توزيع تكرارى يبين أعمار ١٠ أطفال : (القاهرة ٢٠، قنا ١٩، الجيزة ١٨، الإسكندرية ١٧)

| العمر بالسنوات | ٥ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٢ | المجموع |
|----------------|---|---|---|----|----|---------|
| عدد الأطفال | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١٠ |

« ١، ٧ »

احسب الانحراف المعيارى للعمر بالسنوات.

١٣ الجدول التالي يبين التوزيع التكرارى لعدد الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية من مدرسة بها عشرون فصلاً :

| عدد الطلاب الفائزين | صفر | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | المجموع |
|---------------------|-----|---|---|---|---|---|---------|
| عدد الفصول | ١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٣ | ٢ | ٢٠ |

أوجد الوسط الحسابى والانحراف المعياري لعدد الطلاب.

١٤ الجدول التالي يمثل توزيعاً تكرارياً ذى مجموعات لدرجات الحرارة في بعض المدن العالمية :

| مجموعات الدرجات | -٥ | -١٥ | -٢٥ | -٣٥ | -٤٥ |
|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|
| التكرار | ٧ | ٩ | ١١ | ١٥ | ٨ |

أوجد الوسط الحسابى والانحراف المعياري لدرجات الحرارة.

١٥ للتوزيع التكرارى التالى احسب الوسط الحسابى والانحراف المعياري : (الغريبة ١٧ ، قنا ١٦)

| المجموعات | صفر - | -٤ | -٨ | -١٢ | -١٦ | ٢٠ | المجموع |
|-----------|-------|----|----|-----|-----|----|---------|
| التكرار | ٣ | ٤ | ٧ | ٢ | ٩ | ٢٥ | |

١٦ الجدول التالي يمثل الأجر اليومى لمجموعة من العمال بأحد المصانع :

| مجموعات الأجر | -٢٠ | -٣٠ | -٤٠ | -٥٠ | -٦٠ | -٧٠ |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| عدد العمال | ١٠ | ١٢ | ٨ | ٦ | ٣ | ١ |

أوجد الوسط الحسابى والانحراف المعياري للأجر.

١٧ التوزيع التكرارى التالى يبين كمية البنزين التى تستهلكها مجموعة من السيارات :

| عدد الكيلو مترات لكل لتر | -٥ | -٧ | -٩ | -١١ | -١٣ | -١٥ | ١٧ | المجموع |
|--------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|----|---------|
| عدد السيارات | ٣ | ٦ | ١٠ | ١٢ | ٥ | ٤ | ٤٠ | |

أوجد الانحراف المعياري لعدد الكيلو مترات لكل لتر.

التوزيع التكرارى التالى يبين قيمة فاتورة الكهرباء لـ ٢٠٠ مشترك :

| قيمة الفاتورة بالجنيه | -٥ | -١٥ | -٢٥ | -٣٥ | -٤٥ | -٥٥ | المجموع |
|-------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| عدد المشتركين (التكرار) | ١٩ | ٥٠ | ٨٥ | ٢٥ | ١٥ | ٦ | ٢٠٠ |

أوجد الوسط الحسابى والانحراف المعيارى لقيم الفواتير. « ٢٩,٢٥ ، ١١,٥ »

للمتفوقين

الجدولان التكراريان التاليان يمثلان توزيع درجات تلاميذ الفصلين أ ، ب فى الصف الثالث الإعدادى فى أحد الاختبارات :

| مجموعات الدرجات | -٠ | -١٠ | -٢٠ | -٣٠ | -٤٠-٥٠ | المجموع |
|-----------------|----|-----|-----|-----|--------|---------|
| عدد التلاميذ | ٢ | ٥ | ١١ | ١٥ | ٧ | ٤٠ |

فصل أ

| مجموعات الدرجات | -٠ | -١٠ | -٢٠ | -٣٠ | -٤٠-٥٠ | المجموع |
|-----------------|----|-----|-----|-----|--------|---------|
| عدد التلاميذ | ٢ | ٣ | ١٨ | ٧ | ١٠ | ٤٠ |

فصل ب

١ مثل كلاً من التوزيعين بالمضلع التكرارى على شكل واحد.

٢ أوجد الوسط الحسابى والانحراف المعيارى لكل من التوزيعين التكراريين.

« ٣٠, ١٠, ٧, ٣٠, ١١ »

٣ أى الفصلين أكثر تجانساً فى مستوى التحصيل ؟

☆ مصادر جمع البيانات :

• مصادر أولية (ميدانية) : وهى المصادر التى يحصل منها الباحث على البيانات بشكل مباشر.

• مصادر ثانوية (تاريخية) : وهى المصادر التى يحصل منها الباحث على البيانات التى تم تجميعها وتسجيلها من قبل بواسطة آخرين.

☆ أساليب جمع البيانات :

• أسلوب الحصر الشامل : ويقوم على جمع البيانات حول الظاهرة محل الدراسة من جميع مفردات المجتمع الإحصائى ، ويستخدم لحصر جميع مفردات المجتمع.

• أسلوب العينات : ويقوم على جمع البيانات حول الظاهرة محل الدراسة من عينة ممثلة للمجتمع كله وإجراء البحث عليها ، ثم تعميم النتائج على المجتمع كله.

☆ العينات :

• العينة هى جزء صغير من مجتمع كبير تشبه المجتمع وتمثله.

• العينة غير العشوائية (العمدية) : هى عينة يتم فيها اختيار مفردات بعينها من مفردات المجتمع الإحصائى دون غيرها بحيث تناسب أهداف البحث.

• العينة العشوائية البسيطة : هى عينة تستخدم مع المجتمعات المتجانسة الغير مقسمة بطبيعتها إلى فئات أو طبقات.

• العينة العشوائية الطبقية : هى عينة تستخدم فى حالة المجتمعات الإحصائية غير المتجانسة المقسمة بطبعتها إلى مجموعات نوعية تختلف فى الصفات.

• عدد مفردات الطبقة فى العينة = $\frac{\text{عدد مفردات الطبقة الكلى}}{\text{عدد مفردات المجتمع الكلى}} \times \text{عدد مفردات العينة}$

«مع تقريب الناتج لأقرب وحدة»

☆ التشتت :

• التشتت هو مقياس يعبر عن مدى تجانس المجموعات.

• المدى لمجموعة من المفردات هو الفرق بين أكبر مفردة وأصغر مفردة فى المجموعة.

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة لمجموعة من البيانات هو

- (أ) المدى. (ب) الوسط الحسابي.
(ج) الوسيط. (د) الانحراف المعياري.

٢ إذا كان : $\mu = (\bar{x} - s)^2 = 36$ لمجموعة من القيم عددها ٩ فإن : $\sigma = \dots$

- (أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ١٨ (د) ٢٧

٣ اختيار عينة من طبقات المجتمع الإحصائي تسمى بالعينة

- (أ) العشوائية. (ب) الطبقية. (ج) العمدية. (د) العنقودية.

٤ المدى لمجموعة القيم : ٥ ، ١٤ ، ٤ ، ٣٧ ، ١٥ ، ١٦ ، ٧ هو

- (أ) ٣٠ (ب) ٣٣ (ج) ٣٢ (د) ٢٢

٥ الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يسمى

- (أ) المدى. (ب) الوسط الحسابي.
(ج) الوسيط. (د) الانحراف المعياري.

٦ الانحراف المعياري للكميات : ٥ ، ٥ ، ٥ ، ٥ يساوي

- (أ) صفر (ب) ٥ (ج) ٦٢ (د) ٢

٢ احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم الآتية :

٢٧ ، ٢٠ ، ٥ ، ٣٢ ، ١٦

٣ إذا كان بيان عدد الأفراد في ٥٠ أسرة كما يلي :

| | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|---|-------------|
| ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | عدد الأفراد |
| ٤ | ٥ | ٩ | ١٢ | ٨ | ٧ | ٥ | عدد الأسر |

أوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعدد الأفراد.

٤ التوزيع التكراري الآتي يبين درجات ٢٠ طالبًا في أحد الاختبارات :

| | | | | | |
|----|----|----|----|------|-----------|
| -٨ | -٦ | -٤ | -٢ | صفر- | المجموعات |
| ٥ | ٥ | ٦ | ٣ | ١ | التكرار |

احسب الانحراف المعياري.

مشروع بحثي

على الوحدة الثالثة

أهداف المشروع

- جمع البيانات وتنظيمها في جداول تكرارية ذات مجموعات.
- حساب المدى لمجموعة من المفردات.
- حساب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لتوزيع تكراري ذي مجموعات.
- تقدير دور الإحصاء في الحياة العملية.

المطلوب

« يعتبر الانحراف المعياري أهم وأدق مقاييس التشتت وأوسعها انتشارا »

في ضوء ذلك قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي :

- اختر اثنين من مقاييس التشتت وتكلم عنهما موضحًا مميزات وعيوب كل منهما.
- سجل درجات أصدقائك بالفصل في أحد امتحانات مادة الرياضيات، وفي أحد امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية، ثم قم بما يلي :

أوجد المدى لدرجات فصلك في كل مادة من المادتين .

كون الجدول التكراري ذي المجموعات لدرجات مادة الرياضيات، ومن هذا الجدول احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات فصلك في مادة الرياضيات .

كون الجدول التكراري ذي المجموعات لدرجات مادة الدراسات الاجتماعية، ومن هذا الجدول احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات فصلك في مادة الدراسات الاجتماعية .

اذكر المادة التي يكون مستوى تحصيل فصلك فيها أكثر تجانسًا .

مفاهيم ومهارات أساسية تراكمية

نتر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(الاستدراية ١٦)

..... $\supset \{2\}$

$\{7, 3\}$ (د)

$]7, 2[$ (ج)

$[7, 2[$ (ب)

$(7, 2)$ (أ)

(مطروحة ١٧٤)

..... $= \{7, 2\} - [7, 2]$

$\{0\}$ (د)

$]7, 2[$ (ج)

\emptyset (ب)

$[6, 1)$ (أ)

(الوادي الجديد ٢٠)

العدد التالي في النمط : $\sqrt{3}, \sqrt{12}, \sqrt{27}, \sqrt{48}$ هو

$\sqrt{90}$ (د)

$\sqrt{60}$ (ج)

$\sqrt{75}$ (ب)

$\sqrt{50}$ (أ)

(الأقصر ١٧)

..... $+ 2.162 = 2.172$

2.162 (د)

2.16 (ج)

2 (ب)

1 (أ)

إذا كانت : $[3, 2] = [0, \infty) \cap [-1, \infty)$ فإن : $\infty =$

$1-$ (د)

9 (ج)

$\frac{1}{5}$ (ب)

8 (أ)

عندما يزداد طول ضلع مربع بنسبة ١٠٪ فإن مساحته تزداد بنسبة

21 (د)

20 (ج)

15 (ب)

10 (أ)

نسبة مساحة منطقة مربعة طول ضلعها s سم إلى مساحة منطقة مربعة أخرى طول ضلعها $2s$ سم كنسبة

(بن سويف ١٧)

$1 : 4$ (د)

$4 : 1$ (ج)

$4 : s$ (ب)

$2 : 1$ (أ)

٨ إذا كان : ف عددًا فرديًا فإن العدد الفردي التالي له هو (ج. سينا، ١٩، الجية ١٧)

(أ) $ف^2$ (ب) $ف^2 + ف$ (ج) $ف + ١$ (د) $ف + ٢$

٩ إذا كانت : م تمثل عددًا سالبًا فأى من الآتى يمثل عددًا موجبًا ؟

(أ) $م^2$ (ب) $م^2$ (ج) $٢ م$ (د) $\frac{م}{٢}$

١٠ نصف العدد ٢٠٢ هو

(أ) ١٠٢ (ب) ٢٠١ (ج) ١٩٢ (د) ١٠١

١١ إذا كانت : (س - ٣) صفر = ١ فإن : س \exists

(أ) س (ب) $س - ٣$ (ج) $س - ٤$ (د) $س - ١$

١٢ = $١٠٠٠ \left(\frac{١ + \sqrt{٢}}{٢} \right) ١٠٠٠ \left(\frac{١ - \sqrt{٢}}{٢} \right)$

(أ) صفر (ب) ١ (ج) $\frac{١ - ١٠٠٠٠}{٤}$ (د) ١٠٠٠٠٤

١٣ = $س^٣ + س^٣ + س^٣$

(أ) $٩ س$ (ب) $٣ س$ (ج) $٣ س + ١$ (د) $٣ س + ٢$

١٤ = $٥٢ + ٥٢ + ٥٢ + ٥٢$

(أ) ٧٢ (ب) ٦٢ (ج) ٤٢ (د) ٢٠٢

١٥ إذا كان : س - ص = ٥ ، س + ص = $\frac{١}{٥}$

فإن : س - ص =

(أ) $\frac{١}{٢٥}$ (ب) ١ (ج) ٢٥ (د) ٥

١٦ إذا كان : س + ص = ص = ص - ص = ٥

فإن : س - ص + ص =

(أ) ١٠ (ب) ١٥ (ج) ٢٠ (د) ٢٥

١٧ إذا كان : (س - ص) = ٢٠ ، س + ص = ١٠

فإن : س - ص =

(أ) ١٠ (ب) ٥ (ج) ٥- (د) ٢٠

١٨ إذا كان $1 > x > 2$ ، $x \in \mathbb{R}$ فإن $(2 - x - 1) \exists$ (الجينة ٢٠)

(أ) $[1, 2]$ (ب) $[1, 2[$ (ج) $]1, 2[$ (د) $\{1, 2\}$

١٩ مجموعة حل المتباينة $5 - 3 < x < 11$ في \mathbb{R} هي (تكملة الشبلا ١٧)

(أ) $]-\infty, 2[$ (ب) $]2, \infty[$ (ج) $]-2, \infty[$ (د) $[2, 2-]$

٢٠ مجموع الجذرين التربيعيين للعدد $\frac{1}{4}$ هو (ش. سيناء، ١٩، المنوفية ١٧)

(أ) $\frac{1}{4}$ (ب) صفر (ج) $\frac{1}{2}$ (د) $2\sqrt{2}$

٢١ أربعة أمثال العدد 2^8 هو (سوهاج ١٩، الإسكندرية ١٧)

(أ) 2^{22} (ب) 2^8 (ج) 2^{10} (د) 2^4

٢٢ إذا كان $x = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ ، $\frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} = y$ ، فإن $y = (x + y)^2 =$ (الغربية ١٧)

(أ) ٨ (ب) صفر (ج) ٩ (د) ١٢

٢٣ إذا كان $x = 2$ ، $\frac{1}{x} = y$ فإن $y =$ (المنوفية ١٧)

(أ) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) ٣ (د) $3 -$

٢٤ إذا كان عدد صفحات كتاب هو ٥٦ صفحة، كم صفحة يظهر بها الرقم ٥ في ترقيم صفحات الكتاب؟

(أ) ٦ (ب) ٧ (ج) ١٢ (د) ١٣

٢٥ طريق طوله ١٢ كم وضعنا على جانب واحد منه أعمدة إنارة من بدايته حتى نهايته وكانت المسافة بين كل عمودين $\frac{1}{4}$ كيلو متر فإن عدد الأعمدة يساوي (الاسكندرية ١٧)

(أ) ١٢ (ب) ٢٤ (ج) ٢٥ (د) ٢٣

٢٦ العدد الذي يقع بين ٠,٧ و ٠,٨ هو (الاسكندرية ١٧)

(أ) ٠,٧٥ (ب) ٠,٠٧٥ (ج) ٠,٠٧٥ (د) ٠,٧٥ -

٢٧ مربع ضعف العدد (نصف) هو

- (أ) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{1}{8}$ (ج) ١ (د) ٢

٢٨ إذا كان ثلاثة أمثال عدد = ٤٥ ، فإن : $\frac{1}{5}$ هذا العدد يساوي

- (أ) ١٥ (ب) ٥ (ج) ٣ (د) ٩

٢٩ إذا كان : $\frac{5}{4} = \frac{5}{س} + \frac{5}{٢}$ فإن : س =

- (أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) $\frac{5}{٢}$

٣٠ = $\{١-، ٣-\} \cap [٢، ١-]$

- (أ) \emptyset (ب) $\{٣-\}$ (ج) $\{١-\}$ (د) $\{٣\}$

٣١ = $]٧، ٢[- [٧، ٢]$

- (أ) \emptyset (ب) $\{٢\}$ (ج) $\{٧\}$ (د) $\{٧، ٢\}$

٣٢ ص - ط =

- (أ) \emptyset (ب) ط (ج) ص (د) ح

٣٣ المقدار : $(س - ٢)^٢ - س^٢$ من الدرجة
(أ) الأولى.
(ب) الثانية.

٣٤ مجموعة حل المعادلة : س - ١ = |١ - س| في ط هي

- (أ) (١، ٢) (ب) ٢ (ج) الثالثة. (د) الرابعة.

٣٥ إذا كان : ١٧ = س + ٨ = ١١ فإن : ١٧ = س + ١١ =

- (أ) ٨ (ب) ١١ (ج) $\{٢\}$ (د) $\{٢-\}$

٣٦ = ١١ + س = ١٧

- (أ) ١٧ (ب) ١٤ (ج) ١٤ (د) ١٧

حساب المثلثات والهندسة

ثانياً



١٩٠

حساب المثلثات

4 الوحدة

٢٣٠

الهندسة التحليلية

5 الوحدة

٣٠٣

مفاهيم ومهارات أساسية تراكمية.

(د) ٢

(المنقبة ١٩)

(د) ٩

(المنقبة ٢٠)

(د) $\frac{5}{3}$

(أسبوط ١٨)

(د) {٣}

(بني سوييف ١٨)

(د) {٧، ٢}

تدريية ١٨، الأقصر ١٧

(د) ع

(آقمر الشبخ ٢٠)

(د) الرابعة.


(السوييف ١٨)

(د) {٢-}

(الإسماعيلية ١٩)

(د) ١٧

حساب المثلثات



دروس الوحدة :

- الدرس 1 النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة.
- الدرس 2 النسب المثلثية الأساسية لبعض الزوايا.

مشروع بحثي على الوحدة الرابعة



يمكنك حل
الامتحانات
التفاعلية على
الدروس من خلال
مسح QR code
الخاص بكل امتحان

أهداف الوحدة :

- بعد دراسة هذه الوحدة يجب أن يكون التلميذ قادراً على أن :
- يعرف النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة.
- يعرف النسب المثلثية الأساسية للزوايا التي قياساتها 30° ، 60° ، 45° .
- يوجد النسب المثلثية الأساسية لزاوية معلومة.
- يوجد قياس زاوية بمعرفة إحدى نسبها المثلثية.
- يستخدم الآلة الحاسبة لإيجاد النسب المثلثية الأساسية.

معلومة إثرائية

حساب المثلثات هو فرع من فروع الرياضيات ، وهو أحد فروع علم الهندسة العامة ، ويتناول دراسة الزوايا والمثلثات والتوابع المثلثية مثل الجيب وجيب التمام ، يعتبر قدماء المصريين أول من عمل بقواعد حساب المثلثات إذ استخدموها في بناء الأهرامات وبناء معابدهم ، ولحساب المثلثات تطبيقات كثيرة منها حساب المسافات والزوايا في إنشاء المباني والطرق ، وفي صناعة الموتورات وأجهزة التلفزيون وملعب الكرة ، وكذلك في حساب المسافات الجغرافية والفلك وأنظمة الاستكشاف بالأقمار الصناعية.

حل آخر باستخدام الآلة الحاسبة العلمية :

نضغط على مفاتيح الآلة بالتتابع من اليسار إلى اليمين كالتالي :

$$2 \quad 2 \quad 0.000 \quad 3 \quad 6 \quad 0.000 \quad 4 \quad 8 \quad 0.000 \quad = \quad 0.000$$

فنجد الناتج : ٢٢,٦١٣٣٣٣٣

٢ نحول ١٨° إلى دقائق كالتالي : $١٨^\circ = ٦٠ \times ٠,١٨ = ١٠,٨$

نحول $٠,٨$ إلى ثواني كالتالي : $٠,٨ = ٦٠ \times ٠,٠٨ = ٤٨$

أي أن : $١٨^\circ = ٤٥^\circ ١٠' ٤٨''$

حل آخر باستخدام الآلة الحاسبة العلمية :

نضغط على مفاتيح الآلة بالتتابع من اليسار إلى اليمين كالتالي :

$$4 \quad 5 \quad 0 \quad 1 \quad 8 \quad = \quad 0.000$$

فنجد الناتج : $٤٥^\circ ١٠' ٤٨''$

مثال ٢

إذا كانت النسبة بين قياسي زاويتين متتامتين ٧ : ٩ فأوجد القياس الستيني لكل منهما.

الحل

تذكر أن

- مجموع قياسي الزاويتين المتتامتين $= ٩٠^\circ$
- مجموع قياسي الزاويتين المتكاملتين $= ١٨٠^\circ$
- مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة $= ١٨٠^\circ$

نفرض أن قياسي الزاويتين : ٧ س ، ٩ س

$$\therefore ٧ س + ٩ س = ٩٠^\circ$$

$$\therefore ١٦ س = ٩٠^\circ$$

$$\therefore س = \frac{٩٠}{١٦} = ٥,٦٢٥^\circ$$

$$\therefore \text{قياس الزاوية الأولى} = ٥,٦٢٥^\circ \times ٧ = ٣٩,٣٧٥^\circ = ٣٩^\circ ٢٢' ٤٠''$$

$$\text{قياس الزاوية الثانية} = ٥,٦٢٥^\circ \times ٩ = ٥٠,٦٢٥^\circ = ٥٠^\circ ٣٧' ٤٠''$$

حاول بنفسك ١

إذا كانت النسبة بين قياسي زاويتين متكاملتين ٥ : ١١ فأوجد القياس الستيني لكل منهما.



الدرس

1

النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة

تمهيد

* سبق أن درست وحدات القياس الستيني للزاوية وهي :

الدرجة ويرمز لها بالرمز $^\circ$ ، الدقيقة ويرمز لها بالرمز $'$ ، الثانية ويرمز لها بالرمز $''$

فمثلاً : الزاوية التي قياسها ٢٢ درجة ، ٣٦ دقيقة ، ٤٨ ثانية تُكتب $٢٢^\circ ٣٦' ٤٨''$

العلاقة بين الدرجات والدقائق والثواني :

$$١^\circ = ٦٠'$$

$$١' = ٦٠''$$

$$\text{أي أن : } ١^\circ = ٦٠ \times ٦٠ = ٣٦٠٠''$$

مثال ١

١ اكتب بالدرجات : $٢٢^\circ ٣٦' ٤٨''$

الحل

تذكر أن

١ نحول الدقائق إلى درجات كالتالي : $٣٦' = \frac{٣٦}{٦٠} = ٠,٦^\circ$ ، يقرأ : ٠,٦ دأثرى

نحول الثواني إلى درجات كالتالي : $٤٨'' = \frac{٤٨}{٣٦٠٠} = ٠,٠١٣^\circ$

$$\text{أي أن : } ٢٢^\circ ٣٦' ٤٨'' = ٢٢^\circ + ٠,٦^\circ + ٠,٠١٣^\circ = ٢٢,٦١٣^\circ$$

النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة

النسبة المثلثية للزاوية الحادة :
هي نسبة بين طولي ضلعين من أضلاع المثلث القائم الزاوية التي تقع فيه هذه الزاوية.

ويوجد ثلاث نسب مثلثية أساسية للزاوية الحادة وهي :

١ جيب الزاوية :

وتكتب اختصاراً (جا) وتساوى

طول الضلع المقابل للزاوية
طول الوتر

٢ جيب تمام الزاوية :

وتكتب اختصاراً (مجا) وتساوى

طول الضلع المجاور للزاوية
طول الوتر

٣ ظل الزاوية :


وتكتب اختصاراً (ظا) وتساوى

طول الضلع المقابل للزاوية
طول الضلع المجاور للزاوية

أى أنه :

إذا كان Δ قائم الزاوية في ب فإن :

بالنسبة لزاوية حـ




$$١ \text{ جا ح} = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{\text{ب}}{\text{ا}}$$

$$٢ \text{ مجا ح} = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{\text{ب}}{\text{ا}}$$

$$٣ \text{ ظا ح} = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{\text{ب}}{\text{ب}}$$

بالنسبة لزاوية بـ



$$١ \text{ جا ب} = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{\text{ا}}{\text{ا}}$$

$$٢ \text{ مجا ب} = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{\text{ب}}{\text{ا}}$$

$$٣ \text{ ظا ب} = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{\text{ا}}{\text{ب}}$$

أمثلة : في الشكل المقابل :

إذا كان Δ قائم الزاوية في ب
وكان : $\text{ب} = ٢ \text{ سم}$ ، $\text{ب} = ٤ \text{ سم}$ ، $\text{ا} = ٥ \text{ سم}$

$$١ \text{ جا ح} = \frac{٢}{٥}$$

$$٢ \text{ مجا ح} = \frac{٤}{٥}$$

$$٣ \text{ ظا ح} = \frac{٢}{٤}$$

$$١ \text{ جا ب} = \frac{٤}{٥}$$

$$٢ \text{ مجا ب} = \frac{٢}{٥}$$

$$٣ \text{ ظا ب} = \frac{٤}{٢}$$

مثال ٣

في الشكل المقابل :


ا ح مثلث قائم الزاوية في ب حيث :

$\text{ا} = ٩ \text{ سم}$ ، $\text{ا} = ١٢ \text{ سم}$

١ أوجد كلًا من : جا ب ، مجا ب ، ظا ب ، جا ح ، مجا ح ، ظا ح

٢ أثبت أن : $\text{جا ب} + \text{مجا ح} = ١$

تذكر نظرية فيثاغورس



إذا كان Δ قائم الزاوية في ب

الزاوية في ب فإن :

$$\text{ا}^2 = \text{ب}^2 + \text{ج}^2$$

$$\text{ا}^2 - \text{ب}^2 = \text{ج}^2$$

$$\text{ا}^2 - \text{ج}^2 = \text{ب}^2$$

Δ ا ح فيه : $\text{ا} = ٩٠^\circ$

$$\text{ا}^2 = \text{ب}^2 + \text{ج}^2 \quad (\text{فيثاغورس})$$

$$\text{ا}^2 = ١٤٤ + ٨١ = ٢٢٥$$

$$\text{ا} = ١٥ \text{ سم}$$

$$١ \text{ جا ب} = \frac{\text{ب}}{\text{ا}} = \frac{٩}{١٥} = \frac{٣}{٥} ، \text{مجا ب} = \frac{\text{ج}}{\text{ا}} = \frac{١٢}{١٥} = \frac{٤}{٥}$$

$$\text{ظا ب} = \frac{\text{ب}}{\text{ج}} = \frac{٩}{١٢} = \frac{٣}{٤} ، \text{مجا ح} = \frac{\text{ج}}{\text{ا}} = \frac{١٢}{١٥} = \frac{٤}{٥}$$

$$\text{ظا ح} = \frac{\text{ب}}{\text{ج}} = \frac{٩}{١٢} = \frac{٣}{٤} ، \text{مجا ب} = \frac{\text{ج}}{\text{ا}} = \frac{١٢}{١٥} = \frac{٤}{٥}$$

$$\text{جا ب} + \text{مجا ح} = \frac{٣}{٥} + \frac{٤}{٥} = \frac{٧}{٥} = ١$$

مثال ٤


رسم ۱۵۱ \overline{AB} يقطعها في

1 أوجد قيمة : $ما + مباح$

٢ أوجد قيمة : ط (د ح ٤٢)

٢ بين أن : $ma + ma < 1$ ثم أوجد قيمة : $ma + ma$ ح

واستنتج أن : $ما^2 ح + ما^2 ح > ما ح + ما ح$



$\therefore \overline{a} \perp \overline{b} , \overline{a} = -\overline{b} \quad \therefore$ متتصف با

$\therefore 5 = 5 = 6$ سم

في Δ \angle $\therefore \angle$ $(\angle \angle) = 90^\circ$

$$\therefore {}^2(59) = {}^2(57) - {}^2(56) \text{ (فیثاغورس)}$$

$$78 = 36 - 1 \dots = {}^r(51) \therefore$$

$$\therefore \lambda = 59 \text{ سم}$$

$$\frac{3}{0} = \frac{7}{1.} = \frac{5}{2} = \text{مأح} , \quad \frac{4}{0} = \frac{8}{1.} = \frac{59}{2} = \text{مأب} \therefore 1$$

$$\frac{V}{O} = \frac{r}{O} + \frac{e}{O} = \text{مناح} + \text{ما} \therefore$$

$$\frac{3}{4} = \frac{6}{8} = \frac{9}{12} = (9-3) \text{ لبا } 2$$

$$\frac{r}{0} = \text{مباح} , \quad \frac{\varepsilon}{0} = \frac{1}{10} = \frac{59}{100} = \text{مباح} \therefore \text{2}$$

$$\therefore \text{ماح} + \text{ماح} < 1$$

$$1 = \frac{9}{r_0} + \frac{17}{r_0} = r\left(\frac{r}{0}\right) + r\left(\frac{8}{0}\right) = \cancel{2r_0} + \cancel{2r_0}$$

$$\therefore \text{م}^{\text{أ}} \text{ح} + \text{م}^{\text{أ}} \text{ح} > \text{م}^{\text{أ}} \text{ح} + \text{م}^{\text{أ}} \text{ح}$$

ملاحظات

في المثال السابق لاحظ أن :

۱) ماب = مباح = $\frac{4}{5}$ ، ماح = مباح = $\frac{3}{5}$

وبملاحظة أن: $\psi (دب) + \psi (دح) = 90^\circ$ (زاويتان متتامتان).

يمكن أن نستنتج أن :-

جيب أى زاوية حادة يساوى جيب تمام الزاوية المتمة لها.

أي أنه : إذا كان : $90^\circ = (11)^\circ + (79)^\circ$

فإن: $\text{ما} ١ = \text{ما} ٢$ $\text{ما} ٢ = \text{ما} ١$

والعكس صحيح أى أنه :

إذا كانت d ، d زاويتين حادتين وكان : $ma = mb$

فإن: $\psi(1) + \psi(2) = 90^\circ$

$$\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{6}} = 2 \quad \therefore \quad \frac{2}{3} = 2 \quad , \quad \frac{2}{3} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} = \frac{2}{1} \quad (2)$$

$$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{3}} = 1 \quad \therefore \quad \frac{2}{3} = 1 \quad , \quad \frac{2}{3} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{1}$$

وصفة عامة يكون : ظل الزاوية = $\frac{\text{جيب الزاوية}}{\text{جيب تمام الزاوية}}$

٢ حاور بنفسك

س ص ع مثلث قائم الزاوية في ص فيه : س ص = ٤ سم ، س ع = ٥ سم

١) أوجد قيمة: ٢ ما من مئاس

٢ أثبت أن : $\text{ماس مئاع} + \text{مئاس مئاع} = ١$

تمارين 1

على النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة



اختبار
تفاعلي



أسئلة كتاب الوزارة

١ أكمل ما يأتي :

١ $\sin 82^\circ 48' = \dots\dots\dots$ (بالدرجات)

٢ $\cos 56^\circ 18' = \dots\dots\dots$ (بالدرجات والدقائق والثواني)

٣ في الشكل المقابل :


س ص ع مثلث قائم الزاوية في ص فيه :

س ص = ٨ سم ، س ع = ١٧ سم فإن :

(أ) $\sin = \dots\dots\dots$ ، $\cos = \dots\dots\dots$

(ب) $\sin = \dots\dots\dots$ ، $\cos = \dots\dots\dots$

(ج) $\sin = \dots\dots\dots$ ، $\cos = \dots\dots\dots$




٤ في الشكل المقابل :

$\triangle ABC$ قائم الزاوية في ب

، $AB = 3$ سم


، $BC = 5$ سم

فإن : $\sin A \times \cos A = \dots\dots\dots$




٥ في الشكل المقابل :

$\sin A = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots}$



٦ في الشكل المقابل :

$\sin A = \dots\dots\dots$



اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(الإسماعيلية ١٢)

١. لأي زاوية حادة α يكون $\tan \alpha = \dots\dots\dots$

- (أ) $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ (ب) $\sin \alpha + \cos \alpha$ (ج) $\frac{\sin \alpha}{\tan \alpha}$ (د) $\sin \alpha + \tan \alpha$

٢. إذا كان $\sin \alpha : \cos \alpha = \frac{3}{5}$ ، ص قياسي زاويتين متتامتين وكان $\sin \alpha = \frac{3}{5}$

(الجينة ٢٠، البجدة ١٨، الجينة ١٧)

فإن $\sin \alpha = \dots\dots\dots$

- (أ) $\frac{4}{5}$ (ب) $\frac{3}{5}$ (ج) $\frac{3}{4}$ (د) $\frac{5}{3}$

٣. لأي زاويتين حادتين α ، β إذا كان $\sin \alpha = \sin \beta$

فإن $\sin \alpha + \sin \beta = \dots\dots\dots$

- (أ) 180° (ب) 60° (ج) 90° (د) 180°

٤. إذا كان $\sin \alpha = 70^\circ$ حيث $\sin \alpha$ قياس زاوية حادة فإن $\sin \alpha = \dots\dots\dots$

(القليوبية ١٨)

- (أ) 60° (ب) 45° (ج) 10° (د) 20°

٥. في ΔABC إذا كان $\sin \alpha = 85^\circ$ ، $\sin \beta = \sin \gamma$

(الدقهلية ١٩، البجدة ١٧، المنوفية ١٦)

فإن $\sin \alpha + \sin \beta = \dots\dots\dots$

- (أ) 30° (ب) 45° (ج) 50° (د) 60°

(المنوفية ١٧)

٦. في ΔABC القائم الزاوية في β يكون $\sin \alpha + \sin \gamma = \dots\dots\dots$

- (أ) $2 \sin \alpha$ (ب) $2 \sin \gamma$ (ج) $2 \sin \beta$ (د) $2 \sin \alpha$

٧. في المثلث ABC القائم الزاوية في α

(الشرقية ١٨)

يكون جيب تمام الزاوية β : جيب الزاوية γ يساوي $\dots\dots\dots$


- (أ) $\frac{3}{5}$ (ب) $\frac{4}{5}$ (ج) $\frac{2}{3}$ (د) 1

(الدقهلية ١٦)

٨. في المثلث ABC و القائم الزاوية في α ، أي العلاقات التالية خطأ ؟

- (أ) $\sin \alpha \times \sin \alpha = 1$ (ب) $\sin \alpha = \sin \alpha$

- (ج) $\sin \alpha = \sin \alpha$ (د) $\sin \alpha = \sin \alpha$



(أسواق ١٦)

(ج) $\frac{7}{5}$ (د) $\frac{5}{3}$

١ في الشكل المقابل :

 Δ قائم الزاوية في ب ، \overline{AD} متوسط $AD = 5$ سم ، $BD = 4$ سم ، $AB = 6$ سم

فإن : ما ح =

(ب) $\frac{3}{5}$ (١) $\frac{5}{6}$

٢ إذا كانت النسبة بين قياسي زاويتين متكاملتين ٣ : ٥


فأوجد القياس الستيني لكل منهما . (الخيار ١٩ ، أسواق ١٥ ، الخيار ١٤) « ٦٧ ٢٠ ، ١١٢ ٢٠ »

٤ إذا كانت النسبة بين قياسي زاويتين متتامتين ٣ : ٤

فأوجد القياس الستيني للزاوية الكبرى في القياس . « ٤٣ ٢٥ ، ١٠١ ٢٥ »

٥ إذا كانت النسبة بين قياسات الزوايا الداخلة لمثلث ٣ : ٤ : ٧

فأوجد القياس الستيني لكل زاوية . (الخيار ١٣) « ٦٧ ٢٤ ٢٨ ، ٤٣ ٢٥ ١٠١ ، ٩٠ »



٦ في الشكل المقابل :

 Δ قائم الزاوية فيه : $\angle C = 90^\circ$ $AC = 15$ سم ، $BC = 20$ سمأثبت أن : $\angle A - \angle B = 90^\circ$ (الخيار ٢٠ ، الخيار ١٩ ، الخيار ١٨ ، الخيار ١٧)

٧ س ص ع مثلث قائم الزاوية في ع ، س ع = ٧ سم ، س ص = ٢٥ سم

أوجد قيمة كل من : ١) $\sin A \times \cos A$ ٢) $\sin A + \cos A$ (بوسعيد ١٨) « ١ ، ١٠ »٨ Δ قائم الزاوية في ب فيه : $BC = 4$ سم ، $AC = 5$ سماستنتج أن : $\sin A - \cos A = 2 \sin A - 1$ ٩ Δ قائم الزاوية في ب فإذا كان $AB : AC = 3 : 5$

فأوجد : النسب المثلثية الأساسية للزاوية أ


(أسواق ١٣)

س ص ع مثلث قائم الزاوية في ص فإذا كان : ص ع = ٢ س ص
فأوجد قيمة كل من : ط ا ع ، ط ا س ، م ا ع ، م ا س

" $\frac{1}{5}$ ، $\frac{2}{5}$ ، $\frac{1}{5}$ ، $\frac{1}{5}$ "

س ب ح مثلث قائم الزاوية في ب فإذا كان : ب ع = ٢ ب ح

فأوجد : النسب المثلثية الأساسية للزاوية ح (أسوان ١٩ ، الدقهلية ١٨ ، الإسكندرية ١٥)



في الشكل المقابل :

س ب ح مثلث قائم الزاوية في ب


س ب = ٦ سم ، ط ا ح = $\frac{3}{4}$

أوجد : ١ طول كل من : ب ح ، س ح

(المنوفية ١٦ ، الإسماعيلية ١٢) « ٨ سم ، ١٠ سم ، $\frac{7}{5}$ »

٢ م ا ب + م ا ح

في الشكل المقابل :




س ب ح ، س ب = ١٧ سم

س ح = ١٥ سم ، س ب = ١٠ سم

أوجد قيمة : ٣ ط ا ح + م ا ب

(الإسماعيلية ١٤) « $\frac{12}{5}$ »

في الشكل المقابل :



س ب ح ، س ب = ٩٠° ، س ب ح


فإذا كان : س ب = ٦ سم ، س ح = ٨ سم

أوجد : ١ ط ا (س ب ح)

(الغربية ١٦) « $\frac{3}{4}$ ، $\frac{7}{5}$ »

٢ م ا (س ب ح) + م ا (س ب ح)

في الشكل المقابل :




س ب ح حاد الزوايا

س ب ح = ٨ سم ، س ب ح

أوجد قيمة : ١ م ا ب + م ا ح

(الشرقية ١٧) « ٨ سم »




(الدقة 17) « ٧.٥ سم ، ٢/٤ »

١٦ في الشكل المقابل :

١. شبه منحرف قائم الزاوية في ٢
 $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$ ، $\angle C = 90^\circ$
 $DE = 10$ سم ، $BC = 6$ سم ، $AC = 10$ سم
 أوجد : ط (د ع ب) ، طول د ح

١٧ ١. شبه منحرف متساوي الساقين فيه : $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$ ، $DE = 4$ سم
 ط (أ ب) = ٥ ، ط (ب ح) = ١٢ سم أثبت أن : $3 = \frac{5}{\text{ط (أ ب)} + \text{ط (ب ح)}}$ (الوادي الجديد ١٧)

١٨ ١. شبه منحرف فيه : $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$ ، $\angle C = 90^\circ$
 $BC = 3$ سم ، $AC = 6$ سم ، $AB = 10$ سم
 أثبت أن : م (د ع ب) - ط (د ع ب) = $\frac{1}{2}$ (الجيزة ٢٠ ، مطروح ١٨ ، المنوفية ١٧)



« ٥ سم ٢ »

١٩ في الشكل المقابل :

١. مثلث قائم الزاوية في ب فيه :
 $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$ ، $DE = 4$ سم ، $BC = 9$ سم
 بحيث $DE \perp \overline{AB}$ ، $DE = 4$ ، $BC = 9$
 احسب : مساحة $\triangle ABC$

٢٠ ١. مثلث متساوي الساقين فيه : $AB = AC$ ، $\frac{4}{5} = \frac{9}{y}$
 أوجد : م (أ ب) بدون استخدام الحاسبة. (البحر الأحمر ١٣) « ٤/٥ »

٢١ في $\triangle ABC$ القائم الزاوية في ح أثبت أن : م (أ ب) + م (ب ح) < ١

٢٢ ١. مثلث قائم الزاوية في ب ، م (أ ب) = ٦ ،

(نقرا الشيف ١٣) « ١ »

أوجد قيمة : م (أ ب) + م (ب ح)

٢٣ ١. مثلث قائم الزاوية في ب ، $\angle A = 24^\circ$ ،

« ١/٢ »


أوجد قيمة : ١ - ط (أ ب)

إذا علم أن الأشكال التالية مكونة من مربعات متطابقة فأوجد المطلوب أسفل كل شكل :




٢

أوجد : ط س




١

أوجد : ط س




٤

إذا كانت : ٢ ، ب ، ح على استقامة واحدة
أوجد : ط س




٣

أوجد : م س



٦


أوجد : ط س + ط ص - ط ع



٥


أوجد : ط س + $\frac{1}{\text{ط ص}}$

تطبيقات حياتية



٢.٠ متر


رجل طوله ١,٨ متر يقف أمام عمود إنارة طوله ٣,٢ متر ، فإذا وُجد أن طول ظل الرجل الناتج عن إنارة العمود هو ٢,٤ متر فأوجد بُعد قدم الرجل عن قاعدة العمود.



٦.٤ كم

٢٦ يراد إنشاء محطة مترو في إحدى المحافظات بين محطتين بحيث تبعد عن إحداها مسافة ٣,٦ كم ، وتكون أقصر مسافة بينها وبين المكتبة المركزية بالمحافظة ٤,٨ كم فإذا علمت أن الطريقين بين المكتبة المركزية ومحطتي المترو ، ح متعامدان ، فأوجد بطريقتين مختلفتين المسافة بين محطة المترو المراد إنشاؤها ومحطة المترو ح

للمتفوقين




(دمياط ١٧)

٢٧ في الشكل المقابل :

١ (د) = ٩٠° ، و $AD \perp BC$ ، D منتصف BC

١٢ = ٥ سم ، ١٣ = ٥ سم

أوجد بالبرهان : PA



٢٨ من الشكل المقابل :

أوجد : PA (د ب ح)


٢٩ في الشكل المقابل :


١ ب ح د مستطيل فيه : $PA > PD$

١٢ = ٢ سم ، ١٣ = ٥ سم

١ (د ب ح) = ١ (د ح د)

أوجد : PA (د ح د)






« ١٥٠ سم »

في الشكل المقابل :
 $\triangle ABC$ مثلث ، $D \in BC$ بحيث $AD \perp BC$ ، $AB = 10$ سم
 فإذا كان : $AD = 8$ سم ، $DC = 6$ سم
 فأوجد : مساحة $\triangle ABC$

في أي مثلث $\triangle ABC$ قائمة الزاوية في B أثبت أن : $AB^2 + AC^2 = BC^2$



« ١٠ سم »


في الشكل المقابل :

$\triangle ABC$ مربع ، $D \in AC$ مربع

$AB = 12$ سم

$AD = 4$ سم

أوجد : BD (د ع هـ)



« ١٠ سم »


في الشكل المقابل :

$\triangle ABC$ مربع ، $D \in AC$ ، $E \in BC$ ، $DE \perp AC$

$AD = 2$ سم ، $DE = 3$ سم

$BE = 2$ سم

أوجد : BC



« ٢٠ سم »

في الشكل المقابل :

$\triangle ABC$ مربع فيه : $D \in AC$ ، $E \in BC$ ، $DE \perp AC$

بحيث $AD = 2$ سم ، $DE = 5$ سم

$BE = 1$ سم

أوجد قيمة : $BC + AC$


٢٠٧

ومن ΔABC يمكننا إيجاد النسب المثلثية الأساسية للزاويتين اللتين قياساهما 30° ، 60° كالتالي :

| | | |
|---|---|--|
| $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{BC}{AB} = 30^\circ$ | $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{BC}{AB} = 30^\circ$ | $\frac{1}{2} = \frac{BC}{AB} = 30^\circ$ |
| $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{BC}{AB} = 60^\circ$ | $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{BC}{AB} = 60^\circ$ | $\frac{1}{2} = \frac{BC}{AB} = 60^\circ$ |

النسب المثلثية الأساسية للزاوية التي قياسها 45°

في الشكل المقابل :



ΔABC متساوي الساقين حيث :


$$AB = BC = L \text{ وحدة طول ، } \angle C = 90^\circ$$

$$\therefore \angle A = \angle B = 45^\circ$$

وبتطبيق نظرية فيثاغورس لإيجاد طول AB نجد أن :

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 = L^2 + L^2 = 2L^2$$

$$AB = \sqrt{2L^2} = L\sqrt{2}$$



$$\text{أي أن : } AB : BC : AC = L\sqrt{2} : L : L = \sqrt{2} : 1 : 1$$

ومن ΔABC يمكننا إيجاد النسب المثلثية الأساسية للزاوية التي قياسها 45° كالتالي :


| | | |
|---|---|---|
| $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{BC}{AB} = 45^\circ$ | $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{BC}{AB} = 45^\circ$ | $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{BC}{AB} = 45^\circ$ |
|---|---|---|



النسب المثلثية الأساسية لبعض الزوايا

النسب المثلثية الأساسية للزاويتين اللتين قياساهما 30° ، 60°

في الشكل المقابل :



ΔABC مثلث قائم الزاوية في B فيه :

$$\angle A = 30^\circ , \angle C = 60^\circ$$


ولذلك يُسمى ΔABC «مثلث ثلاثيني ستيني»

وفيه يكون : طول الضلع المقابل للزاوية التي قياسها 30° يساوي نصف طول الوتر

$$\text{أي أن : } AB = \frac{1}{2} AC$$

وبفرض أن : طول $AB = L$ وحدة طول فإن : طول $AC = 2L$ وحدة طول

وبتطبيق نظرية فيثاغورس لإيجاد طول BC نجد أن :



$$BC^2 = AC^2 - AB^2 = (2L)^2 - L^2 = 3L^2$$

$$BC = \sqrt{3L^2} = L\sqrt{3}$$

$$\text{أي أن : } AB : BC : AC = L : L\sqrt{3} : 2L = 1 : \sqrt{3} : 2$$

* والجدول التالي يلخص لنا النسب المثلثية الأساسية للزوايا التي قياساتها 30° ، 60° ، 45° :

| قياس الزاوية | 30° | 60° | 45° |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| النسبة المثلثية | | | |
| ما | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ |
| منا | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ |
| طا | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | $\sqrt{3}$ | 1 |

مثال ١

أوجد قيمة : ما 30° منا 60° + ما 30° طا 45° - ما 45° منا 60°

الحل

$$\text{المقدار} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \times 10 - 1 \times 0 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} =$$

$$1 = 0 - 0 + 1 = \frac{1}{2} - 0 + \frac{2}{4} + \frac{1}{4} =$$

مثال ٢

اثبت أن : ما 60° + ما 45° + ما 30° = ما 30° طا 60° - ما 60° منا 60°

الحل

$$\text{الطرف الأيمن} = \frac{2}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\text{الطرف الأيسر} = \frac{2}{2} = \frac{1}{2} - 1 + \frac{2}{2} = \left(\frac{1}{2}\right) - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \frac{1}{2} + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

∴ الطرفان متساويان.

حاول بنفسك ١

- ١ أوجد قيمة : ما 60° + ما 45° - ما 30° طا 45° . ما 30° منا 60° .
 ٢ اثبت أن : ما 30° طا 45° = ما 60° منا 60° .

مثال ٢

أوجد قيمة س التي تحقق أن :

- ١ س ما 30° منا 45° = ما 30° طا 45° .
 ٢ ما س = طا 60° - طا 45° حيث س زاوية حادة.

الحل

١ ∴ س ما 30° منا 45° = ما 30° طا 45° . ∴ س $\times \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
 ∴ س = $\frac{2}{\sqrt{3}}$

٢ ∴ ما س = طا 60° - طا 45° . ∴ ما س = $1 \times 2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2 - \frac{\sqrt{3}}{2}$
 ∴ س = 30° .

حاول بنفسك ٢

أوجد قيمة س التي تحقق أن :

- ١ س منا 30° = طا 60° .
 ٢ طا س = طا 30° طا 45° - ما 30° طا 45° حيث س زاوية حادة.

استخدام حاسبة الجيب

أولاً إيجاد النسب المثلثية الأساسية لزاوية معلومة



* في حاسبة الجيب توجد ثلاثة مفاتيح : \sin ، \cos ، \tan

١ المفتاح \sin ويعني الجيب (ما)

٢ المفتاح \cos ويعني جيب التمام (منا)

٣ المفتاح \tan ويعني الظل (طا)

وباستخدام هذه المفاتيح يمكن إيجاد النسب المثلثية الأساسية لأي زاوية معلوم قياسها.

مثال ٥

أوجد θ في كل مما يأتي حيث θ قياس زاوية حادة :

١ ما $\theta = ٠,٨$ ٢ ما $\theta = ٠,٧١٥٢$ ٣ ما $\theta = ١,٥١٥٦$

الحل

١ نستخدم مفاتيح الحاسبة بالتتابع الآتي من اليسار :



$\therefore \theta = \sin^{-1}(0.8) \approx ٥٣,٧٤^\circ$

٢ نستخدم مفاتيح الحاسبة بالتتابع الآتي من اليسار :



$\therefore \theta = \sin^{-1}(0.7152) \approx ٤٤,٢٠^\circ$

٣ نستخدم مفاتيح الحاسبة بالتتابع الآتي من اليسار :



$\therefore \theta = \sin^{-1}(1.5156) \approx ٥٦,٣٤^\circ$


حاول بنفسك ٤

باستخدام حاسبة الجيب أوجد θ حيث θ قياس زاوية حادة :

١ ما $\theta = ٠,٣٩٤٥$ ٢ ما $\theta = ٠,٣٨٢٤$

مثال ٦

في الشكل المقابل :



أوجد : ١ θ (د. ح) ٢ مساحة المستطيل فيه : $٦ = ب$ سم ، $١٢ = ح$ سم

٢ مساحة المستطيل ٦×١٢ سم \therefore لأقرب رقم عشري واحد.

مثال ٤

باستخدام حاسبة الجيب أوجد قيمة كل مما يأتي مقرباً الناتج لأربعة أرقام عشرية :

١ ما $\theta = ٢٦^\circ$ ٢ ما $\theta = ٧٢,٢٥^\circ$ ٣ ما $\theta = ٥٠,٤٦٢٥^\circ$

الحل

١ استخدم مفاتيح الحاسبة بالتتابع الآتي من اليسار :



$\therefore \sin 26^\circ \approx ٠,٥٨٧٨$

٢ استخدم مفاتيح الحاسبة بالتتابع الآتي من اليسار :



$\therefore \sin 72,25^\circ \approx ٠,٩٩٩٣$

٣ استخدم مفاتيح الحاسبة بالتتابع الآتي من اليسار :



$\therefore \sin ٥٠,٤٦٢٥^\circ \approx ٠,٧٢٥٠$

حاول بنفسك ٣

باستخدام حاسبة الجيب أوجد قيمة كل مما يأتي مقرباً الناتج لثلاثة أرقام عشرية :

١ ما $\theta = ٣٥,١٢^\circ$ ٢ ما $\theta = ٥٨,٢٤^\circ$

ثانياً إيجاد قياس زاوية إذا علمت إحدى نسبها المثلثية

* إذا قيل إن : ما $\theta = ٠,٦٢١٨$ فإن θ هو قياس الزاوية التي جيبها $٠,٦٢١٨$ ، ولإيجاد قيمة هذه الزاوية فإننا نستخدم مفاتيح الحاسبة بالتتابع التالي من اليسار :



فنجد أن قياس الزاوية يساوي تقريباً $٣٨,٢٦^\circ$

الحل

∴ Δ ح د مستطيل ∴ $\angle \text{ح د} = 90^\circ$

$$\text{في } \Delta \text{ ح د} : \text{ح د} = \frac{\text{ح د}}{\frac{6}{13}} = \frac{6}{13}$$

وباستخدام حاسبة الجيب :

$$\therefore \angle \text{ح د} = 27^\circ 29' 11''$$

$$\therefore \text{ح د} = \frac{\text{ح د}}{\frac{6}{13}} = \frac{6}{13}$$

$$\therefore \text{ح د} = 27^\circ 29' 11''$$

$$\therefore \text{ح د} = 13 \times \text{ح د} = 27^\circ 29' 11''$$

$$\therefore \text{مساحة المستطيل ح د} = \text{ح د} \times \text{ح د} = 13 \times 6 = 78 \text{ سم}^2$$

(المطلوب ثانياً)

$$\approx 69,2 \text{ سم}^2$$

لاحظ أنه

يمكن أيضاً إيجاد طول ح د باستخدام نظرية فيثاغورس في Δ ح د


حاول بنفسك

في الشكل المقابل :

Δ ح د معين قطراه متقاطعان في م

فإذا كان : $\text{ح د} = 5 \text{ سم}$ ، $\text{ح د} = 4 \text{ سم}$

فأوجد : ١) $\angle \text{ح د}$ ٢) مساحة المربع ح د



$$\text{١) } 11, 33, 11 \text{ (المتساوية)}$$

$$\text{٢) } 11, 33, 11 \text{ (المتساوية)}$$

$$\text{٣) } 11, 33, 11$$

$$\text{٤) } 11$$

$$\text{٥) } 11 \cdot 11$$

$$\text{٦) } 33$$

$$\text{٧) } 11, 33, 11 \text{ (المتساوية)}$$

$$\text{٨) } 11, 33, 11$$

$$\text{٩) } 11$$

$$\text{١٠) } 11 \cdot 11$$

تمارين 2

على النسب المثلثية الأساسية لبعض الزوايا



اختبار
تفاعلي



أسئلة كتاب الوزارة

بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد كلاً مما يأتي :

٢ $\sin 30^\circ + \sin 60^\circ$

١ $\sin 45^\circ - \sin 45^\circ$

٤ $\sin 60^\circ + \sin 30^\circ + \sin 60^\circ$

٣ $\sin 45^\circ - \sin 60^\circ + \sin 30^\circ$

٦ $4 \sin 30^\circ \sin 60^\circ$

٥ $\sin^2 45^\circ + \sin^2 45^\circ$

(ش. سيناء ١٧)

٧ $\sin 60^\circ - 2 \sin 45^\circ \sin 45^\circ$

(أسبوط ١٧)

٨ $\sin 60^\circ - \sin 60^\circ \sin 30^\circ + \sin 30^\circ \sin 60^\circ$

٩ $2 \sin 30^\circ \sin 60^\circ + \sqrt{2} \sin 45^\circ$

١٠ $(\sin 30^\circ - \sin 60^\circ)(\sin 30^\circ + \sin 60^\circ)$

(الإسماعيلية ١٧)

١١ $\frac{\sin 30^\circ}{\sin 60^\circ} - \sin 30^\circ \sin 60^\circ$

(الغربية ١٧)

١٢ $\frac{\sin^2 60^\circ + \sin^2 30^\circ + \sin^2 45^\circ}{\sin 30^\circ \sin 60^\circ - \sin 60^\circ \sin 30^\circ}$

بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت كلاً مما يأتي :

(ش. سيناء ٢٠، الجيزة ١٩، سوهاج ١٨)

١ $\sin 60^\circ = 2 \sin 30^\circ \sin 30^\circ$

(ج. سيناء ٢٠، ش. سيناء ١٩، بورسعيد ١٨)

٢ $\sin 60^\circ = 2 \sin^2 30^\circ - 1$

(الشرقية ١٥)

٣ $2 \sin^2 30^\circ - 1 = 1 - 2 \sin^2 60^\circ$

(ج. سيناء ١٩، الفيوم ١٨، الإسكندرية ١٧)

٤ $\sin 60^\circ = \sin^2 30^\circ - \sin^2 60^\circ$

(الإسكندرية ٢٠، دمياط ١٩، مطروح ١٧)

٥ $\frac{2 \sin 30^\circ}{\sin^2 30^\circ - 1} = \sin 60^\circ$

(السويس ١٧، المنيا ١٤، كفر الشيخ ١١)

٦ $\sin^2 60^\circ = 5 \sin^2 30^\circ - \sin^2 45^\circ$

(الأقصر ١٧)

$$\boxed{7} \quad \text{ما } 30^\circ = 9 \text{ ما } 60^\circ - \text{طا } 45^\circ$$

$$\boxed{8} \quad \text{طا } 45^\circ = \frac{\text{ما } 30^\circ \text{ ما } 45^\circ + \text{ما } 45^\circ \text{ ما } 30^\circ}{\text{ما } 60^\circ \text{ ما } 45^\circ + \text{ما } 45^\circ \text{ ما } 60^\circ}$$

$$\boxed{9} \quad \text{ما } 30^\circ = \sqrt{\frac{1 - \text{ما } 60^\circ}{2}}$$

٣ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : ما س = $\frac{1}{4}$ حيث س زاوية حادة فإن : و (د س) = (القاهرة ١٢)

(أ) 90° (ب) 60° (ج) 45° (د) 30°

٢ إذا كانت : ما س = $\frac{1}{4}$ حيث س زاوية حادة فإن : و (د س) = (القاهرة ٢٠)

(أ) 90° (ب) 60° (ج) 45° (د) 30°

٣ إذا كانت : طا س = $\frac{1}{\sqrt{3}}$ حيث س زاوية حادة فإن : طا ٢ س = (البحر الأحمر ١٩، الغربية ١٨)

(أ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (ب) $2\sqrt{3}$ (ج) $\sqrt{3}$ (د) ٣

٤ إذا كانت : ما س = $\frac{\sqrt{3}}{4}$ حيث س قياس زاوية حادة فإن : ما ٢ س = (سوهاج ١١)

(البحر الأحمر ١٩، الغربية ١٨)

(أ) ١ (ب) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ج) $\frac{1}{4}$ (د) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

٥ إذا كان : ٢ ما س = طا 60° حيث س قياس زاوية حادة

فإن : و (د س) = (سوهاج ١١)

(أ) 30° (ب) 45° (ج) 60° (د) 40°

٦ إذا كان : طا ٢ س = $\sqrt{3}$ حيث ٣ س زاوية حادة

فإن : و (د س) = (ش. سيناء ٢٠، الإسماعيلية ١٥)

(أ) 20° (ب) 30° (ج) 45° (د) 60°

٧ إذا كان : ما ٢ س = $\frac{\sqrt{3}}{4}$ فإن : س = (الجيزة ١١)

(أ) 20° (ب) 30° (ج) 45° (د) 60°

٨ إذا كان : $\frac{1}{4} = \frac{س}{4}$ حيث $\frac{س}{4}$ زاوية حادة فإن : $س$ (د س) =
 (أ) ٣٠ (ب) ٤٥ (ج) ٦٠ (د) ١٢٠

٩ إذا كان : $\frac{1}{4} = \frac{س}{4}$ حيث $\frac{س}{4}$ زاوية حادة

فإن : $س$ =
 (أ) ٣٠ (ب) ٤٠ (ج) ٥٠ (د) ٧٠

١٠ إذا كان : $طا$ (٢ س - ٥) = ١ حيث $س$ زاوية حادة

فإن : $س$ =
 (أ) ٤٥ (ب) ٣٥ (ج) ٢٥ (د) ١٥

١١ إذا كان : $\frac{1}{4} = \frac{س}{4}$ حيث $\frac{س}{4}$ قياس زاوية حادة

فإن : $طا$ (س + ٢٠) =
 (أ) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ (د) ١

١٢ إذا كانت : $س$ ، $ص$ زاويتين متتامتين بحيث $س : ص = ١ : ٢$

فإن : $ما س + ما ص$ =
 (أ) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ (د) ١

١٣ في Δ $أ ب ح$ إذا كان $ح$ (د ٩) : $ب$ (د ٤) : $أ$ (د ٣) = ٥ : ٤ : ٣

فإن : $ما ب$ =
 (أ) ٠ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) ١ (د) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

١٤ في المثلث القائم الزاوية المتساوي الساقين يكون ظل زاويته الحادة

مساوياً
 (أ) $3\sqrt{2}$ (ب) $\frac{1}{3\sqrt{2}}$ (ج) ١ (د) $\frac{2\sqrt{2}}{4}$

١٥ $أ ب ح$ مثلث قائم الزاوية في $أ$ فيه : $طا ب = ١$

فإن : $طا ح - ما ح - ما ح$ =
 (أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) $\frac{1}{4}$

١٦ إذا كانت النقطة (٤، ٦) تحقق المعادلة : $ص = س ما ٣٠ + ح$

فإن : $ح = \dots\dots\dots$

(المنوفية ١٦)

٢ (د)

٨ (ج)

٦ (ب)

٤ (أ)

٤ أوجد قيمة $س$ في كل مما يأتي :

١ $س ما ٤٥ = ط ما ٦٠$

(سوهاج ١٧)

٢ $س ما ٣٠ ما ٤٥ = ح ما ٦٠$

(أسبوط ٢٠، الإسكندرية ١٩، شبراخيت ١٦)

٣ $س ما ٤٥ ما ٤٥ ط ما ٦٠ = ط ما ٤٥ - ح ما ٦٠$

(المنوفية ١٦)

٤ $س = ٤ ما ٣٠ ط ما ٣٠ ط ما ٤٥$

(السويس ٢٠، الفيوم ١٩، الإسكندرية ١٧)

٥ أوجد قيمة $س$ في كل مما يأتي :

١ $ط ما ٤ = س ما ٣٠ ما ٦٠$ حيث $س$ زاوية حادة. (الجيزة ٢٠، الغربية ١٩، دمياط ١٨)

٢ $ما س = ما س ٦٠ ما ٣٠ - ح ما ٦٠ ما ٣٠$ حيث $٩٠ > س > ٠$ (القاهرة ١٧)

٣ $٢ ما س = ما س ٣٠ ما ٦٠ + ح ما ٣٠ ما ٦٠$ حيث $س$ زاوية حادة. (الجيزة ١٨)

٤ $٦ ما س ما ٤٥ ما ٤٥ = ١ - ح ما ٦٠$ حيث $٩٠ > س > ٠$ (المنوفية ٢٠، شبراخيت ١٦)

٥ $ما س = \frac{ما ٣٠ ما ٦٠}{ط ما ٤٥ ما ٤٥}$ حيث $س$ زاوية حادة. (الدقهلية ١٨)

٦ $ما (٦ + س) = ما ٣٠$ حيث $(٦ + س)$ زاوية حادة. (المنوفية ٢٠)

٧ $٣ ما س ط ما ٣٠ = ط ما ٤٥ ما ٢ س$ حيث $س$ زاوية حادة. (المنوفية ٢٠)

٦ أوجد $هـ$ في كل مما يأتي حيث $هـ$ قياس زاوية حادة :

١ $ما ٤٥ = هـ ما ٣٠$

٢ $ما هـ ما ٦٠ = ٣ ما ٤٥ ما ٤٥$

٣ $٢ ط هـ - ٤ ما ٣٠ = ٨ ما ٦٠$

(بنى سويف ١٩، المنوفية ١٧، دمياط ١٦)

(بنى سويف ١٨)

إذا كان : $\frac{1}{3\sqrt{2}}$ حيث θ زاوية حادة

أوجد : $\sin \theta = \frac{3}{2} + (\frac{3}{2})$ (2) θ

(المعادلة 13) 10

إذا كان : $\sin \theta = \frac{3}{2}$ ما θ حيث θ قياس زاوية حادة.

فأوجد قيمة : $\sin \theta$

(القيمة 20) 30


أكمل الجدولين الآتيين حيث الزوايا المستخدمة زوايا حادة :

| قياس الزاوية النسبة المثلثية | 30° | | |
|---------------------------------|-------|---------------|-------|
| ما | | | |
| حما | | $\frac{1}{2}$ | |
| طا | | | 1 |


بدون استخدام الآلة الحاسبة.


باستخدام الآلة الحاسبة.

أوجد طول الضلع المشار إليه بالعلامة (؟) في كل من الأشكال الآتية مقرباً الناتج لرقمين عشرين :



في كل من الأشكال الآتية أوجد قياس الزاوية المشار إليها بالعلامة (؟) بالدرجات والدقائق والثواني :





في الشكل المقابل :

$$\angle 1 = 30^\circ, \angle 2 = 90^\circ, \angle 3 = ?$$

$$a = 3 \text{ سم}, b = 4 \text{ سم}, c = ?$$

أوجد : ١ طاب

$$2 \angle 3 = ?$$

(الشرقية ١٨) $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}, \frac{9}{10}, \frac{11}{12}, \frac{13}{14}, \frac{15}{16}, \frac{17}{18}, \frac{19}{20}, \frac{21}{22}, \frac{23}{24}, \frac{25}{26}, \frac{27}{28}, \frac{29}{30}, \frac{31}{32}, \frac{33}{34}, \frac{35}{36}, \frac{37}{38}, \frac{39}{40}, \frac{41}{42}, \frac{43}{44}, \frac{45}{46}, \frac{47}{48}, \frac{49}{50}, \frac{51}{52}, \frac{53}{54}, \frac{55}{56}, \frac{57}{58}, \frac{59}{60}, \frac{61}{62}, \frac{63}{64}, \frac{65}{66}, \frac{67}{68}, \frac{69}{70}, \frac{71}{72}, \frac{73}{74}, \frac{75}{76}, \frac{77}{78}, \frac{79}{80}, \frac{81}{82}, \frac{83}{84}, \frac{85}{86}, \frac{87}{88}, \frac{89}{90}, \frac{91}{92}, \frac{93}{94}, \frac{95}{96}, \frac{97}{98}, \frac{99}{100}$

١٢ م ح مثلث متساوي الساقين فيه : $a = b = c = 7 \text{ سم}$ ، $c = 10 \text{ سم}$

أوجد : ١ $\angle 1$


$$2 \text{ مساحة } \triangle abc$$

(الشرقية ١٨) $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}, \frac{9}{10}, \frac{11}{12}, \frac{13}{14}, \frac{15}{16}, \frac{17}{18}, \frac{19}{20}, \frac{21}{22}, \frac{23}{24}, \frac{25}{26}, \frac{27}{28}, \frac{29}{30}, \frac{31}{32}, \frac{33}{34}, \frac{35}{36}, \frac{37}{38}, \frac{39}{40}, \frac{41}{42}, \frac{43}{44}, \frac{45}{46}, \frac{47}{48}, \frac{49}{50}, \frac{51}{52}, \frac{53}{54}, \frac{55}{56}, \frac{57}{58}, \frac{59}{60}, \frac{61}{62}, \frac{63}{64}, \frac{65}{66}, \frac{67}{68}, \frac{69}{70}, \frac{71}{72}, \frac{73}{74}, \frac{75}{76}, \frac{77}{78}, \frac{79}{80}, \frac{81}{82}, \frac{83}{84}, \frac{85}{86}, \frac{87}{88}, \frac{89}{90}, \frac{91}{92}, \frac{93}{94}, \frac{95}{96}, \frac{97}{98}, \frac{99}{100}$

١٤ م ح مثلث متساوي الساقين فيه : $a = b = c = 12,6 \text{ سم}$

$$\angle 1 = 84^\circ 24' \text{ أوجد لأقرب رقم عشري واحد طول } c$$

(الشرقية ٢٠) $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}, \frac{9}{10}, \frac{11}{12}, \frac{13}{14}, \frac{15}{16}, \frac{17}{18}, \frac{19}{20}, \frac{21}{22}, \frac{23}{24}, \frac{25}{26}, \frac{27}{28}, \frac{29}{30}, \frac{31}{32}, \frac{33}{34}, \frac{35}{36}, \frac{37}{38}, \frac{39}{40}, \frac{41}{42}, \frac{43}{44}, \frac{45}{46}, \frac{47}{48}, \frac{49}{50}, \frac{51}{52}, \frac{53}{54}, \frac{55}{56}, \frac{57}{58}, \frac{59}{60}, \frac{61}{62}, \frac{63}{64}, \frac{65}{66}, \frac{67}{68}, \frac{69}{70}, \frac{71}{72}, \frac{73}{74}, \frac{75}{76}, \frac{77}{78}, \frac{79}{80}, \frac{81}{82}, \frac{83}{84}, \frac{85}{86}, \frac{87}{88}, \frac{89}{90}, \frac{91}{92}, \frac{93}{94}, \frac{95}{96}, \frac{97}{98}, \frac{99}{100}$



في الشكل المقابل :

$\triangle abc$ ح قائم الزاوية في ب

$$\angle 1 = 30^\circ, \angle 2 = 90^\circ, \angle 3 = ?$$

أوجد قيمة المقدار : $\angle 1 + \angle 2$

(الشرقية ١٣) $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}, \frac{9}{10}, \frac{11}{12}, \frac{13}{14}, \frac{15}{16}, \frac{17}{18}, \frac{19}{20}, \frac{21}{22}, \frac{23}{24}, \frac{25}{26}, \frac{27}{28}, \frac{29}{30}, \frac{31}{32}, \frac{33}{34}, \frac{35}{36}, \frac{37}{38}, \frac{39}{40}, \frac{41}{42}, \frac{43}{44}, \frac{45}{46}, \frac{47}{48}, \frac{49}{50}, \frac{51}{52}, \frac{53}{54}, \frac{55}{56}, \frac{57}{58}, \frac{59}{60}, \frac{61}{62}, \frac{63}{64}, \frac{65}{66}, \frac{67}{68}, \frac{69}{70}, \frac{71}{72}, \frac{73}{74}, \frac{75}{76}, \frac{77}{78}, \frac{79}{80}, \frac{81}{82}, \frac{83}{84}, \frac{85}{86}, \frac{87}{88}, \frac{89}{90}, \frac{91}{92}, \frac{93}{94}, \frac{95}{96}, \frac{97}{98}, \frac{99}{100}$


في الشكل المقابل :

$\triangle abc$ ح مستطيل فيه :

$$a = 15 \text{ سم}, b = 25 \text{ سم}$$

أوجد : ١ $\angle 1$

$$2 \text{ مساحة المستطيل } abc$$




(الفيوم ٢٠، قنا ١٧، الإسكندرية ١٦) $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}, \frac{9}{10}, \frac{11}{12}, \frac{13}{14}, \frac{15}{16}, \frac{17}{18}, \frac{19}{20}, \frac{21}{22}, \frac{23}{24}, \frac{25}{26}, \frac{27}{28}, \frac{29}{30}, \frac{31}{32}, \frac{33}{34}, \frac{35}{36}, \frac{37}{38}, \frac{39}{40}, \frac{41}{42}, \frac{43}{44}, \frac{45}{46}, \frac{47}{48}, \frac{49}{50}, \frac{51}{52}, \frac{53}{54}, \frac{55}{56}, \frac{57}{58}, \frac{59}{60}, \frac{61}{62}, \frac{63}{64}, \frac{65}{66}, \frac{67}{68}, \frac{69}{70}, \frac{71}{72}, \frac{73}{74}, \frac{75}{76}, \frac{77}{78}, \frac{79}{80}, \frac{81}{82}, \frac{83}{84}, \frac{85}{86}, \frac{87}{88}, \frac{89}{90}, \frac{91}{92}, \frac{93}{94}, \frac{95}{96}, \frac{97}{98}, \frac{99}{100}$

ا ب ح د مستطیل طول قطره $\overline{ا ح} = ۲۴$ سم ، $و (د ا ح) = ۲۵^\circ$
 اوجد : طول $\overline{ب ح}$

« ۲۱، ۸ سم »

📖 في الشكل المقابل :




۱) متوازی اضلاع مساحتہ ۹۶ سم^۲
 ب: م = م: ح = ۱: ۲، $\overline{م} \perp \overline{ح}$ ، $\overline{م} = ۸$ سم
 زوجہ: ۱) طول $\overline{م}$ ۲) $\overline{م} \perp \overline{ح}$ (د)

٣ طول \overline{AB} لأقرب رقم عشري واحد. (استخدم أكثر من طريقة)

« ۱۲ سم ، ۶۹ ۶۶ ۶۸ ، ۸،۵ سم »

في الشكل المقابل :



۱ بحر شبه منحرف متساوی الساقین فیہ :

أب = ٩ = ٥ ح = ٥ سم ، ب ح = ١١ سم

أوجد: ١) \sin (د)، \cos (د)، \tan (د) ٢) مساحة شبه المنحرف $ABCD$ (مطهر ١٣٥)

« ۵۳° ۷' ۴۸" ، ۱۲۶° ۵۲' ۱۲" ، ۳۲ سم »

اسمى شبه منحرف فيه : $\overline{SP} // \overline{CH}$ ، $\angle P = 90^\circ$

فإذا كان : $a = 12$ سم ، $b = 16$ سم ، $c = 20$ سم

أوجد: ١ طول \overline{AC}

« $\frac{\lambda}{20}$ ، ۵۲۷۴۸ ، سم ۱۵ »

۲ ما (دء حب) - طا (دء حب)

تطبيقات حياتية

📖 سلم أ - طوله ٦ أمتار يستند طرفه العلوى ١ على حائط رأسى وطرفه ب على أرض أفقية ، فإذا كانت ح هى مسقط ٢ على سطح الأرض ، وكان قياس زاوية ميل السلم على سطح الأرض ٦٠° فأوجد طول ٢ ح

(نقمة الشبهة ١٧) « ٣/٣ متر »

يسير شخص في طريق منحدر يميل على سطح الأرض الأفقى بزاوية قياسها 22° فإذا سار مسافة ٥٠٠ متر فما مقدار ارتفاعه عن سطح الأرض لأقرب متر ؟ «١٨٧ متراً»

بسبب الرياح كُسر الجزء العلوى لشجرة فصنع مع الأرض زاوية قياسها 60° ، إذا كانت نقطة تلاقى قمة الشجرة بالأرض تبعد عن قاعدة الشجرة مسافة ٤ أمتار ، أوجد طول الشجرة لأقرب متر.

للمتفوقين



أوجد قيمة θ حيث θ زاوية حادة إذا كان :

$$\sin \theta \times \tan \theta = \frac{1}{4}$$


في الشكل المقابل :

إذا كان : $\angle C = 135^\circ$

$$a = 2\sqrt{6} \text{ سم}$$

$$b = 2 \text{ سم}$$


أوجد : $\angle A$



$$\frac{3}{4}$$

النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة

❖ إذا كان ΔABC قائم الزاوية في B فإن :



$$\sin A = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{BC}{AC}$$

$$\cos A = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{AB}{AC}$$

$$\tan A = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{BC}{AB}$$

$$\sin C = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{AB}{AC}$$

$$\cos C = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{BC}{AC}$$

$$\tan C = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{AB}{BC}$$

$$\sin A = \cos C$$

❖ إذا كانت : $\angle A$ ، $\angle B$ زاويتين متتامتين فإن :

$$\sin A = \cos B , \quad \cos A = \sin B$$

والعكس صحيح أي أنه :

إذا كانت : $\angle A$ ، $\angle B$ زاويتين حادتين

وكان : $\sin A = \cos B$ أو $\cos A = \sin B$ فإن : $\angle A + \angle B = 90^\circ$

النسب المثلثية لبعض الزوايا الخاصة

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

$$\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 45^\circ = 1$$



أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ لأي زاوية حادة α يكون $\tan \alpha = \dots\dots\dots$

- (أ) $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ (ب) $\sin \alpha \cos \alpha$ (ج) $\frac{\sin \alpha}{\sin \alpha}$ (د) $\sin \alpha + \cos \alpha$

٢ إذا كانت : $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ حيث α قياس زاوية حادة. فإن : $\alpha = \dots\dots\dots$

- (أ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (ب) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (ج) ١ (د) $\frac{2}{\sqrt{2}}$

٣ α β γ مثلث قائم الزاوية في β حيث : $\alpha = 30^\circ$ $\gamma = 60^\circ$ فإن : $\alpha = \dots\dots\dots$

- (أ) $\frac{2}{5}$ (ب) $\frac{5}{3}$ (ج) $\frac{3}{4}$ (د) $\frac{4}{3}$

٤ إذا كان : $\sin \alpha = (\cos + 10^\circ) = \frac{1}{2}$ فإن : $\alpha = (70^\circ - \alpha) = \dots\dots\dots$

- (أ) $\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (ج) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (د) ١

٥ إذا كان : $\sin \alpha = \cos \alpha$ مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية في α فإن : $\alpha = \dots\dots\dots$

- (أ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (ب) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (ج) ١ (د) $\frac{1}{2}$

٦ في الشكل المقابل :

إذا كان طول $\overline{AB} = 5$ وطول $\overline{AC} = 3$ هو م


فأى من المعادلات الآتية يمكن استخدامه لإيجاد $\angle C$ ؟


(أ) $\frac{m}{M} = L$

(ب) $\frac{m}{M} = L$

(ج) $m = M = L$

(د) $m = M = L$





(أ) في الشكل المقابل :

أ ب ح مثلث فيه : $\angle 1 = 90^\circ$

، $12 \text{ سم} = \text{ب}$ ، $5 \text{ سم} = \text{ا}$

أثبت أن : $\text{م} \text{ا} \text{ح} = \text{م} \text{ب} \text{ا} - \text{م} \text{ا} \text{ح} = \text{صفر}$

(ب) أوجد قيمة ح :

١ $\text{ح} = 30^\circ = 30^\circ \text{ م} \text{ا} \text{ح} + 30^\circ \text{ م} \text{ب} \text{ا} + 60^\circ \text{ م} \text{ا} \text{ح}$


٢ $2 \text{ م} \text{ا} \text{ح} = 60^\circ - 2 \text{ م} \text{ا} \text{ح} = 40^\circ$ حيث ح زاوية حادة.

(أ) أ ب ح د شبه منحرف متساوي الساقين فيه :

$\overline{\text{ا}} \parallel \overline{\text{ب}}$ ، $4 \text{ سم} = \text{ا}$ ، $5 \text{ سم} = \text{ب}$ ، $12 \text{ سم} = \text{ح}$

أوجد قيمة : $\frac{\text{ط} \text{ا} \text{ب} \text{م} \text{ا} \text{ح}}{\text{م} \text{ا} \text{ا} + \text{م} \text{ا} \text{ح}}$

(ب) أوجد قيمة : $\frac{30^\circ \text{ م} \text{ا} \text{ب} + 40^\circ \text{ م} \text{ا} \text{ح} + 30^\circ \text{ م} \text{ا} \text{ح}}{40^\circ \text{ م} \text{ا} \text{ح} + 60^\circ \text{ م} \text{ا} \text{ح} + 40^\circ \text{ م} \text{ا} \text{ح}}$



(أ) في الشكل المقابل :

إذا كان أ ب ح د مستطيل فيه :

أ ب = 5 سم ، ب ح = 12 سم

أوجد : ١ طول أ ح

٢ قيمة ه ط ا (د ح) - 13 م ا (د ا ح)

(ب) بسبب الرياح كسر الجزء العلوي لشجرة فصنع مع الأرض زاوية قياسها 30° ، إذا كانت نقطة تلاقي قمة الشجرة بالأرض تبعد عن قاعدة الشجرة مسافة 3 أمتار ، أوجد طول الشجرة لأقرب متر.

٥ (١) إذا كان $\angle A = \angle B$: $\angle C = 100^\circ$: ما $\angle A$ ؟ أوجد : (د) (١)


(ب) في الشكل المقابل :

$\angle A = \angle B$ مثلث متساوي الأضلاع ، طول ضلعه ٥ سم

$\angle C = 100^\circ$ بحيث $\angle A = 100^\circ$ سم

رسم $\angle C \perp \angle A$

أوجد : ط (د) ح (هـ)



النموذج الثاني

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان : ط (س + ١٥) = ١ حيث س زاوية حادة فإن : س =

(١) ٦٠ (ب) ٤٥ (ج) ٣٠ (د) ١٥

٢ إذا كان : ما ٣٠ = ما هـ حيث هـ زاوية حادة فإن : و (د هـ) =

(١) ١٥ (ب) ٣٠ (ج) ٦٠ (د) ٩٠

٣ إذا كانت : س زاوية حادة ، ٢ ما س - ١ = ٠ فإن : و (د س) =

(١) ٦٠ (ب) ٩٠ (ج) ٤٥ (د) ٣٠


٤ إذا كان : ٢ ، س زاويتين متتامتين بحيث ٢ : ١ = ٢ : ١ فإن : ما ٢ + ما ١ =

(١) $\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $\frac{3}{2}$ (د) ١

٥ إذا كان : و (د) = ٧٠ ، ما ١ = ما ٢ في $\triangle ABC$ فإن : و (د ح) =

(١) ٥٠ (ب) ٤٥ (ج) ٧٠ (د) ٦٥

امتحانات الوحدة



في الشكل المقابل :

أ ب ح مثلث فيه : $\angle C = 90^\circ$

، $AB = 15$ سم ، $BC = 25$ سم

فإن : $AC = \dots\dots\dots$

(د) $\frac{3}{4}$

(ج) $\frac{4}{3}$

(ب) $\frac{5}{4}$


(أ) $\frac{2}{5}$

(أ) أوجد قيمة \sin بالدرجات إذا كان :

ط $\sin = 4$ ما 30° ما 30° حيث $0^\circ < \sin < 90^\circ$

(ب) إذا كانت النسبة بين قياسي زاويتين متتامتين هي 3 : 5

فأوجد قياس كل منهما بالدرجات والدقائق.



(أ) في الشكل المقابل :

أ ب ح مثلث فيه : $AB = AC = 10$ سم

، $BC = 12$ سم ، $AD \perp BC$

أوجد قيمة كل من :


٣ ما $(90^\circ - \angle C)$

٢ $\angle C$

١ ما $\angle A$

(ب) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن :

$$\sin 60^\circ - \sin 45^\circ = \sin 60^\circ + \sin 30^\circ$$



(أ) في الشكل المقابل :


أ ب ح مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية في ح

وطول كل من ساقيه 1 وحدة طول أوجد :

١ النسب بين أطوال أضلاع المثلث أ ب ح : ب ح : أ ب

٢ ط \sin ، ما $\angle A$

(ب) في الشكل المقابل :



$$\angle A = 90^\circ, \angle B = 90^\circ$$

$$AC = 4 \text{ سم}, BC = 5 \text{ سم}, AB = 13 \text{ سم}$$

احسب قيمة كل من :

$$1) \angle A + \angle B$$

$$2) \angle C + \angle D$$

5 (أ) $\angle A$ ح مثلث قائم الزاوية في ب

$$1) \text{ أثبت أن : } \angle A + \angle B = 180^\circ$$

$$2) \text{ إذا كان : } \angle A = 5^\circ, \angle B = 13^\circ$$

أوجد : $\angle C$

(ب) أوجد بدون استخدام الآلة الحاسبة :

$$45^\circ \text{ ح } 45^\circ + 3^\circ \text{ ح } 30^\circ - 60^\circ \text{ ح } 30^\circ$$

مشروع بحثي

على الوحدة الرابعة

أهداف المشروع

- إيجاد قياس زاوية بمعرفة إحدى نسبها المثلثية.
- استخدام نظرية فيثاغورث.
- الربط بين الرياضيات والرياضة.
- الربط بين الرياضيات والتاريخ.
- الربط بين الرياضيات والعلوم.

المطلوب

« تُعد لعبة كرة القدم من الألعاب الجماعية ذات الشعبية المرتفعة حول العالم ، واللعبة الأكثر ممارسة في غالبية الدول »
في ضوء ذلك قُم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي :

- تكلم عن تاريخ نشأة لعبة كرة القدم، وكيف تطورت عبر العصور.
 - اذكر أبعاد ملعب كرة القدم ، وأبعاد المرمى ، وأبعاد منطقة الجزاء.
 - كم تبعد نقطة الجزاء عن خط المرمى ؟
 - إذا قام أحد اللاعبين بتسديد الكرة من نقطة الجزاء باتجاه المرمى فأصابت الكرة العارضة العلوية في منتصفها تمامًا ، وبفرض أن الحركة تحركت في مسار خط مستقيم احسب ما يأتي :
- ١ المسافة التي قطعها الكرة لترتطم بالعارضة .
 - ٢ قياس الزاوية التي صنعها مسار الكرة مع الأرض .
 - ٣ الفترة التي ينتمي إليها قياس الزاوية التي يصنعها مسار الكرة مع الأرض في هذه الحالة لتسجل هدفًا .
 - ٤ السرعة المتوسطة التي تحركت بها الكرة إذا ارتطمت بالعارضة بعد ٠,٤ ثانية من لحظة ركلها بقدم اللاعب .

الهندسة التحليلية

أهداف الوحدة :

- بعد دراسة هذه الوحدة يجب أن يكون التلميذ قادرًا على أن :
 - يوجد البعد بين نقطتين فى المستوى الإحداثى المتعامد.
 - يوجد إحداثي منتصف قطعة مستقيمة.
 - يعرف ميل الخط المستقيم.
 - يوجد ميل الخط المستقيم بمعلومية قياس الزاوية الموجبة التى يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.
 - يعرف العلاقة بين ميل مستقيمين متوازيين.
 - يعرف العلاقة بين ميل مستقيمين متعامدين.
 - يوجد ميل المستقيم وطول الجزء المقطوع من محور الصادات بمعلومية معادلة المستقيم.
 - يوجد معادلة الخط المستقيم بمعلومية ميله وطول الجزء المقطوع من محور الصادات.
 - يستخدم ميل المستقيم فى حل بعض المشكلات الحياتية.



دروس الوحدة :

- ♦ الدرس 1 البعد بين نقطتين.
 - ♦ الدرس 2 إحداثي منتصف قطعة مستقيمة.
 - ♦ الدرس 3 ميل الخط المستقيم.
 - ♦ الدرس 4 معادلة الخط المستقيم بمعلومية ميله وطول الجزء المقطوع من محور الصادات.
- مشروع بحثي** على الوحدة الخامسة



يمكنك حل
الامتحانات
التفاعلية على
الدروس من خلال
مسح QR code
الخاص بكل امتحان

أرى أنت :

البعد بين النقطتين م ، ن يساوي $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

وتعلم أنت : $(x_1 - x_2)^2 = (x_2 - x_1)^2$

وبالمثل : $(y_1 - y_2)^2 = (y_2 - y_1)^2$

وعلى هذا فإن : البعد بين النقطتين م ، ن يساوي أيضًا $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

وصيغة عامة :

البعد بين أي نقطتين = $\sqrt{\text{مربع فرق السينات} + \text{مربع فرق الصادات}}$

مثال ١

إذا كانت : أ (٦ ، ٣) ، ب (٤ ، ١-) فأوجد : طول أ ب

الحل

$$AB = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{(6 - 4)^2 + (3 - 1)^2}$$

$$= \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

٢ وحدة طول.

حل آخر :

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(4 - 6)^2 + ((1-) - 3)^2}$$

$$= \sqrt{(-2)^2 + (-4)^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

٢ وحدة طول.

مثال ٢

إذا كان البعد بين النقطتين (٥ ، ٢) ، (١-٣ ، ١) يساوي ٥ وحدة طول فأوجد قيمة ؟

الحل

$$5 = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \therefore$$

$$25 = (x_1 - 1)^2 + (2 - 3)^2 \therefore$$

$$9 = (1 - x_2)^2 \therefore$$

$$20 = 16 + (1 - 3)^2 \therefore$$

وبتربيع الطرفين :



البعد بين نقطتين

* بفرض أن م (س_١ ، ص_١) ، ن (س_٢ ، ص_٢) نقطتان في نفس المستوى

فمن هندسة الشكل المقابل نجد أن :

$$MN = BN - BM = x_2 - x_1$$

$$\text{وبصفة عامة : } MN = |x_2 - x_1|$$

$$\text{وبالمثل : } MN = y_2 - y_1$$

$$\text{وبصفة عامة : } MN = |y_2 - y_1|$$

∴ ∆ م ن ل قائم الزاوية في ل

$$\therefore (MN)^2 = (ML)^2 + (LN)^2$$

$$\therefore (MN)^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

$$\therefore MN = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

وبأخذ الجذر التربيعي للطرفين : $2 \pm = 1 - 2 \therefore$

$$2 = 1$$

$2 = 1 - 2 \therefore$ ومنها $2 = 2$ ، $4 = 2$

$$1 = 2$$

$1 = 1 - 2 \therefore$ ومنها $2 = 2$ ، $2 = 2$

حاول بنفسك ١

إذا كانت $A(0, 2)$ ، $B(1, 1)$ ، فأوجد طول \overline{AB}

مثال ٢

إذا كان A ح محيط Δ حيث $A(0, 0)$ ، $B(4, 3)$ ، $C(-4, 3)$

أوجد محيط ΔABC

الحل

\therefore محيط $\Delta ABC = AB + BC + CA$

$$AB = \sqrt{(0-4)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{16+9} = 5$$

$$BC = \sqrt{(4-(-4))^2 + (3-3)^2} = \sqrt{64+0} = 8$$

$$CA = \sqrt{(0-(-4))^2 + (0-3)^2} = \sqrt{16+9} = 5$$

$$\therefore \text{محيط } \Delta ABC = 5 + 8 + 5 = 18$$


بناءً على الملاحظة الجانبية السابقة

$$AB = \sqrt{0^2 + 0^2} = 0$$

$$\therefore \text{محيط } \Delta ABC = 0 + 0 + 0 = 0$$

مثال ٣

أثبت أن ΔABC متساوي الأضلاع حيث : $A(0, 6)$ ، $B(0, 2)$ ، $C(3\sqrt{2}, 4)$ ثم أوجد مساحته.



$$AB = \sqrt{(0-0)^2 + (2-6)^2} = \sqrt{16} = 4$$

$$BC = \sqrt{(0-3\sqrt{2})^2 + (2-4)^2} = \sqrt{18+4} = \sqrt{22}$$

$$AC = \sqrt{(0-3\sqrt{2})^2 + (6-4)^2} = \sqrt{18+4} = \sqrt{22}$$

$$\therefore AB = BC = AC = \sqrt{22}$$

$\therefore \Delta ABC$ متساوي الأضلاع

بفرض أن M منتصف القاعدة \overline{AB}

$\therefore CM \perp AB$

\therefore باستخدام نظرية فيثاغورس نجد أن :
الارتفاع $CM = \sqrt{(\sqrt{22})^2 - (2)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

$$\therefore \text{مساحة } \Delta ABC = \frac{1}{2} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع} = \frac{1}{2} \times 4 \times 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

حاول بنفسك ٢

أثبت أن ΔABC متساوي الساقين حيث : $A(3, 3)$ ، $B(9, 0)$ ، $C(1, -1)$

ملاحظة ١

لإثبات أن ثلاث نقاط تقع على استقامة واحدة يمكن إيجاد البعد بين كل نقطتين من هذه النقاط ثم إثبات أن أكبر بعد يساوي مجموع البعدين الآخرين.

مثال ٥

أثبت أن النقط : $A(7, 2)$ ، $B(4, 3)$ ، $C(16, 1)$ تقع على استقامة واحدة.

الحل

$$AB = \sqrt{(7-4)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$$

∴ مساحة المثلث $ABC = \frac{1}{2} \times AC \times BC = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 10\sqrt{2} \times \frac{1}{2} = 10$ وحدة مربعة.

حاول بنفسك ٣

إذا كانت $A(1, -1)$ ، $B(2, 3)$ ، $C(6, 0)$ ،
أثبت أن $\triangle ABC$ قائم الزاوية في B ثم أوجد مساحته.

ملاحظة ٣

إذا كان ABC شكلًا رباعيًّا :

- ١ إثبات أن ABC متوازي أضلاع نثبت أن : $AB = DC$ ، $BC = AD$
- ٢ إثبات أن ABC معين نثبت أن : $AB = BC = CD = DA$
- ٣ إثبات أن ABC مستطيل نثبت أن : $AB = DC$ ، $BC = AD$ ، $\angle A = \angle C$ ، $\angle B = \angle D$
- ٤ إثبات أن ABC مربع نثبت أن : $AB = BC = CD = DA$ ، $\angle A = \angle C$ ، $\angle B = \angle D$

مثال ٧

إذا كان $A(2, 3)$ ، $B(0, -5)$ ، $C(7, 0)$ ، $D(8, -9)$ ،
أثبت أن ABC متوازي أضلاع.

الحل

$$\begin{aligned} \therefore AB &= \sqrt{(2-0)^2 + (3+5)^2} = \sqrt{4 + 64} = \sqrt{68} \text{ وحدة طول} \\ BC &= \sqrt{(0-7)^2 + (-5-0)^2} = \sqrt{49 + 25} = \sqrt{74} \text{ وحدة طول} \\ CD &= \sqrt{(8-7)^2 + (-9+0)^2} = \sqrt{1 + 81} = \sqrt{82} \text{ وحدة طول} \\ DA &= \sqrt{(8-2)^2 + (-9-3)^2} = \sqrt{36 + 144} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5} \text{ وحدة طول} \\ \therefore AB &= BC = CD = DA \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(2-0)^2 + (3+5)^2} = \sqrt{4 + 64} = \sqrt{68} \text{ وحدة طول} \\ BC &= \sqrt{(0-7)^2 + (-5-0)^2} = \sqrt{49 + 25} = \sqrt{74} \text{ وحدة طول} \\ CD &= \sqrt{(8-7)^2 + (-9+0)^2} = \sqrt{1 + 81} = \sqrt{82} \text{ وحدة طول} \\ DA &= \sqrt{(8-2)^2 + (-9-3)^2} = \sqrt{36 + 144} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5} \text{ وحدة طول} \end{aligned}$$

ملاحظة ١

لإثبات أن النقط A ، B ، C هي رؤوس مثلث يمكن إيجاد AB ، BC ، AC ثم إثبات أن مجموع طولي أصغر ضلعين أكبر من طول الضلع الثالث.
لتعيين نوع المثلث ABC حسب زواياه حيث AC أطول الأضلاع :

نقارن بين $(\angle A)^2$ ، $(\angle B)^2 + (\angle C)^2$ كما يلي :

- ١ إذا كان : $(\angle A)^2 < (\angle B)^2 + (\angle C)^2$ فإن المثلث منفرج الزاوية في B
- ٢ إذا كان : $(\angle A)^2 = (\angle B)^2 + (\angle C)^2$ فإن المثلث قائم الزاوية في B
- ٣ إذا كان : $(\angle A)^2 > (\angle B)^2 + (\angle C)^2$ فإن المثلث حاد الزوايا.

مثال ٦

أثبت أن المثلث الذي رؤوسه : $A(2, 3)$ ، $B(-4, 1)$ ، $C(1, -2)$ قائم الزاوية وأوجد مساحته.

الحل


$$\begin{aligned} \therefore AB &= \sqrt{(2+4)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{64 + 4} = \sqrt{68} \text{ وحدة طول} \\ BC &= \sqrt{(-4-1)^2 + (1+2)^2} = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34} \text{ وحدة طول} \\ AC &= \sqrt{(2-1)^2 + (3+2)^2} = \sqrt{1 + 25} = \sqrt{26} \text{ وحدة طول} \\ \therefore AB^2 &= 68 ، BC^2 = 34 ، AC^2 = 26 \\ \therefore AB^2 &= BC^2 + AC^2 \end{aligned}$$

∴ المثلث ABC قائم الزاوية في C

مثال ٨

أثبت أن النقط: $أ(٤، ١-)$ ، $ب(١، ١)$ ، $ح(٢-، ١-)$ ، $د(١، ٣-)$ هي رؤوس معين ومثله بياناً ثم أوجد مساحته.

الحل



$$٢(١-٤) + ٢(١-١-) = ٢٠$$

$$\sqrt{١٣} = \sqrt{٩+٤} = \text{وحدة طول}$$

$$\sqrt{٢(٢+١) + ٢(١+١)} = ٢٠$$

$$\sqrt{١٣} = \sqrt{٩+٤} = \text{وحدة طول}$$

$$\sqrt{٢(١-٢-) + ٢(٢+١-)} = ٢٠$$

$$\sqrt{١٣} = \sqrt{٩+٤} = \text{وحدة طول}$$

$$\sqrt{٢(٤-١) + ٢(١+٣-)} = ٢٠$$

$$\sqrt{١٣} = \sqrt{٩+٤} = \text{وحدة طول}$$

$$٢٠ = ٢٠ = ٢٠ = ٢٠$$

الشكل $أ$ $ب$ $ح$ $د$ معين

$$٢٠ = ٢٠ = ٢٠ = ٢٠ = \sqrt{٢(٢+٤) + ٢(١+١-)} = \sqrt{٣٦+٠} = ٦ = \text{وحدة طول}$$

$$٤ = \sqrt{١٦} = \sqrt{٠+١٦} = \sqrt{٢(١-١) + ٢(٢+١)} = \text{وحدة طول}$$


$$١٢ = ٤ \times ٦ \times \frac{١}{٢} = \text{مساحة المعين } أ ب ح د = \text{وحدة مربعة}$$

حاول بنفسك ٤

أثبت أن النقط: $أ(٣، ١-)$ ، $ب(١، ٥)$ ، $ح(٤، ٦)$ ، $د(٦، ٠)$ هي رؤوس مستطيل ثم احسب مساحته.

ملاحظة ٤

محور تماثل القطعة المستقيمة هو المستقيم العمودي عليها من منتصفها. أي نقطة على محور تماثل قطعة مستقيمة تكون على بعدين متساويين من طرفيها والعكس صحيح. أي أنه: إذا كانت هناك نقطة على بعدين متساويين من طرفي قطعة مستقيمة فإن هذه النقطة تقع على محور هذه القطعة المستقيمة.



فمثلاً:

في الشكل المقابل:

إذا كان: $أ = ح$

فإن: $ح \in$ محور تماثل $أ ب$

مثال ٩

إذا كان: $أ(١، ١)$ ، $ب(٣، ١)$

فأثبت أن: النقطة $ح(١، ١-)$ تقع على محور تماثل $أ ب$

الحل

$$٢٠ = ٢٠ = \sqrt{٢(١+١) + ٢(١-١-)} = \sqrt{٤+٤} = \sqrt{٨} = ٢\sqrt{٢} = \text{وحدة طول}$$

$$٢٠ = ٢٠ = \sqrt{٢(٣-١) + ٢(١-١-)} = \sqrt{٤+٤} = \sqrt{٨} = ٢\sqrt{٢} = \text{وحدة طول}$$

$$٢٠ = ٢٠ = \sqrt{٢(١+١) + ٢(١-١-)} = \sqrt{٤+٤} = \sqrt{٨} = ٢\sqrt{٢} = \text{وحدة طول}$$

$$٢٠ = ٢٠ = \sqrt{٢(٣-١) + ٢(١-١-)} = \sqrt{٤+٤} = \sqrt{٨} = ٢\sqrt{٢} = \text{وحدة طول}$$

ملاحظة ٥

• لإثبات أن ثلاث نقاط مثل $أ$ ، $ب$ ، $ح$ تقع على دائرة واحدة


وليكن مركزها $م$ نثبت أن: $أ م = ب م = ح م$

• إذا كانت $أ \in$ الدائرة $م$ فإن:

طول نصف قطر الدائرة (نق) $أ م = ٢$

• تذكر أن: * محيط الدائرة ٢π نق

* مساحة الدائرة π نق^٢



مثال ١٠

أثبت أن النقط : ١ (٢، ٦-) ، ٢ (٨، ٠) ، ٣ (٤، ٨-) تقع على الدائرة التي مركزها م (٦، ٤-) وأوجد مساحتها حيث $\pi \approx 3,14$

الحل

$$\therefore \text{م ١} = \sqrt{(6-2)^2 + (4-(-6))^2} = \sqrt{16+64} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5} \text{ وحدة طول}$$

$$\text{م ٢} = \sqrt{(6-8)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ وحدة طول}$$

$$\text{م ٣} = \sqrt{(6-4)^2 + (4-8)^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ وحدة طول}$$

$$\therefore \text{م ١} = \text{م ٢} = \text{م ٣}$$

\therefore النقط ١، ٢، ٣ تقع على الدائرة م التي طول نصف قطرها $\sqrt{5}$ وحدة طول

\therefore مساحة الدائرة م $= \pi \times (\sqrt{5})^2 \approx 3,14 \times 5 \approx 15,7$ وحدة مربعة.

حاول بنفسك ٥

أثبت أن النقط : ١ (٠، ٢-) ، ٢ (١، ٥) ، ٣ (٦، ٦-) تمر بها دائرة مركزها م (٢، ٣-) ثم أوجد محيط الدائرة بدلالة π

١. أوجد نصف قطر الدائرة التي تمر بالنقطتين (١، ٢) و (٣، ٤) .
 ٢. أوجد محيط الدائرة التي تمر بالنقطتين (١، ٢) و (٣، ٤) .
 ٣. أوجد مساحة الدائرة التي تمر بالنقطتين (١، ٢) و (٣، ٤) .
 ٤. أوجد نصف قطر الدائرة التي تمر بالنقطتين (١، ٢) و (٣، ٤) .
 ٥. أوجد محيط الدائرة التي تمر بالنقطتين (١، ٢) و (٣، ٤) .



أوجد طول \overline{AB} في كل من الحالات الآتية :

- | | |
|--|--|
| ١) \overline{AB} (٢، ١) ، \overline{AB} (٦، ٤) | ٢) \overline{AB} (١-، ٢) ، \overline{AB} (٥-، ٥) |
| ٣) \overline{AB} (٧، ٢-) ، \overline{AB} (٥-، ٣) | ٤) \overline{AB} (٥، ٢-) ، \overline{AB} (٠، ٣) |
| ٥) \overline{AB} (٠، ١٥) ، \overline{AB} (٠، ٦) | ٦) \overline{AB} (٠، ٦) ، \overline{AB} (٨-، ٠) |

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) البعد بين النقطتين (٣، ٤) ، (١-، ٢) هو وحدة طول. (الإسماعيلية ١٧)

- (أ) ١٦ (ب) ٩ (ج) ٥ (د) ٤

٢) البعد بين النقطة $(\sqrt{3}، ١)$ ونقطة الأصل هو وحدة طول. (سوهاج ١٨)

- (أ) ٤ (ب) ٣ (ج) ٢ (د) ١

٣) إذا كان البعد بين النقطتين (٢، ٠) ، (٠، ١) هو وحدة طول واحدة

فإن : $٢ = \dots\dots\dots$ (الغربية ٢٠)

- (أ) ١ (ب) ١- (ج) صفر (د) ٢

٤) طول نصف قطر الدائرة التي مركزها (٧، ٤) وتمر بالنقطة (٣، ١) يساوى

- (أ) ٥ (ب) ٥- (ج) ٢,٥ (د) ٢٥

٥) إذا كان : \overline{AB} حى مربع وكان : \overline{AB} (٣، ٥) ، \overline{AB} (٤، ٢)

فإن مساحة المربع \overline{AB} حى = وحدة مساحة.

- (أ) $\sqrt{10}$ (ب) ١٠ (ج) $4\sqrt{10}$ (د) ٤٠

٦) إذا كان : \overline{AB} حى معين وكان : \overline{AB} (١-، ٧) ، \overline{AB} (٣-، ١)

فإن محيط المعين \overline{AB} حى = وحدة طول.

- (أ) ٤٠ (ب) $4\sqrt{52}$ (ج) $8\sqrt{10}$ (د) $2\sqrt{10}$

٧ في مستوى إحداثي متعامد النقطة التي تبعد عن نقطة الأصل مسافة ٢ وحدة طول (القاهرة ٠٩) يمكن أن تكون

- (أ) (٢، ١) (ب) (٢، ١) (ج) (٢، ٠) (د) (٠، ٣-)

٨ بعد النقطة (٢-، ٥-) عن محور الصادات يساوي وحدة طول. (الغربية ١٦)

- (أ) ٥- (ب) ٢- (ج) ٢ (د) ٥

٩ البعد بين النقطة (٥، ٦٠°) ومحور السينات هو وحدة طول. (السويس ١٧)

- (أ) ٥ (ب) $5\sqrt{2}$ (ج) ٣ (د) $3\sqrt{2}$

١٠ بعد النقطة (ل، ٤-) عن محور الصادات يساوي حيث ل $\in \mathbb{R}$ (دمياط ١٨)

- (أ) ٤ (ب) ل (ج) ٤- (د) |ل|

١١ البعد بين المستقيمين : ص - ٣ = ، ص + ٢ = .

يساوي وحدة طول. (الفيوم ١٧، الإسكندرية ١٧)

- (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٥ (د) ٣

١٢ دائرة مركزها نقطة الأصل وطول نصف قطرها ٢ وحدة طول ، فأى من النقاط الآتية تنتمي للدائرة ؟

(البحيرة ١٧، بني سويف ١٦، الغربية ١٤)

- (أ) (٢، ١) (ب) (٢، ١-) (ج) (١، $3\sqrt{2}$) (د) (١، $2\sqrt{2}$)

٣ إذا كانت : ٢ (١، ٣) ، ١ (٢، ١) ، ٢ (٤، ٥) فثبت أن : ٢ = ٢

(الأقصر ١٦)

٤ أثبت أن النقط : ٢ (٣، ٤) ، ١ (١، ١) ، ٢ (٥، ٣-) تقع على استقامة واحدة.

(الفيوم ١٧، كفر الشيخ ١٥، أسوط ١٤)

٥ إذا كانت : ٢ (٢، ٢-) ، ٢ (٢، ٢-) ، ٢ (٢، ٢-)

٦ يبين أي مجموعات النقط التالية تقع على استقامة واحدة :

(القاهرة ٠٨)

١ أ (٤، ١) ، ب (٣، ٢) ، ج (٣، ١٦) ، د (١٦، ٣)

٢ أ (٧، ٠) ، ب (٣، ٦) ، ج (٢٢، ٩) ، د (٩، ٢٢)

٣ أ (١، ٤) ، ب (٣، ١٤) ، ج (٥، ٦) ، د (١٤، ٣)

٧ يبين نوع المثلث أ ب ج حيث أ (٢، ٤) ، ب (٣، ١) ، ج (٤، ٥)

(البجيرة ٢٠، دمياط ١٩، الجيزة ١٧، الوادي الجديد ١٦)

بالنسبة لأطوال أضلاعه.

٨ يبين نوع كل مثلث من المثلثات الآتية بالنسبة لزاوياه :

١ أ (٢، ١) ، ب (٤، ٢) ، ج (٧، ٥) ، د (٥، ٧)

٢ أ (٣، ٥) ، ب (١، ١) ، ج (٥، ٥) ، د (٥، ٥)

٣ أ (٤، ٤) ، ب (٣، ١) ، ج (٢، ٤) ، د (٤، ٢)

٤ أ (٠، ٠) ، ب (٦، ٠) ، ج (٠، ٨) ، د (٨، ٠)

٥ أ (١، ١) ، ب (٢، ١) ، ج (٣، ٢) ، د (٢، ٣)

٩ أثبت أن المثلث الذي رؤوسه النقط أ (٥، ٥) ، ب (١، ٧) ، ج (١٥، ١٥)

(قنا ١٦، المنوفية ١٤) « ١٢٠ وحدة مربعة »

قائم الزاوية في ب ثم أوجد مساحته.


١٠ إذا كانت النقط أ (٥، ٠) ، ب (٧، ٢) ، ج (٣، ٣) ثلاث نقط في مستوى

إحداثي متعامد فأثبت أن : Δ أ ب ج متساوي الأضلاع وأوجد مساحته. « ٤ ٣ وحدة مربعة »

١١ في الشكل المقابل :

إذا كان : أ ب ج ح و مستطيل

فأوجد : طول أ ح



« ١٥ وحدة طول »

١٢ في كل مما يأتي أثبت أن النقط ٢ ، ب ، ح ، د رؤوس متوازي أضلاع :

١ ٢ (١، ١-) ، ب (٥، ٠) ، ح (٦، ٥) ، د (٢، ٤) (السوييس ١١)

٢ ٢ (٤، ٢-) ، ب (٣-، ٥) ، ح (١، ٧) ، د (٨، ٠) (سوهاج ٠٨)

١٣ أثبت أن النقط : ٢ (١، ٠) ، ب (٥، ٤) ، ح (٨، ١) ، د (٤، ٣-) (سوهاج ٠٩) وحدة طول

هي رؤوس لمستطيل ثم احسب طول قطره.

١٤ أثبت أن النقط : ٢ (٣، ٣) ، ب (٣، ٠) ، ح (٠، ٠) ، د (٠، ٣) الواقعة

في مستوى إحداثي متعامد هي رؤوس مربع واحسب طول قطره ومساحته. (الأقصر ٠٩)

» ٢٢ ٣ وحدة طول ، ٩ وحدات مربعة.

١٥ ٢ ب ح د شكل رباعي فيه : ٢ (٣، ٥) ، ب (٢، ٦) ، ح (١، ١-) ، د (٤، ٠)

، أثبت أن الشكل ٢ ب ح د معين ثم أوجد مساحته. (قنا ١٩) » ٢٤ وحدة مربعة.

١٦ أثبت أن النقط : ٢ (٥، ٢-) ، ب (٣، ٣) ، ح (٢، ٤-) ، د (٢، ٤-) ليست على استقامة

واحدة ، وإذا كانت د (٤، ٩-) فأثبت أن الشكل ٢ ب ح د متوازي أضلاع. (بوسعيد ١٧)

١٧ ٢ ب ح د شكل رباعي فيه : ٢ (٤، ٢) ، ب (٠، ٣-) ، ح (٥، ٧-) ، د (٩، ٢-)

، أثبت أن الشكل ٢ ب ح د مربع. (المنوفية ٢٠، القاهرة ١٩، البحيرة ١٧)

١٨ أثبت أن النقط : ٢ (١-، ٣) ، ب (٦، ٤-) ، ح (٢، ٢-) تقع على دائرة

واحدة مركزها م (٢، ١-) ثم أوجد محيط الدائرة حيث $3.14 = \pi$

(أسوان ٢٠، الإسكندرية ١٩، القليوبية ١٨، ش. سيناء ١٦، القاهرة ١٥) » ٣١، ٤ وحدة طول

١٩ إذا كان بُعد النقطة (س، ٥) عن النقطة (٦، ١) يساوي $\sqrt{٢٥}$ وحدة طول

فأوجد قيمة : س

أوجد قيمة α في كل من الحالتين الآتيتين :

١ إذا كان البعد بين النقطتين $(7, \alpha)$ ، $(-2, 3)$ يساوي ٥
(الفصول ٢٠، المنيا ١٩، الإسكندرية ١٨، مطروح ١٧) «١، ٥-»

٢ إذا كان البعد بين النقطتين $(7, \alpha)$ ، $(3, -1)$ يساوي ١٣
«٢، ٣-»


إذا كانت : $\alpha(3, 3)$ ، $\beta(2, 2)$ ، $\gamma(1, 0)$ وكانت $\alpha = \beta = \gamma$
(البحيرة ١٩، البحيرة ١٧، البحيرة ١٥، بورسعيد ١٤) «١، ٥»

فأوجد قيمة : α

في الشكل المقابل :

إذا كان : $\alpha = \beta = \gamma$

فأوجد : طول α



«١٢ وحدة طول»


إذا كان محور تماثل α يمر بالنقطة $\alpha(6, \alpha)$ حيث $\alpha(1, 3)$ ، $\beta(-3, 7)$
(الدقهلية ١٦) «١٠»
أوجد قيمة : α

في الشكل المقابل :

إذا كانت $\alpha \in$ محور السينات

، وكان $\alpha = \beta = \gamma$

أوجد : طول α



«١٧ وحدة طول» (الدقهلية ١٨)


$\vec{AB} \parallel \vec{CD}$ ، $\vec{AC} \parallel \vec{BD}$ بحيث :

و $AB = 4$ وحدة طول ، و $BC = 6$ وحدة طول

، والمستقيم AC يمثل الدالة $d : d(s) = s$

بحيث $AB = AC$

أوجد : إحداثي النقطة C



تطبيق حياتي

٢٦ إذا كان منزل باسم يبعد عن الطريق الرئيسي

١ كم ويبعد عن طريق السكة الحديد ٩ كم ، منزل


إسلام يبعد عن الطريق الرئيسي ٣ كم ويبعد

عن طريق السكة الحديد ١٠ كم وتبعد المدرسة

عن الطريق الرئيسي ١٠ كم وتبعد عن طريق

السكة الحديد ٢ كم وتبعد محطة القطار عن

الطريق الرئيسي ٤ كم



١ أيهما أقرب إلى المدرسة : منزل باسم أم منزل إسلام ؟

٢ هل طريق (المدرسة - محطة القطار) عمودي على طريق (منزل باسم - محطة القطار) ؟
اذكر السبب.

للمتفوقين

إذا كانت النقط : $A(4, -2)$ ، $B(s, 2)$ ، $C(3, 0)$ ثلاث نقط في مستوى إحداثي متعامد فأوجد قيمة s التي تحقق أن $\triangle ABC$ قائم الزاوية في B ثم احسب مساحته.


«صفرًا، ٧، ١٢ وحدة مربعة أ، ١٢، ٥ وحدة مربعة»



الدرس

2

إحداثيا منتصف قطعة مستقيمة



إذا كانت : $A(1, 3)$ ، $B(3, 5)$

نظمين في مستوى إحداثي متعامد

كانت M منتصف AB حيث $M(x, y)$

من هندسة الشكل نجد أن :

$\triangle AMN \cong \triangle BMN$ ، $\triangle AMN \cong \triangle BMN$ متطابقان.

$\therefore AM = BN$

$\therefore x - 1 = 3 - x$

$\therefore 2x = 4$

$\therefore x = \frac{4}{2} = 2$

$AM = BN$

$x - 1 = 3 - x$

$2x = 4$

$x = \frac{4}{2} = 2$

$$\therefore M \left(\frac{1+3}{2}, \frac{3+5}{2} \right) = (2, 4)$$

نمثلة : إذا كانت : $A(1, 3)$ ، $B(3, 5)$ ، M منتصف AB

$$\text{فإن : } M = \left(\frac{1+3}{2}, \frac{3+5}{2} \right) = (2, 4)$$

مثال 1

إذا كانت: ح (١٠، ٤) هي نقطة منتصف \overline{AB} حيث $A(٤، ٢)$ فأوجد نقطة ب

الحل

بفرض أن ب (س، ص)، \therefore ح منتصف \overline{AB}

$$\therefore (١٠، ٤) = \left(\frac{(٢) + س}{٢}, \frac{٤ + ص}{٢} \right)$$

$$\therefore \frac{٤ + ص}{٢} = ١٠ \quad \therefore ٢٠ = ٤ + ص$$

$$\therefore ١٦ = ص \quad \therefore ٤ - \frac{٢ - ص}{٢} = ٤$$

$$\therefore ٨ = ٢ - ص \quad \therefore ٦ = ص$$

$$\therefore ب = (١٦، ٦)$$

لاحظ أنه

إذا كان: $A(٢، ٤) = (س، ص)$ ، $B(٤، ٢)$ فإن: $٢ = س$ ، $٤ = ص$

$$\therefore نق = ٢ = \sqrt{(١-٢)^2 + (٣-٤)^2} = \sqrt{١+١} = \sqrt{٢}$$

$$\therefore ٥ = \sqrt{٢٥} = \text{وحدة طول}$$

$$\therefore \text{محيط الدائرة} = ٢\pi \text{ نق} = ٢\pi \times ٥ = ١٠\pi \text{ وحدة طول}$$

$$\therefore \text{مساحة الدائرة} = \pi \text{ نق}^2 = \pi \times ٥^2 = ٢٥\pi \text{ وحدة مربعة}$$

طريقة أخرى لحساب طول نصف قطر الدائرة:

$$\therefore ب = \sqrt{(١-٢)^2 + (٣-٤)^2} = \sqrt{١+١} = \sqrt{٢} = ١.٤١ \text{ وحدة طول}$$

$$\therefore \text{نق} = \frac{١}{٢} = ٠.٥ \text{ وحدة طول}$$

ثم أكمل الحل بإيجاد محيط ومساحة الدائرة.

٢ حاول بنفسك

إذا كان: \overline{AB} قطرًا في الدائرة م حيث $A(٤، ١)$ ، $B(٦، ٣)$ فأوجد نقطة م

مثال ٢

أثبت أن الشكل \overline{AB} ح و متوازي أضلاع حيث:

$$A(٣، ٤) ، B(٢، ٠) ، C(٢، ٢) ، D(٢، ٢)$$

الحل

\therefore قطري الشكل الرباعي \overline{AB} ح و هما \overline{AC} ، \overline{BD}

$$\therefore \text{نقطة منتصف } \overline{AC} = \left(\frac{(٢) + ٣}{٢}, \frac{(٢) + ٤}{٢} \right) = (٢.٥، ٣)$$

$$= (٠، ١)$$

$$\therefore \text{نقطة منتصف } \overline{BD} = \left(\frac{(٢) + ٢}{٢}, \frac{(٢) + ٠}{٢} \right) = (٢، ١)$$

\therefore نقطة منتصف \overline{AC} هي نفسها نقطة منتصف \overline{BD}

$\therefore \overline{AB}$ ح و متوازي أضلاع.

١ حاول بنفسك

إذا كانت: ح منتصف \overline{AB} فأوجد قيمتي س، ص في كل مما يأتي:

$$1) A(٢، ٥) ، B(٢، ٣) ، ح (س، ص)$$

$$2) A(٤، ٢) ، B(١، ٦) ، ح (٢، ص)$$

ملاحظة

إذا كان: \overline{AB} قطرًا في دائرة مركزها م، فإن م هي نقطة منتصف \overline{AB}

مثال ٢

إذا كان: \overline{AB} قطرًا في الدائرة م حيث: $A(٤، ١)$ ، $B(٢، ٧)$ أوجد إحداثي نقطة م ومن ثم أوجد محيط الدائرة ومساحتها.

الحل

$\therefore \overline{AB}$ قطر في الدائرة م

\therefore م منتصف \overline{AB}

$$\therefore \text{نقطة م} = \left(\frac{(٧) + ١}{٢}, \frac{(٢) + ٤}{٢} \right) = (٤، ٣)$$

مثال ٤

أثبت أن النقط: $أ(١، ٥)$ ، $ب(٣، ١)$ ، $ج(٥، ٢)$ هي رؤوس مثلث قائم الزاوية في $ب$ ، ثم أوجد نقطة $د$ التي تجعل الشكل $أبج د$ مستطيلاً.

الحل

$$أب = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{17} \quad بج = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \quad جد = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

$$أب = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{17} \quad بج = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \quad جد = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

$$أب = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{17} \quad بج = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \quad جد = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

$$\therefore \angle أ ب ج = 90^\circ = 72^\circ + 32^\circ = 2(\angle ب) + 2(\angle ج) \therefore$$

$\therefore \Delta أبج د$ قائم الزاوية في $ب$

بفرض أن $د(ص، س)$ بحيث يكون الشكل $أبج د$ مستطيلاً

$\therefore أب = جد$ ، $بج = أد$ ينصف كل منهما الآخر

\therefore نقطة منتصف $أب =$ نقطة منتصف $ج د$

$$\therefore \text{نقطة منتصف } أب = \left(\frac{1+3}{2}, \frac{5+1}{2} \right) = (2, 0)$$

$$\text{نقطة منتصف } ج د = \left(\frac{5+ص}{2}, \frac{2+س}{2} \right)$$

$$\therefore \left(\frac{5+ص}{2}, \frac{2+س}{2} \right) = (2, 0) \therefore \frac{5+ص}{2} = 2 \quad \frac{2+س}{2} = 0$$

$$\therefore 5+ص = 4 \quad 2+س = 0$$

$$\therefore ص = -1 \quad س = -2$$

$$\therefore ص = -1 \quad س = -2$$

$$\therefore د(٧، ١) = د$$

مثال ٥

أثبت أن المثلث الذي رؤوسه النقط: $أ(٤، ١)$ ، $ب(١، ٣)$ ، $ج(١، ٥)$ متساوي الساقين وأوجد مساحته.

الحل

$$أب = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13} \quad ب ج = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2 \quad ج د = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

$$أب = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13} \quad ب ج = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2 \quad ج د = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

$$أب = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13} \quad ب ج = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2 \quad ج د = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

$\therefore \Delta أبج$ متساوي الساقين

$\therefore أب = ج د$

بفرض أن $د(ص، س)$ منتصف $أب$

$$\therefore د = \left(\frac{4+1}{2}, \frac{1+3}{2} \right) = \left(\frac{5}{2}, 2 \right)$$

\therefore منتصف $أب$

$$\therefore د = \left(\frac{5}{2}, 2 \right)$$

$$أد = \sqrt{\left(\frac{5}{2} - 4 \right)^2 + (2 - 1)^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + 1} = \sqrt{\frac{13}{4}} = \frac{\sqrt{13}}{2}$$

$$أد = \sqrt{\left(\frac{5}{2} - 4 \right)^2 + (2 - 1)^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + 1} = \sqrt{\frac{13}{4}} = \frac{\sqrt{13}}{2}$$

$$\therefore \text{مساحة } \Delta أبج = \frac{1}{2} \times أب \times ج د = \frac{1}{2} \times \sqrt{13} \times 2 = \sqrt{13}$$

$$= \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6 \text{ وحدة مربعة}$$

حاول بنفسك ٣

إذا كانت $أ$ منتصف $أب$ حيث $أ(٣، ٢)$ ، $ب(٤، ٧)$ وكانت $د$ منتصف $ج د$ حيث $د(٥، ٣)$ فأوجد نقطة $ج$

$$أ(٣، ٢)$$

$$ب(٤، ٧)$$

$$① \quad \vec{AB} = (1, 5)$$

$$② \quad \vec{AB} = (-1, -5)$$

مراجعة سريعة

أوجد إحداثي نقطة منتصف \overline{AB} في كل من الحالات الآتية :

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| ١ | ٢ (٥ ، ٣) ، | ٣ (١ ، ٧) ، |
| ٢ | ٣ (٤ ، ٥) ، | ٤ (٤ - ، ٥) ، |
| ٣ | ٤ (٤ ، ٥ -) ، | ٥ (٤ ، ٢) ، |
| ٤ | ٥ (٤ ، ٥ -) ، | ٦ (٠ ، ٦) ، |
| ٥ | ٦ (٤ ، ٢) ، | ٧ (٠ ، ٦) ، |
| ٦ | ٧ (٤ ، ٢) ، | ٨ (٠ ، ٦) ، |

٢ إذا كانت النقطة (س ، ٠) منتصف \overline{AB} حيث ٢ (١ ، ٥ -) ، ٣ (٥ ، ٢) فأوجد قيمة : س

٣ إذا كانت النقطة (٥ ، ٣) منتصف \overline{AB} حيث ٢ (١٥ ، ص) ، ٣ (٥ - ، ٢ -) فأوجد قيمة : ص

٤ إذا كانت : ح (٦ ، ٤ -) هي منتصف \overline{AB} حيث ٢ (٥ ، ٣ -) فأوجد : إحداثي نقطة ب (القاهرة ١٩ ، بني سويف ١٩ ، الدقهلية ١٨ ، أسوان ١٧ ، ص ٧ -)

٥ إذا كانت ح منتصف \overline{AB} فأوجد س ، ص في كل من الحالات الآتية :

- | | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|
| ١ | ٢ (٥ ، ١) ، | ٣ (٧ ، ٣) ، | ٤ (س ، ص) ، |
| ٢ | ٣ (٣ - ، ص) ، | ٤ (١١ ، ٩) ، | ٥ (٣ - ، س) ، |
| ٣ | ٤ (٦ - ، س) ، | ٥ (١١ - ، ٩) ، | ٦ (٣ - ، ص) ، |
| ٤ | ٥ (٣ ، س) ، | ٦ (٦ ، ص) ، | ٧ (٦ ، ٤) ، |

٦ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : (٤ ، ٣ -) منتصف \overline{AB} حيث س (٥ ، ٢ -) فإن : ص هي

- (أ) (٤ ، ٥) ، (٤ ، ٥) (ب) (٣ ، ٤) (ج) (٤ ، ٣) (د) (٤ - ، ٣)

٣ إذا كانت \overline{AB} بحيث $P = B$ وكانت $P(0, 5)$ ، $A(-4, 1)$

فإن B هي

٤ إذا كانت P ، B ، C ، D أربع نقط تقع على استقامة واحدة وكان

$$AP = BP = CP = DP \quad P(1, 3) \quad ، \quad A(5, 1)$$

فإن النقطة B هي (.....) ، النقطة D هي (.....)

٥ P متوسط في $\triangle ABC$ ، M منتصف AP حيث $P(0, 8)$ ، $B(3, 2)$

، $C(-3, 6)$ فإن النقطة D هي (.....)

، النقطة M هي (.....)

٨ إذا كانت $P(1, 6)$ ، $B(9, 2)$ فأوجد إحداثيات النقط التي تقسم \overline{AB}

إلى أربعة أجزاء متساوية في الطول. (سوهاج ١٨) «(٥، ٢) ، (٣، ٤) ، (٧، ٠)»

٩ إذا كانت نقطة الأصل منتصف \overline{AB} حيث $P(س - ٢، ص)$ ، $B(-٢، ٢)$

فأوجد: (س ، ص) «(٤، ٢)»

١٠ أوجد قيمة كل من P ، B التي تحقق أن: $(٢٢ - ٢، ٣ - ٢)$ منتصف القطعة المستقيمة

التي طرفاها $(٧، ٣)$ ، $(١، ٧)$ (الفيوم ١٢) «(٤، ١)»

١١ \overline{AB} قطر في دائرة مركزها M فإذا كانت $B(٨، ١١)$ ، $M(٥، ٧)$ فأوجد:


١ إحداثي A

٢ محيط الدائرة حيث $\pi = ٣.١٤$

(أقر الشيخ ١٨، ش. سيناء ١٧، القليوبية ١٦) «(٢، ٣) ، (٤، ٣١) وحدة طول»

١٢ \overline{AB} مثلث حيث $P(١، ٣)$ ، $B(٥، ١)$ ، $C(٣، ٧)$ فإذا كانت D منتصف

\overline{AB} ، E منتصف \overline{AC} برهن باستخدام الإحداثيات أن: $D = \frac{1}{2} \overline{BC}$




(القليوبية ٢٠، الإسكندرية ١٧) « ٢٤ وحدة طول »

في الشكل المقابل :

ح (٤، ٣) منتصف \overline{AB}

أوجد : محيط المثلث و \overline{AC}



« ٢٥ وحدة طول ، ٥٧ وحدة طول »

في الشكل المقابل :

د منتصف \overline{AB} ، ه منتصف \overline{AC}

إذا كانت : \overline{AD} (٤، ٢)

فأوجد : طول \overline{BC} ومنها استنتج طول \overline{DE}

١٥ \overline{AD} متوسط في $\triangle ABC$ ، م منتصف \overline{AC} حيث م (٦، ٠) ، ب (٢، ٣) ، ح (٦، ٢-)
أوجد : إحداثي نقطة د (أنظر الشيف ١٧) « (٨، ٠) »

١٦ إذا كانت : \overline{AD} (١-، ١-) ، ب (٣، ٢) ، ح (٠، ٦) ، د (٤-، ٣) أربع نقط
في مستوى إحداثي متعامد أثبت أن : \overline{AD} ، ب ينصف كل منهما الآخر. (السويس ١٩)

١٧ أثبت أن النقط : \overline{AD} (٢-، ٣) ، ب (٠، ٥-) ، ح (٧-، ٠) ، د (٩-، ٨)
هي رؤوس متوازي أضلاع. (الفيوم ١٩٣)

١٨ إذا كانت النقط : \overline{AD} (٢، ٣) ، ب (٣-، ٤) ، ح (٢-، ١-) ، د (٣، ٢-)
هي رؤوس معين فأوجد :

١ إحداثي نقطة تقاطع القطرين.

٢ مساحة المعين \overline{ABCD} (الإسكندرية ٢٠، بوسعيد ١٨، الفيوم ١٧) « (٠، ١) ، ٢٤ وحدة مربعة »

١٩ \overline{ABCD} متوازي أضلاع فيه : \overline{AD} (٢، ٣) ، ب (٥-، ٤) ، ح (٣-، ٠)

أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطريه ، ثم أوجد إحداثي نقطة د (الدقهلية ٢٠، الإسكندرية ١٩، البحيرة ١٨، أسيوط ١٧) « (١-، ١-) ، (١-، ١-) ، (٤، ١-) »

٢٠

أثبت أن النقط : $أ(٠، ٦)$ ، $ب(٢، -٤)$ ، $ح(-٤، ٢)$ هي رؤوس مثلث قائم الزاوية في $ب$ ، ثم أوجد إحداثي نقطة $د$ التي تجعل الشكل $أبحد$ مستطيلاً.
(البجدة ١٩ ، كثر الشيخ ١٤ ، أسبوط ١١) «(٠، ٦)»

٢١

أثبت أن النقط : $أ(٣، ٥)$ ، $ب(٢، -٣)$ ، $ح(-٢، -٤)$ هي رؤوس مثلث منفرج الزاوية في $ب$ ، ثم أوجد إحداثي نقطة $د$ التي تجعل الشكل $أبحد$ معيناً وأوجد مساحة سطحه.
«(٠، ١) ، ٢١ وحدة مربعة»

٢٢

أثبت أن النقط : $أ(٠، ٣)$ ، $ب(٤، ٣)$ ، $ح(٦، ١)$ هي رؤوس مثلث متساوي الساقين رأسه $أ$ ، ثم أوجد طول القطعة المستقيمة المرسومة من $أ$ عمودية على $بحد$
(قنا ١٩ ، مطرو ١٨ ، المنوفية ١٦ ، القليوبية ١٢) « $\sqrt{٣٦}$ وحدة طول»

٢٣

$أبحد$ مثلث حيث $أ(١، ١)$ ، $ب(١، ٣)$ ، $ح(٣، ١)$
أثبت أن : $\Delta أبحد$ متساوي الساقين وأوجد مساحة سطحه. (الشرقية ١٨) «٢ وحدة مربعة»

٢٤

$أبحد$ متوازي أضلاع فيه : $أ(٤، ٣)$ ، $ب(٢، -١)$ ، $ح(-٤، -٣)$
أوجد إحداثي $د$ ، خذ $د \in أب$ حيث $أد = ٢$ ما إحداثي النقطة $د$ ؟
«(٠، -٩) ، (٢، -٣)»

٢٥

$أبحد$ شكل رباعي فيه : $س(٣، ٢)$ ، $ص(٣، م)$ ، $ع(١، -١)$ ، $ل(-٤، ن)$ منتصفات $أب$ ، $أد$ ، $بحد$ ، $دحد$ على الترتيب.
أوجد قيمة : $م + ن$

«٤»

للمتفوقين 

٢٦

$أبحد$ شبه منحرف فيه : $بحد = ٢$ فإذا كان : $أ(٦، ٤)$ ، $ب(٤، -٢)$ ، $ح(-٢، -٤)$ فأوجد إحداثي نقطة $د$ حيث $بحد // أد$
(إرشاد : أكمل متوازي الأضلاع $أبحد$ واستخدمه في إيجاد $د$)
«(٣، ٣)»

٢٥٦



الدرس

3

ميل الخط المستقيم

درست سابقاً ميل الخط المستقيم بمعلومية نقطتين عليه.

فإذا كانت A ، B نقطتين في المستوى الإحداثي المتعامد بحيث $A(x_1, y_1)$ ، $B(x_2, y_2)$

فإن : $\text{ميل الخط المستقيم } AB = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

وفي هذا الدرس سنتعلم كيفية إيجاد ميل المستقيم بمعلومية قياس الزاوية الموجبة التي يصنعها هذا المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.

ونشهد لدراسة هذا الموضوع بدراسة القياس الموجب والقياس السالب للزاوية.

القياس الموجب والقياس السالب للزاوية

في الشكل المقابل :


إذا كان : α يقطع محور السينات في نقطة H

فإن : α يصنع زاويتين مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.

إحداهما **موجبة** (أي لها قياس موجب)

مأخوذة من الاتجاه الموجب لمحور السينات

إلى المستقيم في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة وهي $\alpha - \pi$



• والأخرى سالبة (أى لها قياس سالب)
مأخوذة من الاتجاه الموجب لمحور السينات إلى المستقيم
في نفس اتجاه حركة عقارب الساعة وهي **د ح ب**


ميل الخط المستقيم

تعريف

ميل الخط المستقيم هو ظل الزاوية الموجبة التى يصنعها هذا المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.

أى أن: ميل الخط المستقيم = ط هـ

حيث هـ قياس الزاوية الموجبة التى يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.



فمثلاً: في الشكل المقابل:

المستقيم ل يصنع زاوية قياسها $هـ$

مع الاتجاه الموجب لمحور السينات

فيكون: ميل المستقيم ل = ط هـ = $هـ$

لاحظ أن

المستقيم يمر بالنقطتين: $(0, 2)$ ، $(7, 5)$ فيكون:

$$\text{ميل المستقيم ل} = \frac{\text{ص} - \text{ص}}{\text{س} - \text{س}} = \frac{5 - 2}{7 - 0} = \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$$

ملاحظة: الزاوية التى يصنعها المستقيم ل مع الاتجاه الموجب لمحور السينات تأخذ إحدى الحالات الآتية:

| ١ حادة | ٢ منفرجة | ٣ صفرية | ٤ قائمة |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | |
| فيكون الميل موجباً | فيكون الميل سالباً | فيكون الميل صفراً | فيكون الميل غير معرف |

مثال ١

أوجد ميل المستقيم الذى يصنع زاوية موجبة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات قياسها:

$$١٢٤٦٥٦٢$$

٤٥

الحل

١ ميل الخط المستقيم = ط هـ = ٤٥

٢ ميل الخط المستقيم = ط هـ = $١٢٤٦٥٦٢ = ١,٤٦٨٥$

ابداً → tan 4 5 =

ابداً → tan 1 2 4 6 1 5 1 2 5 =

مثال ٢

أوجد قياس الزاوية الموجبة (هـ) التى يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات إذا

$$\frac{1}{3} - 2 \quad ١,٤٨٦$$

الحل

١ م = ط هـ

∴ ط هـ = $١,٤٨٦$

∴ الميل موجب

∴ هـ زاوية حادة

$$١,٤٨٦ = \text{ط هـ} = \frac{١}{3} - 2$$

ابداً → SHIFT tan 1 0 4 8 6 =

٢ م = ط هـ

∴ ط هـ = $\frac{1}{3} - 2$

∴ الميل سالب

∴ هـ زاوية منفرجة

وباستخدام الآلة الحاسبة كما يلى:

ابداً → SHIFT tan (-) 1 ÷ 3 - 2 =


نجد أن الآلة تعطى -٣٠

حيث إنها مبرمجة على إيجاد الزاوية الحادة فقط سواء

السالبة أو الموجبة ولكن المطلوب هو الزاوية الموجبة

ولذلك نوجد هـ (د هـ) المطلوبة بإيجاد مكمل الزاوية ٣٠

$$\text{فيكون: هـ (د هـ)} = ١٨٠ - ٣٠ = ١٥٠$$



مثال ٢

أوجد قياس الزاوية الموجبة (هـ) التي يصنعها المستقيم ل مع الاتجاه الموجب لمحور السينات إذا كان المستقيم ل يمر بالنقطتين :

١ : $(-2, 3), (1, 4)$ ٢ : $(-2, 3), (3, 4)$

الحل

١ : المستقيم ل يمر بالنقطتين : $(-2, 3), (1, 4)$

$$\therefore \text{ميل المستقيم ل} = \frac{4 - 3}{1 - (-2)} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \angle \text{هـ} = 60^\circ$$

٢ : المستقيم ل يمر بالنقطتين : $(-2, 3), (3, 4)$

$$\therefore \text{ميل المستقيم ل} = \frac{4 - 3}{3 - (-2)} = \frac{1}{5}$$

باستخدام الآلة الحاسبة كما يلي :



نجد أن الآلة تعطي 11.3° (وهي زاوية حادة سالبة)

فنوجد الزاوية الموجبة المنفرجة كما يلي : $\angle \text{هـ} = 180^\circ - 11.3^\circ = 168.7^\circ$

حاول بنفسك ١


١ أوجد ميل المستقيم الذي يصنع زاوية موجبة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات قياسها :

١ : 30° ٢ : 45° ٣ : 120°

٢ أوجد قياس الزاوية الموجبة التي يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات إذا كان ميل المستقيم ٢, ٦

٣ أوجد قياس الزاوية الموجبة (هـ) التي يصنعها المستقيم (ل) مع الاتجاه الموجب لمحور السينات إذا كان المستقيم ل يمر بالنقطتين : $(-1, 4), (5, 3)$

العلاقة بين ميل المستقيمين المتوازيين



في الشكل المقابل :

إذا كان ل١ ، ل٢ مستقيمين متوازيين ميلهما m_1, m_2 على الترتيب ويصنعان زاويتين موجبتين مع الاتجاه الموجب لمحور السينات قياسهما α_1, α_2 على الترتيب فإن :

$$\therefore m_1 = m_2 \quad \text{و} \quad \alpha_1 = \alpha_2$$

$$\therefore m_1 = m_2 \quad \text{و} \quad \alpha_1 = \alpha_2$$

وبالتالي نستنتج ما يلي :

إذا كان : $m_1 // m_2$ فإن : $m_1 = m_2$

أي أنه : إذا توازي مستقيمان فإن ميلهما يكونان متساويين.

ويكن أيضًا استنتاج العكس :

إذا كان : $m_1 = m_2$ فإن : $m_1 // m_2$

أي أنه : إذا تساوى ميل مستقيمين في المستوى كان المستقيمان متوازيين.

مثال ٤

أثبت أن المستقيم الذي يمر بالنقطتين $(2, 3), (1, 6)$ يوازي المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها 135°

الحل

$$\therefore \text{ميل المستقيم الأول} = \frac{3 - 6}{2 - 1} = -3$$

$$\therefore \text{ميل المستقيم الثاني} = m_2 = 135^\circ = -1$$

\therefore المستقيمان متوازيان.

العلاقة بين ميلي المستقيمين المتعامدين

إذا كان: $ل$ ، $ل٢$ مستقيمين ميلاهما $ل١$ ، $ل٢$ على الترتيب

وكان: $ل١ \perp ل٢$ فإن: $ل١ \times ل٢ = ١ -$ (ما لم يوازي أحدهما أحد المحورين)

أي أن: حاصل ضرب ميلي المستقيمين المتعامدين يساوي -١

والعكس صحيح: إذا كان: $ل$ ، $ل٢$ مستقيمين ميلاهما $ل١$ ، $ل٢$

وكان: $ل١ \times ل٢ = ١ -$ فإن: $ل١ \perp ل٢$

أي أنه: إذا كان حاصل ضرب ميلي مستقيمين يساوي -١ فإن المستقيمين يكونان متعامدين.

مثال ٧

أثبت أن المستقيم $ل١$ المار بالنقطتين: $(٤، ١-)$ ، $(٧، ٣)$ يكون عمودياً على المستقيم $ل٢$ المار بالنقطتين: $(١، ١)$ ، $(٣، ٤)$

الحل

$$\therefore \text{ميل } ل١ = \frac{٤ - ٧}{(١-) - ٣} = \frac{٣}{٤} \quad \text{ميل } ل٢ = \frac{١ - ٣}{١ - ٤} = \frac{٢}{٣}$$

$$\therefore \text{ميل } ل١ \times \text{ميل } ل٢ = \frac{٣}{٤} \times \frac{٢}{٣} = ١ -$$

$$\therefore ل١ \perp ل٢$$

مثال ٨

في المستوى الإحداثي المتعامد إذا كانت النقط: $أ(٧، ١)$ ، $ب(٤، ٢)$ ، $ح(٥، ٥)$ تمثل رؤوس مثلث قائم الزاوية في $ب$ فأوجد قيمة: $ص$

الحل

$$\therefore \text{ميل } أ ب = \frac{٧ - ٤}{١ - ٢} = ٣ - \quad \text{ميل } ب ح = \frac{٤ - ص}{٢ - ٥} = \frac{٤ - ص}{٣}$$

$$\therefore \text{ميل } أ ب \perp \text{ميل } ب ح \quad \therefore \text{ميل } أ ب \times \text{ميل } ب ح = ١ -$$

$$\therefore ٣ - \times \frac{٤ - ص}{٣} = ١ -$$

$$\therefore ٣ - (٤ - ص) = ٣$$

$$\therefore ٣ - ١٢ + ٣ص = ٣$$

$$\therefore ٣ص = ١٢ - ٣$$

$$\therefore ٣ص = ٩$$

$$\therefore ص = ٣$$

مثال ٥

إذا كانت: $أ(٢، ١-)$ ، $ب(٣، ٢)$ ، $ح(١، ٤-)$ ، $د(٢، ٥)$ أربع نقاط في مستوى إحداثي متعامد وكان $أ ب \parallel ح د$ فأوجد قيمة: $س$

الحل

$$\therefore \text{ميل } أ ب \parallel \text{ميل } ح د \quad \therefore \text{ميل المستقيم المار بالنقطتين: } أ(٢، ١-)، ب(٣، ٢)$$

$$\text{يساوي ميل المستقيم المار بالنقطتين: } ح(١، ٤-)، د(٢، ٥)$$

$$\therefore \frac{١ - ٢}{(١-) - ٢} = \frac{٢ - ٣}{٤ - س}$$

$$\therefore \frac{١ - ٢}{٤ - س} = \frac{٢ - ٣}{٤ - س}$$

$$\therefore ٣ = ٤ + س$$

$$\therefore س = ١ -$$

مثال ٦

في المستوى الإحداثي المتعامد أثبت أن النقط:

$أ(١، ١-)$ ، $ب(٤، ٣)$ ، $ح(٢، ٥)$ تقع على استقامة واحدة.

الحل

$$\therefore \text{ميل } أ ب = \frac{١ - ٤}{(١-) - ٣} = \frac{٣}{٢}$$

$$\text{ميل } ب ح = \frac{٤ - ٥}{٣ - ٢} = ١ -$$

$$\therefore \text{ميل } أ ب \times \text{ميل } ب ح = \frac{٣}{٢} \times ١ - = ١ -$$

$$\therefore أ ب \parallel ح د$$

لاحظ أنه

إذا كان: $أ ب \parallel ح د$ فإن: $أ ب \times ح د = ١ -$

فإن: $أ ب \times ح د = ١ -$ تكون على استقامة واحدة.

$\therefore أ ب \times ح د = ١ -$ تقع على استقامة واحدة.

حل بلفسك ٢

أثبت أن: المستقيم $ل١$ المار بالنقطتين: $أ(١، ٥)$ ، $ب(٢، ١-)$ يوازي المستقيم $ل٢$ المار بالنقطتين: $أ(١، ٥)$ ، $ب(٩، ٥)$

إذا كان المستقيم $أ ب \parallel$ محور السينات حيث: $أ(٥، ٤-)$ ، $ب(٢، ٥)$ فأوجد قيمة: $ص$

لإثبات أن الشكل الرباعي شبه منحرف نثبت أن :

ضلعين متقابلين فيه متوازيان والضلعان الآخران غير متوازيين.

لإثبات أن الشكل الرباعي متوازي أضلاع نثبت إحدى الخواص الآتية :

كل ضلعين متقابلين متوازيان.

كل ضلعين متقابلين متساويان في الطول.

ضلعان متقابلان متوازيان ومتساويان في الطول.

لقطران ينصف كل منهما الآخر.

إثبات أن الشكل الرباعي مستطيل أو معين أو مربع فإننا نثبت أولاً أن هذا الشكل متوازي أضلاع كما سبق ، ثم :

الإثبات أن متوازي الأضلاع هو مستطيل نثبت إحدى الخاصيتين الآتيتين :

① ضلعان متجاوران فيه متعامدان. ② القطران متساويان في الطول.

إثبات أن متوازي الأضلاع هو معين نشبت إحدى الخاصيتين الآتيتين :

① ضلعان متجاوران فيه متساويان في الطول.

٢ القطران متعامدان.

الإثبات أن متوازي الأضلاع هو مربع نشأت إحدى الخواص الآتية :

① ضلعان متحابان: فہر متعامدان و متساویان فی الطول.

② ضلعان متجاوران فيه متعامدان ، والقطران متعامدان.

٣ القطران مقسومان في الطول ، ومتعامدان.

④ ضلعان متجاوران فیہ متساویان فی الطول و قطراہ متساویان فی الطول۔

إذا كان: \perp له وكان ميل له هو α ، ميل له هو β حيث $\alpha \in \mathbb{R}^*$ ، $\beta \in \mathbb{R}^*$.
فإن: $\alpha = \frac{1}{\beta}$ ، $\beta = \frac{1}{\alpha}$

فَمَثَلًا : إذا كان ميل المستقيم ل هو $\frac{2}{3}$ فإن ميل المستقيم العمودي عليه $\frac{1}{3}$
 إذا كان ميل المستقيم ل هو $\frac{2}{3}$ فإن ميل المستقيم العمودي عليه $\frac{3}{2}$

في الشكل المقابل :

إذا كان : $L \perp L$

فأوجد : قيمة لـ

الحل

∴ المستقيم ل يمر بالنقطتين $(-1, 0)$ ، $(0, 1)$ ،

$$1 = \frac{1}{(1-1)} = \infty \therefore \text{میل 1}$$

∴ المستقيم لم يمر بالنقطتين $(0, 2)$ و $(4, 0)$.

$$\frac{e}{\epsilon} = \frac{e}{\epsilon - 4} = 3 \text{ ميل ل}$$

$\therefore \angle 1 = \angle 2$ ، ميل $1 = 2$

∴ میل لم = ۱-

من (١) ، (٢) : $\therefore \frac{2}{x} = 1 \therefore x = 2$

اول بنفسك


۱) إذا كانت: $P(2, -5)$ ، $S(1, 2)$ ، $C(3, 4)$ ثلاث نقاط في مستوى

٢ أثبت أن: المستقيم المار بالنقطتين: (٧، -١)، (٥، -٣) عمودي على المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها 135°

مثال ١٥

على مستوى إحداثي متعامد مثل النقط: $أ(٢، ٣)$ ، $ب(٠، ٥)$ ، $ج(٠، ٧)$ ، $د(٨، ٩)$ ثم أثبت أن: الشكل $أبج$ متوازي أضلاع.

الحل



$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2-0 \\ 3-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \vec{GD} = \begin{pmatrix} 8-0 \\ 9-7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{BG} = \begin{pmatrix} 0-0 \\ 7-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \vec{AD} = \begin{pmatrix} 8-2 \\ 9-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\vec{AB} = \vec{GD} \quad \vec{BG} = \vec{AD}$$

$$\vec{AB} // \vec{GD} \quad \vec{BG} // \vec{AD}$$

$$\vec{AB} = \vec{GD} \quad \vec{BG} = \vec{AD}$$

$$\vec{AB} = \vec{GD} \quad \vec{BG} = \vec{AD}$$

$$\vec{AB} = \vec{GD} \quad \vec{BG} = \vec{AD}$$

$$\vec{AB} // \vec{GD} \quad \vec{BG} // \vec{AD}$$

(٢)

من (١)، (٢): الشكل $أبج$ متوازي أضلاع.

مثال ١٦

أثبت أن النقط: $أ(٢، ٢)$ ، $ب(٤، ٨)$ ، $ج(٥، ٧)$ ، $د(١، ١)$ هي رؤس المستطيل $أبج$

الحل

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 4-2 \\ 8-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \vec{DC} = \begin{pmatrix} 5-1 \\ 7-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\vec{AB} = \vec{DC}$$

$$\vec{AB} // \vec{DC}$$

$$\vec{AD} = \begin{pmatrix} 1-2 \\ 1-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \vec{BC} = \begin{pmatrix} 5-4 \\ 7-8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{AD} = \vec{BC}$$

$$\vec{AD} // \vec{BC}$$


(٢)

من (١)، (٢) ينتج أن: الشكل $أبج$ متوازي أضلاع
 $\vec{AB} \times \vec{BC} = 1 \times 1 = 1$
 $\vec{AB} \perp \vec{BC}$
 \therefore الشكل $أبج$ مستطيل.

مثال ١٧

على مستوى إحداثي متعامد مثل النقط: $أ(٣، ٣)$ ، $ب(١، ٢)$ ، $ج(٥، ١)$ ، $د(٣، ٢)$ ثم أثبت أن: الشكل $أبج$ شبه منحرف.

الحل



$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 1-3 \\ 2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \vec{GD} = \begin{pmatrix} 3-5 \\ 2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{BG} = \begin{pmatrix} 5-1 \\ 1-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \vec{AD} = \begin{pmatrix} 3-1 \\ 2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{AB} = \vec{GD} \quad \vec{BG} = \vec{AD}$$

$$\vec{AB} // \vec{GD} \quad \vec{BG} // \vec{AD}$$

$$\vec{AB} = \vec{GD} \quad \vec{BG} = \vec{AD}$$

$$\vec{AB} = \vec{GD} \quad \vec{BG} = \vec{AD}$$

$$\vec{AB} = \vec{GD} \quad \vec{BG} = \vec{AD}$$

$$\vec{AB} = \vec{GD} \quad \vec{BG} = \vec{AD}$$

(٢)

من (١)، (٢): الشكل $أبج$ شبه منحرف.

١- = -١ [أثبت بمتساوية]

٢- = -١ [أثبت بمتساوية]

٣- = -١ [أثبت بمتساوية]

٤- = -١ [أثبت بمتساوية]

٥- = -١ [أثبت بمتساوية]

٦- = -١ [أثبت بمتساوية]

٧- = -١ [أثبت بمتساوية]

٨- = -١ [أثبت بمتساوية]

٩- = -١ [أثبت بمتساوية]

١٠- = -١ [أثبت بمتساوية]

١١- = -١ [أثبت بمتساوية]

١٢- = -١ [أثبت بمتساوية]

١٣- = -١ [أثبت بمتساوية]

١٤- = -١ [أثبت بمتساوية]

١٥- = -١ [أثبت بمتساوية]

١٦- = -١ [أثبت بمتساوية]

١٧- = -١ [أثبت بمتساوية]

١٨- = -١ [أثبت بمتساوية]

١٩- = -١ [أثبت بمتساوية]

٢٠- = -١ [أثبت بمتساوية]

٢١- = -١ [أثبت بمتساوية]

٢٢- = -١ [أثبت بمتساوية]

٢٣- = -١ [أثبت بمتساوية]

٢٤- = -١ [أثبت بمتساوية]

٢٥- = -١ [أثبت بمتساوية]

٢٦- = -١ [أثبت بمتساوية]

٢٧- = -١ [أثبت بمتساوية]

٢٨- = -١ [أثبت بمتساوية]

٢٩- = -١ [أثبت بمتساوية]

٣٠- = -١ [أثبت بمتساوية]

٣١- = -١ [أثبت بمتساوية]

٣٢- = -١ [أثبت بمتساوية]

٣٣- = -١ [أثبت بمتساوية]

٣٤- = -١ [أثبت بمتساوية]

٣٥- = -١ [أثبت بمتساوية]

٣٦- = -١ [أثبت بمتساوية]

٣٧- = -١ [أثبت بمتساوية]

٣٨- = -١ [أثبت بمتساوية]

٣٩- = -١ [أثبت بمتساوية]

٤٠- = -١ [أثبت بمتساوية]

٤١- = -١ [أثبت بمتساوية]

٤٢- = -١ [أثبت بمتساوية]

٤٣- = -١ [أثبت بمتساوية]

٤٤- = -١ [أثبت بمتساوية]

٤٥- = -١ [أثبت بمتساوية]

٤٦- = -١ [أثبت بمتساوية]

٤٧- = -١ [أثبت بمتساوية]

٤٨- = -١ [أثبت بمتساوية]

٤٩- = -١ [أثبت بمتساوية]

٥٠- = -١ [أثبت بمتساوية]

٥١- = -١ [أثبت بمتساوية]

٥٢- = -١ [أثبت بمتساوية]

٥٣- = -١ [أثبت بمتساوية]

٥٤- = -١ [أثبت بمتساوية]

٥٥- = -١ [أثبت بمتساوية]

٥٦- = -١ [أثبت بمتساوية]

٥٧- = -١ [أثبت بمتساوية]

٥٨- = -١ [أثبت بمتساوية]

٥٩- = -١ [أثبت بمتساوية]

٦٠- = -١ [أثبت بمتساوية]

٦١- = -١ [أثبت بمتساوية]

٦٢- = -١ [أثبت بمتساوية]

٦٣- = -١ [أثبت بمتساوية]

٦٤- = -١ [أثبت بمتساوية]

٦٥- = -١ [أثبت بمتساوية]

٦٦- = -١ [أثبت بمتساوية]

٦٧- = -١ [أثبت بمتساوية]

٦٨- = -١ [أثبت بمتساوية]

٦٩- = -١ [أثبت بمتساوية]

٧٠- = -١ [أثبت بمتساوية]

٧١- = -١ [أثبت بمتساوية]

٧٢- = -١ [أثبت بمتساوية]

٧٣- = -١ [أثبت بمتساوية]

٧٤- = -١ [أثبت بمتساوية]

٧٥- = -١ [أثبت بمتساوية]

٧٦- = -١ [أثبت بمتساوية]

٧٧- = -١ [أثبت بمتساوية]

٧٨- = -١ [أثبت بمتساوية]

٧٩- = -١ [أثبت بمتساوية]

٨٠- = -١ [أثبت بمتساوية]

٨١- = -١ [أثبت بمتساوية]

٨٢- = -١ [أثبت بمتساوية]

٨٣- = -١ [أثبت بمتساوية]

٨٤- = -١ [أثبت بمتساوية]

٨٥- = -١ [أثبت بمتساوية]

٨٦- = -١ [أثبت بمتساوية]

٨٧- = -١ [أثبت بمتساوية]

٨٨- = -١ [أثبت بمتساوية]

٨٩- = -١ [أثبت بمتساوية]

٩٠- = -١ [أثبت بمتساوية]

٩١- = -١ [أثبت بمتساوية]

٩٢- = -١ [أثبت بمتساوية]

٩٣- = -١ [أثبت بمتساوية]

٩٤- = -١ [أثبت بمتساوية]

٩٥- = -١ [أثبت بمتساوية]

٩٦- = -١ [أثبت بمتساوية]

٩٧- = -١ [أثبت بمتساوية]

٩٨- = -١ [أثبت بمتساوية]

٩٩- = -١ [أثبت بمتساوية]

١٠٠- = -١ [أثبت بمتساوية]

أكمل ما يأتي :

١ ميل المستقيم الموازي لمحور السينات

٢ ميل المستقيم الموازي لمحور الصادات

٣ إذا كان : $\vec{AB} // \vec{CD}$ وكان ميل $\vec{AB} = \frac{2}{3}$

فإن : ميل $\vec{CD} = \dots\dots\dots$

٤ إذا كان : $\vec{AB} \perp \vec{CD}$ وكان ميل $\vec{AB} = \frac{1}{2}$

فإن : ميل $\vec{CD} = \dots\dots\dots$

٥ ΔABC قائمة الزاوية في B فيه : $A(1, 0)$ ، $B(0, 1)$ ، $C(5, 1)$

فإن : ميل $\vec{BC} = \dots\dots\dots$

٦ ABC متوازي أضلاع حيث $A(1, 0)$ ، $B(4, 1)$ ، $C(1, 0)$

فإن : ميل $\vec{AC} = \dots\dots\dots$

٧ إذا كان : ABC مربعاً قطراه \vec{AC} ، \vec{BD} حيث : $A(0, 3)$ ، $B(5, 1)$ ، $C(1, 0)$ ، $D(0, 5)$

فإن : ميل $\vec{BD} = \dots\dots\dots$


٢ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ في الشكل المقابل :

ميل المستقيم l يساوي (البدر الأحمدي ١٧)

(أ) $\frac{2}{3}$ (ب) $\frac{3}{2}$

(ج) $\frac{3}{2}$ (د) $\frac{2}{3}$



٢ في الشكل المقابل :


ميل $\overleftrightarrow{AB} = \dots\dots\dots$

(أ) $\frac{2}{3}$

(ب) $\frac{2}{3}$

(ج) $\frac{3}{2}$

(د) $\frac{3}{2}$



(الأقصر ١٩)

٣ ميل المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها 45° يساوى

(الجيزة ١٧)

(أ) 45° (ب) 135° (ج) 225° (د) 315°

٤ إذا كان ميل خط مستقيم أكبر من الصفر فإن الزاوية الموجبة التي يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات تكون

(دمياط ١١)

(أ) صفرية. (ب) حادة. (ج) قائمة. (د) منفرجة.

٥ إذا كان m_1 ، m_2 ميلين مستقيمين متعامدين فإن

(قنا ١٢)

(أ) $m_1 = m_2$ (ب) $m_1 = -m_2$ (ج) $m_1 = m_2 - 1$ (د) $m_1 = m_2 + 1$

٦ إذا كان m_1 ، m_2 ميلين مستقيمين متوازيين فإن

(بوسعيد ٠٨)

(أ) $m_1 = m_2$ (ب) $m_1 = m_2 + 1$ (ج) $m_1 = m_2 - 1$ (د) $m_1 = m_2 + 2$

٧ المستقيم المار بالنقطتين : $(0, 0)$ ، $(2, 3)$ يوازي المستقيم الذي ميله يساوى

(أ) $\frac{3}{2}$ (ب) $\frac{2}{3}$ (ج) $\frac{3}{2}$ (د) $\frac{2}{3}$

٨ إذا كان المستقيم l عمودياً على المستقيم المار بالنقطتين : $(-1, 2)$ ، $(0, 0)$ فإن ميل المستقيم l =

(أ) 2 (ب) -2 (ج) $\frac{1}{2}$ (د) $-\frac{1}{2}$

٩ إذا كان m_1 ، m_2 ميلين مستقيمين متعامدين ، $m_1 = 70^\circ$ ، فإن m_2 =

(الشرقية ١٢)

(أ) 20° (ب) 70° (ج) 110° (د) 160°

١٠ إذا كان المستقيمان اللذان ميلاهما $\frac{2}{3}$ ، $\frac{3}{2}$ متوازيين فإن l =

(مطروح ١٩٤٥ ، الإسكندرية ١٧)

(أ) $\frac{3}{2}$ (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) 2 (د) $\frac{4}{3}$

١١ إذا كان المستقيم المار بالنقطتين : $(3, 2)$ ، $(5, 0)$ يوازي المستقيم المار بالنقطتين $(2, 0)$ ، $(4, 3)$ فإن : $\text{.....} = \text{.....}$

- (أ) ٢ (ب) -٢ (ج) صفر (د) ١

١٢ المستقيم المار بالنقطتين : $(-1, -1)$ ، $(4, 4)$ يصنع زاوية موجبة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات قياسها
(ش.سيناء، ١٧، المنهوبة ١٥)

- (أ) 30° (ب) 45° (ج) 60° (د) 135°

١٣ إذا كان المستقيم المار بالنقطتين : $(0, 4)$ ، $(4, 0)$ عمودياً على المستقيم الذي يصنع زاوية موجبة قياسها 45° مع الاتجاه الموجب لمحور السينات

فإن : $\text{.....} = \text{.....}$
(أسواه ١٣)


- (أ) ٤ (ب) -٤ (ج) ١ (د) -١

١٤ في الشكل المقابل :

إذا كان : $l \perp l'$




فإن : $\text{.....} = \text{.....}$

- (أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ٨



٣ اكتب أسفل كل شكل ميل المستقيم ل :

١



الدرس

أوجد ميل الخط المستقيم الذي يصنع زاوية موجبة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات

| | | | | | |
|---|-----|---|----|---|-----|
| ١ | صفر | ٢ | ٣٠ | ٤ | ٥٧ |
| ٢ | ٦٠ | ٦ | ٩٠ | ٧ | ٨٦ |
| ٣ | | | | ٨ | ١٢٥ |

باستخدام الآلة الحاسبة أوجد قياس الزاوية الموجبة التي يصنعها المستقيم الذي ميله (م) الاتجاه الموجب لمحور السينات في كل من الحالات الآتية :

| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| ١ | م = ٠.٢ | ٢ | م = ٠.٣٦٧٣ |
| ٣ | م = ١.٠٢٤٦ | ٤ | م = $\frac{4}{5}$ |

أثبت أن المستقيم المار بالنقطتين : (٢، ٤) ، (٥، ٦) يوازي المستقيم المار بالنقطتين : (٥، ٠) ، (١، -١)

أثبت أن المستقيم المار بالنقطتين : أ (٤، ٣-) ، ح (٢، ٣-) عمودي على المستقيم المار بالنقطتين : ب (٢، ١) ، د (٢، ٣-)

أثبت أن المستقيم المار بالنقطتين : (٢، ٦) ، (١، -٢) يوازي المستقيم الذي يصنع زاوية موجبة قياسها ٤٥ مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. (المسألة ٢٠، الفقرة ١٨، الإجابة ١٧)

أثبت أن المستقيم المار بالنقطتين : (٤، ٣) ، (٥، ٢) عمودي على المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها ٣٠ (الفاصل ١٦، المسألة ١٦)

في المستوى الإحداثي المتعامد إذا كانت : أ (١، ٥) ، ب (٣، ١-) ، ح (٤، ٧) ، د (٢، ١) أربع نقاط تحقق أن $\overleftrightarrow{AD} \parallel \overleftrightarrow{BC}$ فأوجد قيمة : س

إذا كان المثلث الذي رؤوسه النقط ص (٤، ٢) ، س (٣، ٥) ، ع (٥، -١) قائم الزاوية في ص أوجد قيمة : ٢ (المسألة ٢٠، الفقرة ١٧، الإجابة ١٧)

إذا كان المستقيم $\overleftrightarrow{AB} \parallel$ محور الصادات حيث : أ (٧، ٧) ، ب (٣، ٥) ، د (٤، ٢) ، ع (٥، -١) فأوجد قيمة : س (الفاصل ١٦)

إذا كان المستقيم $\overleftrightarrow{AD} \parallel$ محور السينات حيث : ح (٤، ٢) ، د (٥، -١) ، ع (٥، -١) ، ف (٥، -١) فأوجد قيمة : ص

١٤ إذا كان المستقيم l يمر بالنقطتين $(1, 3)$ ، $(2, 4)$ والمستقيم m يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها 45° فأوجد قيمة k إذا كان المستقيمان l ، m :
 ١ متوازيين. ٢ متعامدين. (أسوان ٢٠، الإسكندرية ١٨، أسبوط ١٧) «صفر» ٢.

١٥ أوجد قياس الزاوية الموجبة التي يصنعها المستقيم l مع الاتجاه الموجب لمحور السينات إذا كان المستقيم l يمر بالنقطتين : $(3, 4)$ ، $(2, 5)$ «٥٠ ٥٧ ٧٥»

١٦ أوجد قياس الزاوية الموجبة التي يصنعها المستقيم l مع الاتجاه الموجب لمحور السينات إذا كان المستقيم l يمر بالنقطتين : $(0, 0)$ ، $(2, -2)$ «١٣٥»

١٧ أوجد قياس الزاوية الموجبة التي يصنعها المستقيم l مع الاتجاه الموجب لمحور السينات إذا كان المستقيم l عمودياً على المستقيم المار بالنقطتين : $(-2, 0)$ ، $(4, 1)$ «٤٥»

١٨ أثبت أن النقط : $أ(1, 1)$ ، $ب(2, 3)$ ، $ح(0, -1)$ تقع على استقامة واحدة. (القاهرة ١٣)

١٩ إذا كانت النقط : $(1, 0)$ ، $(2, 3)$ ، $(0, 5)$ تقع على استقامة واحدة فأوجد قيمة : $أ$ (القاهرة ٢٠، دمياط ١٩، سوهاج ١٨، قنا ١٦، الغربية ١٤) «١٠»

٢٠ إذا كان : $أ(1, 7)$ ، $ب(-1, 0)$ ، $ح(4, 2)$ أثبت أن : $ح \notin \overleftrightarrow{أب}$

٢١ إذا كانت : $أ(-1, 1)$ ، $ب(2, 3)$ ، $ح(6, 0)$ أثبت أن : المثلث $أب ح$ قائم الزاوية في $ب$ (أسوان ١٩، كفر الشيخ ١٧، السويس ١٤)


٢٢ أثبت أن النقط : $أ(-1, 1)$ ، $ب(0, 5)$ ، $ح(4, 2)$ ، $د(0, 6)$ هي رؤوس لمتوازي الأضلاع $أب ح د$ (بنى سويف ١٨، الأقصر ١٢)

٢٣ أثبت باستخدام الميل أن النقط : $أ(-1, 3)$ ، $ب(0, 1)$ ، $ح(6, 4)$ هي رؤوس المستطيل $أب ح د$ (شبه سيناء ١٨، سوهاج ١٧، بنى سويف ١٣)

٢٤ أثبت أن النقط : $أ(1, 3)$ ، $ب(6, 4)$ ، $ح(7, 9)$ ، $د(2, 8)$ هي رؤوس المعين $أب ح د$

الدرس الثالث

أثبت أن النقط : ١ (١- ، ١-) ، ٢ (٣ ، ٢) ، ٣ (٠ ، ٦) ، ٤ (٤- ، ٣) هي رؤوس مربع.



في الشكل المقابل :

١ ٢ ٣ ٤ : ١ (١- ، ١-) ، ٢ (٣ ، ٢) ، ٣ (٠ ، ٦) ، ٤ (٤- ، ٣)

(السويص ١٩ ، الإسكندرية ١٤) « ١- ، ١- »

أثبت أن النقط : ١ (٣ ، ٤) ، ٢ (٠ ، ٧) ، ٣ (٢- ، ١) هي رؤوس مثلث وإذا كانت نقطة ٤ (٢ ، ١) فأثبت أن : الشكل ١ ٢ ٣ ٤ شبه منحرف وأوجد النسبة بين : ١ ، ٢ ، ٣

« ٢ : ١ »

للمتفوقين

أوجد ميل المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة جيبها $\frac{2}{5}$


« $\frac{2}{5}$ »

إذا كانت النقط : ١ (١ ، ١) ، ٢ (٣ ، ٣) ، ٣ (٠ ، ٣-) ، ٤ (٤- ، ٣) هي رؤوس المستطيل ١ ٢ ٣ ٤ فأوجد قيمة كل من : ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤

« ٤ ، ٢- »

١ ٢ ٣ ٤ : ١ (١ ، ١) ، ٢ (٣ ، ٣) ، ٣ (٠ ، ٣-) ، ٤ (٤- ، ٣) أوجد : ١ قيمة له ٢ طول له

(الإسماعيلية ١٣) « ٣- ، ٢ ، ٢ وحدة طول »



في الشكل المقابل :

إذا كان : المستقيم $l \perp$ المستقيم m ، \exists المستقيم n بحيث : ١ (٣ ، ٣) ، ٢ (٠ ، ٣-) ، ٣ (٠ ، ٣-) ، ٤ (٤- ، ٣) أوجد قيمة : م

« ١ »

أولاً إيجاد ميل الخط المستقيم وطول الجزء المقطوع من محور الصادات

مثال تمهيدي

مثل بيانياً العلاقة : $2 - س = ص + 3 = 0$ ثم أوجد من الرسم ميل المستقيم الممثل لهذه العلاقة وطول الجزء المقطوع بالمستقيم من محور الصادات.

الحل

لرسم المستقيم يجب إيجاد على الأقل نقطتين من نقط المستقيم ، ولتسهيل ذلك يفضل وضع أحد المتغيرين $س$ أو $ص$ في طرف مستقل :

$$\begin{aligned} 2 - س = ص + 3 = 0 & \therefore ص = 3 - 2 = 1 \\ 2 - س = 0 & \therefore س = 2 \end{aligned}$$


$$\therefore (2, 0) \text{ إحدى نقط المستقيم}$$

$$\therefore ص = 3 - 2 = 1$$

$$\therefore (1, 1) \text{ إحدى نقط المستقيم}$$

أي أن : المستقيم يمر بالنقطتين $(2, 0)$ ، $(1, 1)$

$$\therefore \text{ميل المستقيم} = \frac{ص_2 - ص_1}{س_2 - س_1} = \frac{1 - 0}{1 - 2} = -1$$



طول الجزء المقطوع بالمستقيم من محور الصادات

ومن الرسم نجد أن : $3 = 0$ وحدات طولية

أي أن : المستقيم يقطع من الجزء الموجب

لحور الصادات 3 وحدات طولية

وبملاحظة معادلة المستقيم : $ص = 2 - س + 3$ نجد أن :

طول الجزء المقطوع بالمستقيم من محور الصادات

$$ص = 3 + س$$

ميل المستقيم




معادلة الخط المستقيم بمعلومية ميله وطول الجزء المقطوع من محور الصادات

سبق أن درسنا أن :

العلاقة $س + ب + ص = ح$ ، حيث $0 \neq$ (كلاهما معاً) \neq

هي علاقة خطية يمثلها بيانياً خط مستقيم يمكن إيجاد ميله (م) بإحدى الطريقتين الآتيتين :



$$م = \frac{\text{التغير الرأسى}}{\text{التغير الأفقى}} = \frac{ص_2 - ص_1}{س_2 - س_1}$$

حيث $(س_1, ص_1)$ ، $(س_2, ص_2)$ أى نقطتين عليه.

$$م = ط$$

حيث $م$ هو قياس الزاوية الموجبة التى يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات وسوف نستكمل دراستنا لهذا الموضوع بدراسة كيفية :

* إيجاد ميل الخط المستقيم وطول الجزء المقطوع بالمستقيم من محور الصادات إذا علمت معادلة الخط المستقيم.

* إيجاد معادلة الخط المستقيم إذا علم ميله وطول الجزء المقطوع بالمستقيم من محور الصادات.

أى أنه : إذا كانت معادلة الخط المستقيم على الصورة : $ص = م س + ح$ فإن :

- ميل الخط المستقيم = $م$
- طول الجزء المقطوع من محور الصادات بالمستقيم = $|ح|$ والمستقيم يمر بالنقطة $(0, ح)$

مثال ١

أوجد ميل الخط المستقيم : $ص = ٢ س + ٥$ و $ص = ١٥$ وأوجد طول الجزء المقطوع من محور الصادات.

الحل

نضع معادلة الخط المستقيم على الصورة : $ص = م س + ح$

$$\therefore ص = ٢ س + ٥ \quad \therefore ص = \frac{٢}{٥} س + ١٥$$

\therefore ميل المستقيم = $\frac{٢}{٥}$ وطول الجزء المقطوع من محور الصادات = ٣ وحدات طولية.

ملاحظة

في المثال السابق وبملاحظة المعادلة على الصورة : $ص = ٢ س + ٥$ نجد أن :

$$\text{ميل الخط المستقيم} = \frac{\text{معامل س}}{\text{معامل ص}} = \frac{٢}{٥}$$

المستقيم يقطع محور الصادات في النقطة $(0, ح)$ أي $(٣, ٥)$

أى أن : المستقيم يقطع من محور الصادات جزءاً طوله = $\left| \frac{\text{الحد المطلق}}{\text{معامل ص}} \right| = |٣| = ٣$ وحدات طولية.

أى أنه :

إذا كانت معادلة المستقيم على الصورة : $ص = م س + ح$ فإن :

$$\text{ميل المستقيم} = \frac{\text{معامل س}}{\text{معامل ص}} = \frac{٢}{٥}$$

المستقيم يقطع محور الصادات في النقطة $(0, ح)$ أي $(٣, ٥)$

أى أن : طول الجزء المقطوع من محور الصادات = $\left| \frac{\text{الحد المطلق}}{\text{معامل ص}} \right| = |٣| = ٣$

فمثلاً : • المستقيم الذى معادلته : $ص - ٢ = ٣$.

ميله = $\frac{١}{٢} = \frac{١}{٢}$ ، ويقطع محور الصادات فى النقطة $(٢, ٠)$

أى أنه يقطع جزءاً طوله = $\frac{٢}{٢}$ وحدة طولية من الجزء الموجب لمحور الصادات.

• المستقيم الذى معادلته : $ص + ٣ = ٤$.

ميله = $٣ -$ ، ويقطع محور الصادات فى النقطة $(٠, -٤)$

أى أنه يقطع جزءاً طوله = ٤ وحدات طولية من الجزء السالب لمحور الصادات.

مثال ٢

إذا كان المستقيم المار بالنقطتين $(٧, ١-)$ ، $(٩, ٣)$ عمودياً على المستقيم

الذى معادلته : $ص + ٤ = ١٣$ فأوجد قيمة : $ك$

الحل

بفرض أن : ميل المستقيم المار بالنقطتين $(٧, ١-)$ ، $(٩, ٣)$ هو $م$

$$\therefore م = \frac{ص٢ - ص١}{س٢ - س١} = \frac{٣ - ١-}{٩ - ٧} = \frac{٤}{٢} = ٢$$

وبفرض أن : ميل المستقيم الذى معادلته : $ص + ٤ = ١٣$ هو $ك$

$$\therefore ك = \frac{١-}{٤} = \frac{١-}{٤}$$

$$\therefore \text{المستقيمان متعامدان} \quad \therefore ١- = ٢ \times ك \quad \therefore ١- = \frac{١-}{٤} \times ك$$

$$\therefore ١- = \frac{٢}{٤} \quad \therefore ٢ = ك$$

حاول بنفسك

١ إذا كان المستقيمان : $ص + ٣ = ٧$ ، $ص = ٤ س + ٥$ متعامدين

فأوجد : قيمة $ك$

٢ مستقيم معادلته : $ص - ٣ = ٥$ ، أوجد قياس الزاوية الموجبة التى يصنعها

هذا المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.

٣ أوجد طول الجزء المقطوع من محور الصادات بالمستقيم الذى معادلته : $ص = ٣ س + ١٢$

ثانيًا إيجاد معادلة الخط المستقيم إذا علم ميله وطول الجزء المقطوع من محور الصادات بهذا المستقيم

المستقيم الذي ميله m ويقطع محور الصادات في النقطة $(0, c)$ تكون معادلته على الصورة: $y = mx + c$

مثال ٣

أوجد معادلة المستقيم:

١ الذي ميله $m = -\frac{3}{4}$ ويقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات ٢ وحدات طولية.

٢ الذي ميله $m = 2$ ويقطع من الجزء السالب لمحور الصادات ٧ وحدات طولية.

الحل

$y = mx + c$

١ $\therefore m = -\frac{3}{4}, c = 2$ \therefore معادلة المستقيم هي: $y = -\frac{3}{4}x + 2$

٢ $\therefore m = 2, c = -7$ \therefore معادلة المستقيم هي: $y = 2x - 7$

مثال ٤

أوجد معادلة المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها 135° ويقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات جزءًا مقداره ٧ وحدات طول.

الحل

\therefore الميل $m = \tan 135^\circ = -1$ \therefore معادلة المستقيم المطلوبة هي: $y = -x + 7$

ملاحظات

- ١ معادلة المستقيم الذي يمر بنقطة الأصل $(0, 0)$ هي $y = mx$ حيث m ميل المستقيم.
- ٢ معادلة محور السينات هي $y = 0$
- ٣ معادلة محور الصادات هي $x = 0$
- ٤ معادلة المستقيم الذي يوازي محور السينات ويمر بالنقطة $(l, 0)$ هي $y = 0$
- ٥ معادلة المستقيم الذي يوازي محور الصادات ويمر بالنقطة $(0, c)$ هي $x = 0$

مثال ٥

أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطتين: $(1, -1)$ ، $(2, 2)$

الحل

نفرض أن معادلة المستقيم على الصورة: $y = mx + c$

$$\therefore \text{الميل } (m) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{2 - (-1)}{2 - 1} = 3$$

\therefore معادلة المستقيم تصبح على الصورة: $y = 3x + c$

$\therefore (1, -1)$ تنتمي للمستقيم

$$\therefore -1 = 3 \times 1 + c \quad \therefore c = -4$$

\therefore معادلة المستقيم هي: $y = 3x - 4$

مثال ٦

أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة $(1, 2)$ موازيًا للمستقيم: $y = 2x + 3 - 6 = 0$

الحل

$$\therefore \text{ميل المستقيم المعطى} = \frac{-\text{معامل } x}{\text{معامل } y} = \frac{-2}{3}$$

$$\therefore \text{ميل المستقيم المطلوب معادلته} = \frac{-2}{3}$$

\therefore معادلة المستقيم المطلوبة هي: $y = -\frac{2}{3}x + c$

\therefore المستقيم يمر بالنقطة $(1, 2)$ \therefore فهي تحقق معادلته

$$\therefore 2 = -\frac{2}{3} \times 1 + c \quad \therefore c = \frac{8}{3}$$

\therefore معادلة المستقيم المطلوبة هي: $y = -\frac{2}{3}x + \frac{8}{3}$

∴ ميل المستقيم المار بالنقطتين ٢، ٤ يساوي $\frac{4-2}{2-0} = 1$

∴ معادلة المستقيم المطلوبة هي : $y = x + 2$

∴ المستقيم يمر بالنقطة ٢ = (٢، ١)

∴ فهي تحقق معادلته

∴ $\frac{2}{1} = 2$

∴ معادلة المستقيم المطلوبة هي : $y = x + 2$

حاول بنفسك

أ ب ح مثلث رؤوسه النقط : ٢ = (٢، ٤) ، ٣ = (٣، ٠) ، ٤ = (٠، ٣)

أوجد معادلة المستقيم المار بالرأس ٢ عمودياً على \overline{BC}

مثال ٩

باستخدام الميل والجزء المقطوع من محور الصادات مثل بيانياً المستقيم الذي معادلته :

$$y = 2x - 3$$

الحل

$$\text{ميل المستقيم} = \frac{\text{التغير الرأسى}}{\text{التغير الأفقى}} = \frac{2}{1} = 2$$

المستقيم يمر بالنقطة ح = (٣، ٠)


من النقطة ح نتحرك أفقياً نحو اليمين وحدة واحدة

(التغير الأفقى (١ +)) فنصل إلى النقطة د

ثم نتحرك رأسياً لأعلى وحدتين (التغير الرأسى (٢ +))

فنصل إلى هـ فيكون ح هـ هو التمثيل البياني

لمعادلة المستقيم : $y = 2x - 3$



مثال ٧

أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢، ٣) عمودياً على الخط المستقيم المار بالنقطتين :

١ = (٤، ٣) ، ٢ = (٣، ٠)

الحل

∴ ميل المستقيم المار بالنقطتين ١، ٢ يساوي $\frac{3-0}{4-3} = 3$

∴ ميل المستقيم العمودى $y = -\frac{1}{3}x + 2$

∴ معادلة المستقيم المطلوبة هي : $y = -\frac{1}{3}x + 2$

∴ المستقيم يمر بالنقطة (٢، ٣)

∴ $3 = -\frac{1}{3} \times 2 + 2$

∴ معادلة المستقيم المطلوبة هي : $y = -\frac{1}{3}x + 2$

حاول بنفسك

١ أوجد معادلة المستقيم الذى يقطع من محور الصادات جزءاً موجباً طوله ٥ وحدات طولية

ويوازي المستقيم المار بالنقطتين ٢ = (٢، ٣) ، ٣ = (٣، ٠)

٢ أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة (٣، ٤) عمودياً على المستقيم \overleftrightarrow{AB} حيث :

١ = (٢، ٣) ، ٢ = (٤، ٥)

مثال ٨

أ ب ح مثلث رؤوسه النقط ١ = (٢، ١) ، ٢ = (٣، ٠) ، ٣ = (٤، ٣) ، ٤ = (٠، ٣) متوسط فيه

أوجد : معادلة المستقيم المار بالمتوسط \overline{AD}

الحل

∴ \overline{AD} متوسط فى ΔABC

∴ منتصف \overline{BC}

$$(0, 3) = \left(\frac{(3-0)+2}{2}, \frac{(3-0)+2}{2} \right) = (2.5, 2.5)$$

المستقيم يمر بالنقطتين $(0, 3)$ و $(4, 0)$:

يفرض معادلة المستقيم : $ص = م س + ح$

$$\frac{ص}{م} = \frac{0 - 4}{3 - 0} = م \quad \therefore \frac{ص}{3} = م$$

$$\therefore ح = 4 \quad \therefore \frac{ص}{3} = م \quad \therefore م = \frac{ص}{3}$$

$$مسااحة \Delta = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6 \quad \therefore م = \frac{1}{3} \times 4 = \frac{4}{3}$$

حاول بنفسك ٤

تحرك شخص بسيارته بسرعة منتظمة بين المدينتين $أ$ و $ب$

والشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين

المسافة (ف) بالكيلومتر والزمن (ص) بالساعة.

أجب عما يأتي :


١ ما مقدار السرعة المنتظمة للسيارة ؟

٢ أوجد معادلة الخط المستقيم الممثل لحركة السيارة.

٣ أوجد المسافة التي تبعتها السيارة عن

نقطة $(0, 0)$ بعد مرور ٣ ساعات من

بداية الحركة.



$$١ \text{ } ٥٨ \text{ كم/ساعة}$$

$$٢ \text{ } ص = \frac{1}{3} س + \frac{4}{3}$$

$$٣ \text{ } ص = -\frac{1}{3} س + ٥$$

$$٤ \text{ } ٥٣$$


$$١ \text{ } ص = ٥٨ س + ٥٠$$

$$٢ \text{ } ٥٨٨$$

$$٣ \text{ } ص = \frac{1}{3} س + \frac{4}{3}$$

$$٤ \text{ } ٥٣$$

$$٥ \text{ } ٥٨٨$$



مثال ١٠

الشكل المقابل يمثل حركة سيارة تسير بسرعة

منتظمة حيث المسافة (ف) مقيسة

بالكيلومترات ، والزمن (ص) بالساعة أوجد :

١ المسافة عند بدء الحركة.

٢ سرعة السيارة.

٣ معادلة الخط المستقيم الممثل لحركة السيارة.

الحل

١ المسافة عند بدء الحركة = ٥٠ كيلو متر

٢ سرعة السيارة = ميل الخط البياني المار بالنقطتين $(0, 50)$ و $(6, 200)$

$$= \frac{200 - 50}{6 - 0} = \frac{150}{6} = ٢٥ \text{ كم/ساعة}$$

٣ معادلة الخط المستقيم هي : $ف = م ص + ح$ أي أن : $٥٠ + ٢٥ ص = ف$

مثال ١١

أوجد معادلة المستقيم الذي يقطع من محوري الإحداثيات السيني والصادي جزءين موجبين

طولهما ٣ ، ٤ وحدات طولية على الترتيب ثم أوجد مساحة المثلث المحصور بين المستقيم

ومحوري الإحداثيات.


الحل

المستقيم يقطع من الجزء الموجب لمحور السينات ٣ وحدات طولية

المستقيم يمر بالنقطة $(٠, ٣)$

المستقيم يقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات ٤ وحدات طولية

المستقيم يمر بالنقطة $(٤, ٠)$



أوجد الميل والجزء المقطوع من محور الصادات بكل من المستقيمات الآتية :

٢ ص = ٤ - س

١ ص = ٥ - س - ٣

٤ ص + س - ١ = ٠

٣ ٢ - س - ٣ ص - ٦ = ٠

٥ ٦ = ٣ ص + ٢ س

٦ ١ = ٣ ص + ٢ س

(الدقهلية ١٥)

(القليوبية ٢٠، مطروح ١٩، سوهاج ١٨، الجيزة ١٦)

أوجد معادلة المستقيم إذا علم أن :

١ ميله = ٢ ويقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات ٧ وحدات. (السويس ٢٠، دمياط ١٩)

٢ ميله = ١ - ويقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات ٣ وحدات.

٣ ميله = ٢ ١/٢ ويقطع من الجزء السالب لمحور الصادات وحدة واحدة.

٤ ميله = ٣/٤ - ويقطع من الجزء السالب لمحور الصادات ٢ ١/٢ وحدة.

٥ ميله = صفر ويقطع من الجزء السالب لمحور الصادات وحدتين.

(المنيا ١٧)

٦ ميله = ١/٣ - ويمر بالنقطة (٢ ، ٠)

٧ ميله = ٢ - ويمر بنقطة الأصل.

أوجد معادلة الخط المستقيم :

١ المار بنقطة الأصل ويصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها ١٣٥°

٢ المار بالنقطة (٢ ، ٣) ويصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها ٤٥°

(الشرقية ١٧)

٣ الذي يقطع من الجزء السالب لمحور الصادات جزءاً طوله ٣ وحدات ويوازي المستقيم الذي معادلته : ٢ - س - ٣ ص = ٦

(البحيرة ١١)

٤ العمودي على المستقيم : ٣ - س - ٤ ص + ٧ = ٠ ويقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات جزءاً مقداره ٦ وحدات.

٥ الذى يقطع جزءاً موجباً من محور الصادات مقداره ٥ وحدات وعمودى على المستقيم
المر بالنقطتين $(-2, 1)$ ، $(2, 7)$

٦ الذى يقطع من محورى الإحداثيات السينى والصادى جزءين موجبين طولاهما
٩ ، ٤ على الترتيب.
(القليوبية ١٩ ، كفر الشيخ ١٨ ، الأقصر ١٧)

٧ المر بالنقطة $(2, -1)$ وميله يساوى ٢
(القليوبية ١١)

٨ المر بالنقطة $(2, -3)$ عمودياً على المستقيم الذى معادلته : $\frac{1}{4}x - y = ٥$
(الدقهلية ١٣)

٩ المر بالنقطة $(3, -5)$ ويوازي المستقيم : $٢x + ٧ = ٠$ (أسوان ٢٠)

١٠ المر بالنقطة $(3, 2)$ ويوازي المستقيم الذى يمر بالنقطتين $(5, 6)$ ، $(-1, 2)$
(حلوان ٩٥)

١١ المر بالنقطة $(1, 2)$ عمودياً على المستقيم المر بالنقطتين
 $٢(2, -3)$ ، $٤(5, -)$ (بوسعيد ٢٠ ، السويس ١٩ ، الأقصر ١٨ ، الغربية ١٤)

١٢ المر بالنقطة $(2, -2)$ عمودياً على المستقيم الذى يصنع زاوية موجبة قياسها ٤٥° مع
الاتجاه الموجب لمحور السينات.
(الأقصر ١١)

١٣ المر بالنقطتين : $(2, -1)$ ، $(1, 1)$
(القليوبية ١٦ ، الغربية ١٣)

١٤ المر بالنقطتين : $(4, 2)$ ، $(-2, -1)$ ثم أثبت أنه يمر بنقطة الأصل.
(القاهرة ١٩ ، البحيرة ١٧)

١٥ الذى ميله يساوى ميل الخط المستقيم : $\frac{1 - \text{ص}}{\text{س}} = \frac{1}{3}$ ويقطع جزءاً سالباً من
محور الصادات مقداره ٣ وحدات.
(السويس ١٩ ، دمياط ١٨)

١٦ العمودى على \overline{AB} من نقطة P حيث : $P(3, -6)$ ، $B(2, 1)$

١٧ العمودى على \overline{AB} من نقطة منتصفها حيث : $P(1, 3)$ ، $B(3, 5)$ (قنا ١٨)

١٨ المر بمنتصف القطعة المستقيمة \overline{AB} حيث : $P(4, 8)$ ، $B(-2, 4)$ ويوازي
المستقيم الذى معادلته : $٢x = ٤ - y$

١٩ الذى يمر بمنتصف القطعة \overline{AB} حيث : $P(3, 6)$ ، $B(-1, 4)$ عمودياً على
المستقيم الذى معادلته : $٢x - ٤ = ١١ + y$ (القاهرة ٩٥)

٢٠ المر بالنقطة $(2, 3)$ ويقطع من الجزء الموجب لمحور السينات ٤ وحدات. (الشرقية ١٨)

١ ميل المستقيم الذى معادلته : $3x - 4y = 15$ هو وميل العمودى عليه هو

٢ المستقيم الذى معادلته : $2x + 3y = 6$ يقطع محور الصادات فى النقطة

٣ المستقيم الذى ميله 2 ويقطع محور الصادات عند النقطة $(3, 0)$ معادلته هى

(الدقة ١١)

٤ معادلة محور السينات هى بينما معادلة محور الصادات هى

٥ معادلة المستقيم الذى يمر بالنقطة $(5, 3)$ ويوازي محور السينات هى


(أسلوب ١٢)

٦ معادلة المستقيم الذى يمر بالنقطة $(2, -3)$ ويوازي محور الصادات هى

٧ معادلة المستقيم المار بالنقطة $(2, -5)$ وميله صفر هى

٨ معادلة المستقيم الذى يوازي المستقيم : $2x - 3y = 0$ ويمر بنقطة الأصل هى

٩ فى الشكل المقابل :




(الشرقية ١٢)

$ل١ // ل٢$ ، $ل٣ = ٧$ وحدات طول

ومعادلة $ل١$ هى : $2x + 4y = 0$

فإن معادلة $ل٣$ هى

١٠ فى الشكل المقابل :



(الشرقية ١١)

$ل \supseteq ل١$ ، $ل٢(0, 4)$

$ل٣(3, 0)$ ، $ل١ = ل٢$

(١) نقطة $ل٣$ هى (..... ،)

(٢) فى Δ و $ل١$ يكون : $ل٢ =$

(٣) معادلة $ل٢$ هى : $ص =$ + $س$

- ١ ميل المستقيم الذى معادلته : $3ص = 2س - 5$ هو
 (أ) ٣ (ب) ٢ (ج) -5 (د) $\frac{2}{3}$
- ٢ المستقيم الذى معادلته : $3ص - 3س = 5 + 5 = 0$ يصنع زاوية موجبة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات قياسها
 (أ) 30° (ب) 45° (ج) 60° (د) 90°
- ٣ المستقيم الذى معادلته : $2س - 3ص = 6$ يقطع من محور الصادات جزءاً طوله وحدة طول.
 (أ) -6 (ب) -2 (ج) $\frac{2}{3}$ (د) ٢
- ٤ المستقيم الذى معادلته : $2س + 5ص = 10$ يقطع من محور السينات جزءاً طوله يساوى وحدة طول.
 (أ) $\frac{2}{5}$ (ب) ٢ (ج) $\frac{5}{2}$ (د) ٥
- ٥ معادلة المستقيم الذى يقطع جزءاً طوله ٤ وحدات من الاتجاه الموجب لمحور الصادات ويوازي المستقيم : $3ص = 5 + س$ هى
 (أ) $3ص = 3س + 4$ (ب) $3ص = 4س + 3$
 (ج) $3ص = 3س - 4$ (د) $3ص = 3س + 4$
- ٦ المستقيمان : $3ص = 5 - س$ ، $2ص = 6س + 5$ هما مستقيمان
 (أ) متوازيان. (ب) منطبقان.
 (ج) متقاطعان وغير متعامدين. (د) متعامدان.
- ٧ إذا كان المستقيمان : $3س - 4ص = 3$ ، $4ص + 4س = 8$ متعامدين فإن :
 (أ) -4 (ب) -3 (ج) ٣ (د) ٤
- ٨ إذا كان المستقيمان : $س + 5ص = 5$ ، $4س + 2ص = 0$ متوازيين فإن :
 (أ) -2 (ب) -1 (ج) ١ (د) ٢

٩ إذا كان المستقيم الذي معادلته : $ص = ٤س + ٥$ يوازي محور السينات

(الغريبة ١٨)

فإن : $٤ =$

- (أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

١٠ المستقيمان : $ص = ٩س + ١$ ، $ص = ٥س + ٢$ متعامدان

(سوهاج ١٦ ، الغربية ١٠٨)

فإن : $١ =$

- (أ) ٩×٥ (ب) ٩×١ (ج) ٩×٢ (د) ٥×١

١١ المستقيم المار بالنقطتين (٥ ، ٤) ، (١ ، ٥) عمودي على المستقيم

- (أ) $٤س - ٣ = ص$ (ب) $٥س + ٣ = ص$ (ج) $٤س = ص$ (د) $٢س + ٤ = ص$

١٢ ميل المستقيم الذي معادلته : $ص = ٣س - ٥$ ويمر بالنقطة (٢٠ ، ٥) هو

- (أ) ١- (ب) ١ (ج) ٢- (د) $\frac{1}{3}$

١٣ إذا كان المستقيم الذي معادلته : $ص = ٢ - ٤س$ يوازي المستقيم المار

(أقر الشبلة ٢٠)

بالنقطتين (١ ، ٤) ، (٣ ، ٥) فإن : $٩ =$

- (أ) ٣ (ب) ٢- (ج) ٦ (د) ٤

١٤ مساحة المثلث بالوحدات المربعة المحدد بالمستقيمات : $ص = ٣س - ٤$ ، $ص = ١٢$

(الفيوم ٢٠ ، القليوبية ١٥)

، $ص = ٠$ ، $ص = ٠$ تساوى

- (أ) ٦ (ب) ٧ (ج) ١٢ (د) ٦-

١٥ في الشكل المقابل :

إذا كانت مساحة المثلث ٩ و $٦ = ص$ تساوى
٩ وحدات مربعة فإن معادلة $٦ =$

(المنوفية ١٧)


هي

(أ) $ص = ٢س + ٦$

(ب) $ص = ٦ - ٢س$

(ج) $ص = ٢س - ٦$

(د) $ص = \frac{1}{٢}س - ٦$




١٦ في الشكل المقابل :

إذا كان : أحدهم مربع

معادلة المستقيم ل₁: $\frac{2}{3}x + 1 = y$

، معادلة المستقيم $ل_2$: $ص = ١٤ + ح$

..... = فان : لـ



$$\frac{2}{3} (i)$$

(ب) $\frac{3}{2}$

$$\frac{\gamma}{\gamma_1} \quad (7)$$

$$\frac{r_-}{r_+} \quad (1)$$

٦ أثبت أن : المستقيم المار بالنقطتين : ٤ (٣ ، ١) ، ٥ (١ ، ٢)

(الشرقية ١٧)

يكون موازيًا المستقيم : ٢ - ٣ + ٤ ص - ٣ = ٠

٧ أثبت أن المستقيم الذي معادلته : $2x - y + 8 = 0$

(150/150)

عمودي على المستقيم المار بالنقطتين : ٢ (٣ ، ٢) ، ٣ (- ٢ ، ١)

أوجد معادلتى المستقيمين اللذين يمران بالنقطة (-٣ ، ٢) ويوازيان المحورين.

٩ أوجد قياس الزاوية الموجبة التي يصنعها الخط المستقيم : ٣ - ٢ ص + ٦ = ٠ مع

الاتجاه الموجب لمحور السينات ثم أوجد إحداثي نقطة تقاطعه مع محور الصادات.

١٠ إذا كان المستقيم ل: ٢ - س - ٣ ص - ٦ = صفر يقطع محور السينات عند النقطة ٦

ومحور الصادات عند النقطة ب أوجد :

١ إحدائى النقطتين ؟ ، ب

٢) معادلة الخط المستقيم المار بنقطة منتصف \overline{AB} ويوازي محور الصادات. (الشرقية ١٣)

١١ إذا كان المستقيم الذي يمر بالنقطتين $(2, -1)$ ، $(5, 1)$ يوازي المستقيم الذي معادلته :

« ٢- » (الغريبة ١٨)

٢س + ٣ص + ٥ = ٠ . أوجد قيمة : ١

١٢ إذا كان المستقيم المار بالنقطتين $(2, 5)$ ، $(6, -3)$ عمودياً على المستقيم الذى معادلته :

“ ”

٥ ص - ٢ - ٣ = . فأوجد قيمة : ١

١٣ إذا كانت : $P(2, -3)$ ، $B(0, 5)$ فأوجد قيمة α إذا كان المستقيم \overleftrightarrow{AB} يوازي المستقيم $l : 3x - 4y + 1 = 0$.

١٤ إذا كان المستقيم : $\alpha - (2 - 1)y = 7$ ، المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها 45° متوازيين فأوجد قيمة α (الشرقية ١٦)

١٥ أوجد معادلة محور تماثل القطعة المستقيمة \overline{AB} حيث $B(3, -2)$ ، $A(0, -6)$ (بورسعيد ١٤ ، الدقهلية ١٢)

١٦ $P(0, -6)$ ، $B(3, 7)$ ، $C(1, -3)$ ، فأوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة P وينقطة منتصف \overline{BC} (الفيوم ٢٠ ، بورسعيد ١٩)

١٧ A مثلث رؤوسه النقط $A(0, 6)$ ، $B(5, -1)$ ، $C(-2, 1)$ ، فأوجد معادلة المستقيم الذي يمر بالرأس A وعمودياً على \overline{BC}

١٨ A مثلث فيه : $P(1, 2)$ ، $B(0, -2)$ ، $C(3, 4)$ ، D منتصف \overline{AB} ، رسم $DE \parallel \overline{BC}$ ويقطع \overline{AC} في H ، أوجد :
١ طول DE ٢ معادلة المستقيم DE (مطروح ١٨ ، الإسكندرية ١٥)

١٩ A مثلث مربع فيه : $A(0, 4)$ ، $B(-1, 6)$ فأوجد معادلة : \overleftrightarrow{BC} (المنوفية ١٥)

٢٠ A مثلث معين ، M نقطة تقاطع قطريه حيث : $P(1, 3)$ ، $C(6, 0)$ ، أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطتين B ، D (أسوان ٠٩)


٢١ أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطتين : $P(2, 3)$ ، $B(-1, -3)$ ، ثم بين أنه لأي نقطة $C(2 + 1, 1 + 4)$ فإن : $\overleftrightarrow{AC} \perp \overleftrightarrow{BP}$ (الدقهلية ١٤)

٢٢ ارسم الخط المستقيم في كل من الحالات الآتية :

- ١ ميله يساوي $\frac{1}{3}$ ويقطع جزءاً من الاتجاه الموجب لمحور الصادات يساوي وحدة واحدة.
- ٢ ميله يساوي ٢ ويقطع جزءاً من الاتجاه السالب لمحور الصادات يساوي ٣ وحدات.
- ٣ يقطع من الجزءين الموجبين للمحورين السيني والصادي جزءين طولاهما ٢ ، ٣ من الوحدات على الترتيب.

مستقيم معادلته : ص - ٢ س - ٣ = ٠

أوجد ميله وطول الجزء المقطوع من محور الصادات وارسم هذا المستقيم. (حلوا ١١)



من الشكل المقابل أوجد :

١ ميل الخط المستقيم (م)

٢ طول الجزء المقطوع من

محور الصادات ح

٣ معادلة الخط المستقيم

بمعلومية م ، ح

٤ طول الجزء المقطوع من

محور السينات.

٥ مساحة المثلث المحدد بالخط

المستقيم والجزئين المقطوعين من محوري الإحداثيات.

الجدول المقابل يمثل علاقة خطية :


| | | | |
|---|---|---|-----------|
| ٣ | ٢ | ١ | س |
| ٤ | ٣ | ١ | ص = د (س) |

(الإسكندرية ١٥، القليوبية ١٣)

١ أوجد معادلة الخط المستقيم.

٢ أوجد طول الجزء المقطوع من محور الصادات.

٣ أوجد قيمة ٢



(الدقهلية ١٩)

الشكل المقابل يمثل المستقيم \overleftrightarrow{AB}

الذي معادلته ص = ٢ س + ح

ويقطع من محوري الإحداثيات جزءين متساويين

في الطول ويمر بالنقطة (٢، ٣) أوجد :

١ قيمة ح ، ح


٢ مساحة المثلث $\triangle AOB$ و

في الشكل المقابل :

$\triangle AOB$ و مثلث متساوي الأضلاع

ح منتصف \overline{AB}

أوجد معادلة \overleftrightarrow{OC}



(الجيزة ٢٠)


٢٨ في الشكل المقابل :

النقط ٢ (٦، ٢) و (٠، ٠) و (٢، ٦) و ٤ (٢، ٢)

هي رؤوس معين


أوجد :

١ إحداثي النقطة ٤

٢ معادلة المستقيم \overleftrightarrow{OS} ٣ \overleftrightarrow{OS} و $\overleftrightarrow{OS'}$ و $\overleftrightarrow{OS''}$ 

(الشرقية ١٤)

٢٩ في الشكل المقابل :

إذا كان : $\overleftrightarrow{L_1} \perp \overleftrightarrow{L_2}$ ، ومعادلة $\overleftrightarrow{L_1}$: $2x - y + 2 = 0$ أوجد معادلة المستقيم $\overleftrightarrow{L_2}$ 


٣٠ في الشكل المقابل :

١ \overleftrightarrow{AB} يقطع محور الصادات في النقطة ٢ (٨، ٠)

ويقطع محور السينات في النقطة ٣

فإذا كان : $\overleftrightarrow{PA} \perp \overleftrightarrow{AB}$ و \overleftrightarrow{PA} أوجد :١ أولاً : \overleftrightarrow{AB} و \overleftrightarrow{PA}

ثانياً : إحداثي النقطة ٣

٢ أولاً : ميل المستقيم \overleftrightarrow{AB} ثانياً : معادلة المستقيم المار بالنقطة ٢ و \overleftrightarrow{AB} وعمودياً على \overleftrightarrow{AB} 

(الشرقية ١٣)

في الشكل المقابل :

النقطة ح منتصف \overline{AB} حيث : ح (٣ ، ٤)

١ أوجد إحداثي كل من : و ، أ ، ب


٢ أوجد طول كل من : \overline{WA} ، \overline{WB}

، \overline{HA} ، \overline{HB} ، \overline{HO}

٣ أوجد ميل كل من :

\overline{AB} ، \overline{WA} ، \overline{WB} ، \overline{HA} ، \overline{HB}

٤ أوجد معادلة كل من : \overline{AB} ، \overline{HO}




في الشكل المقابل :

المستقيم \overleftrightarrow{AB} يمر بالنقطتين ح (١ ، ٣) ، و (٣ ، ٤)

ويقطع محوري الإحداثيات في أ ، ب على الترتيب.

أوجد طول كل من : \overline{WA} ، \overline{WB}

حيث و نقطة الأصل.



في الشكل المقابل :

«و» هي نقطة الأصل


أ ، ب ، و \exists محور السينات ،

ميل $\overline{AB} = \sqrt{3}$ ، معادلة \overline{AB} هي : $y - x = 2$


١ أوجد : ميل \overline{AB} ، طول \overline{WA}

٢ أوجد : و (د ح ب) ، و (د ح أ)

٣ استنتج : و (د أ ح)



(الشرقية ١٦)




٣٤ في الشكل المقابل :

١ ب ح د مربع ، \exists المستقيم ل

ح (٢ ، ٥) ،

أوجد معادلة المستقيم ل



٣٥ في الشكل المقابل :

١ ب ح د مربع ، و \exists ل

أوجد معادلة المستقيم و ح

٣٦ في الشكل المقابل :

١ ، ل ، مستقيمان متوازيان

، ل يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات

زاوية قياسها 45° ويمر بنقطة الأصل و

، \exists ل حيث \exists (١ ، ٥) ، \exists ل \perp ل


، ل يقطع محور الصادات

في النقطة ح

أوجد : ١ معادلة المستقيم ل

٢ معادلة المستقيم ل


٣ طول ل



(الشريحة ١٥)

تطبيقات حياتية

الشكل المقابل يمثل حركة جسيم



يتحرك بسرعة منتظمة (ع) حيث

المسافة (ف) مقيسة بالمتر

والزمن (ت) بالثانية.


أوجد : ١ المسافة عند بدء الحركة.

٢ سرعة الجسيم.

٣ معادلة الخط المستقيم الممثل لحركة الجسيم.

٤ المسافة المقطوعة بعد ٤ ثوان من بدء الحركة.

٥ الزمن الذي يقطع فيه الجسيم مسافة ٣,٥ من المتر من بدء الحركة.



الشكل المقابل يمثل العلاقة بين

المسافة (ف) التي تقطعها سيارة

بالكيلو متر والزمن (بالساعة)

الذي قطعت فيه هذه المسافة. أوجد :

١ المسافة المقطوعة بعد ٩٠ دقيقة.

٢ الزمن الذي قطعت فيه السيارة

١٥٠ كيلو متراً.

٣ سرعة السيارة.

٤ معادلة الخط المستقيم الذي يمثل العلاقة بين المسافة والزمن.

الشكل المقابل يمثل العلاقة

بين المسافة (ف) بالكيلو مترات والزمن (ن) بالدقائق لجسمين ١، ٢ في طرفي طريق مستقيم واحد يتحركان في اتجاهين متعاكسين.

١ هل بدأ ١، ٢ الحركة


في توقيت واحد ؟

٢ بعد كم دقيقة التقى ١، ٢ ؟

٣ ما سرعة ١ ؟

٤ اكتب معادلة الخط

المستقيم الذي يمثل العلاقة بين المسافة والزمن لحركة الجسم ٢




للمتفوقين




٤٠ في الشكل المقابل :

إذا كانت مساحة المربع ١ ب ح د = ٢٥ وحدة مربعة
أوجد : معادلة ح و



٤١ في الشكل المقابل :

أوجد : معادلة ح و



ملخص الوحدة الخامسة



إذا كانت : $(ص_1, ح_1)$ ، $(ص_2, ح_2)$ فإن :

$$\text{طول } \overline{AB} = \sqrt{(\text{فرق السينات})^2 + (\text{فرق الصادات})^2} = \sqrt{(ص_2 - ص_1)^2 + (ح_2 - ح_1)^2}$$

$$\text{نقطة منتصف } \overline{AB} = \left(\frac{ص_1 + ص_2}{2}, \frac{ح_1 + ح_2}{2} \right)$$

$$\text{ميل } \overline{AB} = \frac{ص_2 - ص_1}{ح_2 - ح_1} = \text{طام}$$

(حيث طام قياس الزاوية الموجبة التي يصنعها \overline{AB} مع الاتجاه الموجب لمحور السينات)

إذا كان : $ل_1$ ، $ل_2$ مستقيمين ميلاهما $م_1$ ، $م_2$ على الترتيب فإن :

$ل_1 // ل_2$ إذا كان : $م_1 = م_2$ والعكس صحيح.

$ل_1 \perp ل_2$ إذا كان : $م_1 \times م_2 = -1$ والعكس صحيح.

إذا كانت معادلة الخط المستقيم على الصورة : $ص = م ح + ح$ فإن :

• ميل الخط المستقيم = $م$

• طول الجزء المقطوع من محور الصادات بالمستقيم = $|ح|$ والمستقيم يمر بالنقطة $(0, ح)$

إذا كانت معادلة الخط المستقيم على الصورة : $ص = م ح + ح$ فإن :

$$\text{ميل الخط المستقيم} = \frac{-\text{معامل } ح}{\text{معامل } ص} = \frac{-ح}{ص}$$

• طول الجزء المقطوع من محور الصادات بالمستقيم = $|\frac{-ح}{ص}|$

والمستقيم يمر بالنقطة $(\frac{-ح}{ص}, 0)$

معادلة المستقيم الذي يمر بنقطة الأصل و $(0, 0)$ هي : $ص = م ح$ حيث $م$ الميل.

معادلة محور السينات هي $ص = 0$



امتحانات على الوحدة الخامسة

النموذج الأول

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ بُعد النقطة $(-7, 3)$ عن محور الصادات يساوي وحدة طول.

- (أ) -7 (ب) -3 (ج) 7 (د) 3

٢ النقطة $(0, 4)$ تنصف البعد بين النقطتين $(-1, -1)$ ، $(س, س)$ ،

فإن النقطة $(س, س)$ هي

- (أ) $(1, 9)$ (ب) $(-1, 9)$ (ج) $(-\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$ (د) $(-1, 3)$

٣ مستقيمان متعامدان ميل أحدهما $\frac{1}{4}$ وميل الآخر 4 فإن : $4 =$

- (أ) 1 (ب) 4 (ج) -4 (د) $\frac{1}{4}$

٤ ميل المستقيم : $س - 5 = 0$ صفر هو


- (أ) 5 (ب) $\frac{1}{5}$ (ج) غير معرف. (د) صفر

٥ في الشكل المقابل :

ح $(3, 4)$ منتصف \overline{AB}

فإن : $9 =$ وحدة طول.

- (أ) 3 (ب) 4 (ج) 6 (د) 8



٦ إذا كان المستقيم المار بالنقطتين $(س, -1)$ ، $(4, 2)$ يوازي المستقيم المار بالنقطتين

$(3, -2)$ ، $(4, 4)$ فإن : $س =$

- (أ) -3 (ب) 2 (ج) 7 (د) 1

(أ) أ ب ح د شكل رباعي حيث أ (٣، ١-) ، ب (١، ٥) ، ح (٧، ٤) ، د (١، ٦) أثبت أن : الشكل أ ب ح د متوازي أضلاع.

(ب) أوجد معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة (٣، ٤) عمودياً على المستقيم :

$$٥س - ٢ص = ٧$$

(أ) إذا كانت النقطة أ (٥، ٢) تقع على الدائرة التي مركزها م (١، ١-) فأوجد :

١ مساحة الدائرة بدلالة π

٢ معادلة المستقيم المار بالنقطتين أ ، م


(ب) إذا كانت النقط أ (٣، ٢) ، ب (٤، ٣-) ، ح (١-، ٢-) ، د (٣، ٢-) هي رؤوس معين أوجد إحداثي نقطة تقاطع القطرين وأوجد مساحة سطحه.

(أ) إذا كان بعد النقطة (س، ٥) عن النقطة (٦، ١) يساوي $٢\sqrt{٥}$ وحدة طول فما قيمة س ؟

(ب) أثبت أن : النقط أ (٣، ٠) ، ب (٣، ٤) ، ح (١، ٦-) هي رؤوس مثلث متساوي الساقين رأسه أ

، ثم أوجد طول القطعة المستقيمة المرسومة من أ عمودية على ب ح

(أ) أوجد معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطتين : (٦، ١٣) ، (٣، ٧)



(ب) في الشكل المقابل :

المستقيم أ ب يقطع من المحور السيني

جزءاً طوله ٣ وحدات طول

$$٤٥^\circ = (د أ ب و)$$

أوجد : معادلة المستقيم أ ب

النموذج الثاني

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان \vec{a} و \vec{b} جزء مستطيل فيه : $\vec{a} = (-1, 4)$ ، $\vec{b} = (4, 5)$

فإن : طول $\vec{a} + \vec{b} = \dots\dots\dots$ وحدة طول.

(أ) 10 (ب) 6 (ج) 5 (د) 4

٢ إذا كانت : $(4, -3)$ منتصف \vec{AB} حيث $\vec{A} = (3, -4)$ فإن : \vec{B} هي

(أ) $(5, -2)$ (ب) $(2, 5)$ (ج) $(5, 2)$ (د) $(5, 3, -5)$

٣ إذا كان المستقيمان : $3 - 2x - 4y = 0$.

، $8 - 3x + 2y = 0$ متعامدين فإن : $\vec{a} = \dots\dots\dots$

(أ) -4 (ب) -2 (ج) 3 (د) 4

٤ المستقيم الذي معادلته : $2x - 3y - 6 = 0$ يقطع من محور الصادات جزءاً


طوله وحدة طول.

(أ) -6 (ب) -2 (ج) $\frac{2}{3}$ (د) 2

٥ معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة $(2, -3)$ ويوازي محور السينات هي

(أ) $2 = x$ (ب) $-3 = y$ (ج) $-2 = x$ (د) $3 = y$

٦ في الشكل المقابل :



أى مما يأتى يمثل معادلة المستقيم ل ؟

(أ) $x = 2$


(ب) $x = 2$

(ج) $x + y = 2$

(د) $x - y = 2$

(أ) إذا كان P AB حى مربع حيث $P(2, 4)$ ، $B(-3, 2)$ ، $A(-7, 0)$

أوجد : ١ إيجادى النقطة Q مساحة المربع $ABPQ$



(ب) فى الشكل المقابل :

المستقيم AB يوازي محور الصادات

، المستقيم BC معادلته $y = -x + 3$

، النقطة $P(2, 1)$ أوجد :

١ طول AB

٢ مساحة الشكل $ABPQ$


٣ Q (د و ح)

(أ) أثبت أن : النقط $P(-2, 5)$ ، $B(3, 3)$ ، $A(-4, 2)$ ليست على

استقامة واحدة.

(ب) إذا كانت : $P(3, 3)$ ، $B(2, 3)$ ، $A(1, 5)$ وكانت $AB = AC$

فأوجد قيمة : x



(أ) فى الشكل المقابل :

فى المستوى الأحداثى المتعامد رسم المثلث ABC

أثبت أن :

$\triangle ABC$ قائم الزاوية وأوجد مساحته.

(ب) AB AC مثلث فيه : $P(2, 1)$ ، $B(-5, 2)$ ، $A(3, 4)$

أوجد معادلة الخط المستقيم المار بالنقطة P وعمودياً على AB

(أ) AB AC شكل رباعى فيه : $P(6, 0)$ ، $B(-1, 3)$ ، $A(5, 1)$

، $C(6, 4)$ أثبت باستخدام الميل أن الشكل $ABPQ$ مستطيل.

(ب) إذا كان محور تماثل AB يمر بالنقطة $P(6, 4)$ حيث $A(3, 1)$ ، $B(-3, 7)$

فأوجد : قيمة m

أهداف المشروع

- إيجاد البعد بين نقطتين فى المستوى الإحداثى المتعامد.
- إيجاد إحداثى منتصف قطعة مستقيمة.
- حساب محيط ومساحة المثلث.
- إيجاد ميل الخط المستقيم.
- الربط بين الهندسة والتاريخ.

المطلوب

« الهندسة التحليلية هى أحد فروع الرياضيات التى تستخدم نظام الإحداثيات فى دراسة الهندسة »

فى ضوء ذلك قم بإعداد مشروع بحثى يتضمن ما يلى :

- اكتب نبذة عن العالم رينيه ديكارت الذى نُسب إليه نظام الإحداثيات الديكارتية، وإنجازاته فى مجال الرياضيات.
- على ورقة رسم بيانى ارسم محورى الإحداثيات.
- حدد على الشبكة البيانية ثلاثة نقاط تمثل رؤوس مثلث متساوى الساقين ، ثم أوجد :
 - ١ محيط المثلث.
 - ٢ مساحة المثلث.
 - ٣ ميل كل ضلع من أضلاع المثلث.
 - ٤ معادلة الخط المستقيم الذى يحمل كل ضلع من أضلاع المثلث.



مفاهيم ومهارات أساسية تراكمية

فتر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ عدد أقطار الشكل السداسى يساوى (قنا ٢٠، الأقصر ١٦)

- (أ) ٦ (ب) ٣ (ج) ١٢ (د) ٩

٢ زاويتا القاعدة فى المثلث المتساوى الساقين (الإسكندرية ١٦، ج. سيناء ١٧، ش. سيناء ١٧)

(أ) متطابقتان. (ب) متكاملتان.

(ج) متقابلتان بالرأس. (د) متناظرتان.


٣ قياس الزاوية الخارجة عند رأس من رؤوس مثلث متساوى الأضلاع يساوى

(القاهرة ٢٠، كفر الشيخ ١٩، بني سويف ١٨، الإسكندرية ١٧)

- (أ) 60° (ب) 150° (ج) 120° (د) 30°

٤ عدد محاور التماثل فى المثلث المتساوى الساقين يساوى (الإسكندرية ١٨، مطروح ١٧)

- (أ) ٠ (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣



٥ فى الشكل المقابل :

إذا كان : $\angle \text{د} = 90^\circ$ ، $\angle \text{أ} = 60^\circ$ ،

، $\overline{\text{س}}$ متوسط

فإن : $\angle \text{د} = \text{س} = \dots\dots\dots$

- (أ) 20° (ب) 30° (ج) 60° (د) 40°

٦ المثلث الذى أطوال أضلاعه ٥ سم ، ٥ سم ، سم

مثلث متساوى الساقين.

(أ) ٩ (ب) ١٠ (ج) ١١ (د) ١٢

٧ مثلث أطوال أضلاعه ٥ سم ، ١٢ سم ، ١٣ سم تكون مساحته = سم^٢ (مطروحة ١٨٤)

(أ) ٣٠ (ب) ٣٢,٥ (ج) ٧٨ (د) ١٤٤

٨ مجموع طولى أى ضلعين فى المثلث طول الضلع الثالث. (المطوية ١٩، الفيوم ١٨)

(أ) أكبر من (ب) أصغر من (ج) يساوى (د) ضعف

٩ نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم المتوسط بنسبة من جهة القاعدة. (الفيوم ١٨)

(أ) ٣ : ١ (ب) ٢ : ١ (ج) ٣ : ١ (د) ٢ : ١

١٠ مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوى (الفيوم ١٩، أسبوط ١٨)

(أ) ٩٠° (ب) ١٨٠° (ج) ٢٧٠° (د) ٣٦٠°

١١ إذا كان $\angle A$ حاداً مربعاً فإن $\angle B$ (د ح ب) = (البجيرة ١٨، الإستدريية ١٧)

(أ) ٩٠° (ب) ٤٥° (ج) ٦٠° (د) ٣٠°

١٢ معين طولاً قطريه ٦ سم ، ١٠ سم تكون مساحته سم^٢ (نهر الشبلة ١٧)

(أ) ٣٠ (ب) ٦٠ (ج) ١٥ (د) ١٠

١٣ صورة النقطة (٤- ، ٥) بالانتقال (٢- ، ٣-) هى (نهر الشبلة ١٧)

(أ) (٢- ، ٢-) (ب) (٢- ، ٢) (ج) (٢ ، ٢) (د) (٢- ، ٢-)

١٤ صورة النقطة (٢- ، ٥) بالانعكاس فى محور السينات هى (الإسماعيلية ١٦)

(أ) (٢- ، ٥-) (ب) (٢ ، ٥) (ج) (٢- ، ٥-) (د) (٢- ، ٥)

١٥ الشكل الرباعى الذى قطراه متساويان فى الطول ومتعامدان هو (بنى سويف ٢٠)

(أ) المربع. (ب) المعين. (ج) المستطيل. (د) متوازى الأضلاع.

١٦ حجم متوازي المستطيلات الذي أبعاده $2\sqrt{2}$ ، $3\sqrt{2}$ ، $6\sqrt{2}$

من السنتيمترات يساوى سم^٣ (ج. سيناء ١٦)

(أ) $6\sqrt{2}$ (ب) $6\sqrt{3}$ (ج) $2\sqrt{3}$ (د) ٦

١٧ إذا كان ٣، ٧، ل أطوال أضلاع مثلث فإن ل يمكن أن تساوى (سوهاج ٢٠)

(أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٧ (د) ١٠

١٨ ΔABC حفيه : $C = (د) = 3$ و $(د) = 90^\circ$ فإن : $C = (د) =$ (أسوان ١٦)

(أ) 30° (ب) 45° (ج) 60° (د) 90°

١٩ فى ΔABC إذا كان : $C = (د) < C = (د)$ فإن (السويس ١٦)

(أ) $C = A - B > 0$ (ب) $C = A - B \geq 0$

(ج) $C = B \geq A$ (د) $C = A - B < 0$

٢٠ محيط الدائرة التى طول قطرها ١٤ سم يساوى سم. $(\frac{22}{7} = \pi)$ (الفيوم ١٧)

(أ) ٧ (ب) ٢٢ (ج) ٤٤ (د) ١٤

٢١ إذا كان : $C = (د) = C = (د)$ ، $C = (د)$ ، $C = (د)$ متتامتين

فإن : $C = (د) =$ (ش. سيناء ١٧)

(أ) 90° (ب) 60° (ج) 45° (د) 30°

٢٢ إذا كان : $C = (د)$ محور تماثل $A = (د)$ فإن : $C = (د) =$ (السويس ٢٠)

(أ) $C < A$ (ب) $C > A$ (ج) $C = A$ (د) $C \perp A$

٢٣ ΔABC متوازي أضلاع فيه : $C = (د) + C = (د) = 200^\circ$

فإن : $C = (د) =$ (السويس ١٩، الإسكندرية ١٨، الإسماعيلية ١٧)


(أ) 50° (ب) 80° (ج) 100° (د) 160°

٢٤ إذا كان : ΔABC متوازي أضلاع فإن : $C = (د) + C = (د) =$ (السويس ١٨)

(أ) $C = 2A$ (ب) $C = 2B$ (ج) $C = 2C$ (د) $C = 2D$

٢٥ إذا كان : $l_1 \parallel l_2$ ، $l_2 \perp l_3$ ، $l_1 \perp l_4$ ، فإن : (البجيرة ١٧)

(أ) $l_3 \parallel l_4$ (ب) $l_1 \parallel l_4$ (ج) $l_3 \parallel l_4$ (د) $l_1 \perp l_4$



(الوادي الجديد ١٦)


(ب) ٦

(د) ٨

(أ) ٥

(ج) ٧

٢٦ عدد المثلثات الموجودة في الشكل المقابل
يساوى مثلثات.



(الأقصى ١٧)

(ب) ٣


(د) ٥

(أ) ٢

(ج) ٤

٢٧ في الشكل المقابل :

عدد أشباه المنحرف يساوى



٢٨ في الشكل المقابل :

أ ب قطر في دائرة

فإن مساحة الشكل المظلل تساوى سم^٢ (السويس ١٦)

(ب) $\pi ١٦$

(د) $\pi ٩$

(أ) $\pi ٤$

(ج) $\pi ٢$

٢٩ في الشكل المقابل :

أ ب ح مثلث قائم الزاوية في ب

ما هي مساحة نصف الدائرة التي

تقع على الوتر أ ح إذا كانت مساحتا

نصفى الدائرتين الذين يقعان على الضلعين أ ب ، ب ح

هما ٣٦ ، ٦٤ وحدة مربعة ؟


(أ) ٨٠ وحدة مربعة.

(ج) ١٠٠ وحدة مربعة.

(ب) ٩٦ وحدة مربعة.

(د) ١٢٠ وحدة مربعة.

٢٠ في الشكل المقابل :



عدد المثلثات القائمة المظللة التي تلزم لتغطية سطح المستطيل تمامًا يساوي


(ب) ٦

(أ) ٤

(د) ١٢

(ج) ٨

٢١ في الشكل المقابل :



إذا كانت $م : هـ = ١ : ٢$

فإن النسبة بين مساحة المثلث ب هـ

إلى مساحة المستطيل أ ب ح د هي


(د) ٥ : ٢

(ج) ٣ : ٢

(ب) ٣ : ١

(أ) ٢ : ١

٢٢ في الشكل المقابل :



(أسوان ١٨)

محيط الشكل يساوي سم


(ب) ٢٢

(أ) ١٧

(د) ٣٤

(ج) ٢٩

٢٣ في الشكل المقابل :



مستطيل به دائرتان م ، ن

طول نصف قطر كل منهما ٦ سم

فإن مساحة المستطيل تساوي سم^٢

(د) ١٤٤

(ج) ٢١٦

(ب) ٢٥٢

(أ) ٢٨٨


٢٤ الشكل المقابل يمثل ربع دائرة طول نصف قطرها ٢ سم

فإن محيط الشكل يساوي سم.

(ب) $\pi ٥$

(أ) $\pi ٢$

(د) $\pi ٤ + ٤$



(الجيزة ١٩)

٣٥ في الشكل المقابل :

إذا قُسمت القاعدة في متوازي الأضلاع
بنسبة ١ : ٣ فإن نسبة مساحة المثلث المظلل
إلى مساحة متوازي الأضلاع هي

- (أ) ١ : ٣ (ب) ١ : ٦ (ج) ١ : ٨ (د) ١ : ٩

٣٦ في الشكل المقابل :

محيط الشكل يساوي سم.

(أ) ٤٤

(ج) ٢٤

(ب) ٣٤

(د) ١٤

٣٧ في الشكل المقابل :

إذا كان : $\Delta ABC \sim \Delta EHO$ و

$EO = ٣$ سم ،

فإن : $HO =$ سم.

(أ) ٣

(ب) ٩

(ج) ٤

(د) ٦

٣٨ في الشكل المقابل :

إذا كان طول ضلع المربع = ١٠ سم

فإن : مساحة الدائرة = سم^٢

(أ) ١٠٠π

(ب) ٢٥π

(ج) ٥٠π

(د) ٤٠π

٣٩ في الشكل المقابل :

إذا كان : $\vec{AB} \parallel \vec{HO}$ ، $\vec{BC} \parallel \vec{HO}$ ، $\angle C = ٩٠^\circ$

فإن : $\angle S + \angle V =$

(أ) ٩٠°

(ج) ٢٧٠°

(ب) ١٨٠°

(د) ٣٦٠°

المجاهد

2022

إعداد نخبة من خبراء التعليم

كراسة التقويم المستمر

- اختبارات تراكمية
- ملخص الوحدات
- الأسئلة الهامة
- امتحانات نهائية

في الثالث
الإعدادي

الفصل الدراسي الأول

الرياضيات

محتويات الكراسة

أولاً الجبر والإحصاء



• الاختبارات التراكمية (عدد ٩ اختبارات)

• الأسئلة الهامة في الجبر والإحصاء.

• الامتحانات النهائية :

- نماذج امتحانات الكتاب المدرسي

(عدد ٢ نموذج + نموذج للطلاب المدمجين)

- امتحانات بعض المحافظات (عدد ٢٠ امتحاناً)

ثانياً حساب المثلثات والهندسة



• الاختبارات التراكمية (عدد ٦ اختبارات)

• الأسئلة الهامة في حساب المثلثات والهندسة.

• الامتحانات النهائية :

- نماذج امتحانات الكتاب المدرسي

(عدد ٢ نموذج + نموذج للطلاب المدمجين)

- امتحانات بعض المحافظات (عدد ٢٠ امتحاناً)

مجموعة من امتحانات الرياضيات بالامتحانات المجمعّة من العام الماضي.

أولاً

الجبر والإحصاء

٥ • الاختبارات التراكمية (عدد ٩ اختبارات)


١٦ • الأسئلة الهامة في الجبر والإحصاء

٣٥ • الامتحانات النهائية :

- نماذج امتحانات الكتاب المدرسي

(عدد ٢ نموذج + نموذج للطلاب المدمجين)


- امتحانات بعض المحافظات (عدد ٢٠ امتحاناً)



الاختبارات التراكمية

في الجبر والإحصاء

من امتحانات المحافظات



١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت النقطة (س ، ٧) تقع على محور الصادات فإن : $٥ س + ١ = \dots$ (بور سعيد ١٧)
 (أ) صفر (ب) ١ (ج) ٥ (د) ٦

٢ إذا كانت : $س \in ح$ فإن النقطة (س ، $\sqrt{س}$) تقع في الربع (المنوفية ٢٠)
 (أ) الأول (ب) الثاني (ج) الثالث (د) الرابع

٣ إذا كانت : $س = (س^٢)$ ، $٤ = س(س \times ص) = ٦$ فإن : $س(ص) = \dots$ (جنوب سيناء ١٧)
 (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٦

٤ إذا كان : $(٥ ، ٣) \in \{٦ ، ٣\} \times \{٨ ، م\}$ فإن : $م = \dots$ (كفر الشيخ ١٨)
 (أ) ٣ (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ٨

٥ إذا كان : $(٢٧ ، س) = (٢٢ ، ص)$ فإن : $\frac{س}{ص} = \dots$ (الغربية ١٧)
 (أ) $\frac{٢}{٥}$ (ب) $\frac{٥}{٣}$ (ج) $\frac{٣٢}{٢٧}$ (د) $\frac{٢٧}{٣٢}$

٦ إذا كانت النقطة (س - ٢ ، ٣ - س) تقع في الربع الرابع فإن : $س = \dots$ (الدقهلية ٢٠)
 (أ) ٤ (ب) ٣ (ج) ٢ (د) ١

٧ إذا كانت : $س = \{١\}$ ، $ص = \{٣\}$ فإن : $س(ص \times ص) = \dots$ (أسيوط ١٩)
 (أ) $\{(٣ ، ١)\}$ (ب) $\{(١ ، ٣)\}$ (ج) ٣ (د) ١

٨ إذا كان طول نصف قطر كرة ٣ سم فإن حجمها يساوي سم^٣ (الجيزة ١٩)
 (أ) $\pi ٤$ (ب) $\pi ٣٦$ (ج) ٣٦ (د) $\pi ٢٧$

٢ إذا كانت : $س = \{٢\}$ ، $ص = \{٢ ، ٤ ، ٥\}$ أوجد : (القاهرة ٢٠)
 ١ $س \times ص$ ٢ $س(ص)$ ٣ $س^٢$

٣ إذا كان : $(س - ١ ، ٢٩) = (٤ ، ص + ٢)$ أوجد قيمة : $س + ٢ ص$ (البحر الأحمر ١٧)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان بيان العلاقة \mathcal{E} هو $\{(٥, ٢), (٣, ١), (٣, ٤)\}$

(القليوبية ١٧)

فإن : \mathcal{E} تمثل دالة مداها

(ب) $\{٥, ٣, ٢, ١, ٤\}$

(١) $\{٢, ١, ٤\}$

(د) ط

(ج) $\{٥, ٣\}$

(القليوبية ٢٠)

٢ إذا كانت : $\mathcal{S} = \{٢\}$ فإن : $\mathcal{S}^٢ = \dots\dots\dots$

(د) $\{(٢, ٢)\}$

(ج) $(٢, ٢)$

(ب) $\{٤\}$

(١) ٤

(المنوفية ١٨)

٣ إذا كانت : $\mathcal{S} = \{٢, ١\}$ ، $\mathcal{V} = \{٦, ٥\}$ فإن : $\exists (١, ٥) \dots\dots\dots$

(د) $\mathcal{V}^٢$

(ج) $\mathcal{S} \times \mathcal{V}$

(ب) $\mathcal{S}^٢$

(١) $\mathcal{V} \times \mathcal{S}$

(فنا ٢٠)

٤ الزوج المرتب $(\mathcal{S}^٢, \mathcal{V}^٢)$ حيث : $\mathcal{S} \neq \emptyset$ ، $\mathcal{V} \neq \emptyset$ يقع فى الربع

(د) الرابع.

(ج) الثالث.

(ب) الثانى.

(١) الأول.

(كفر الشيخ ١٨)

٥ إذا كان : $\mathcal{A} + \mathcal{B} = \mathcal{C} = \mathcal{D}$ فإن : $\mathcal{A}^٢ + \mathcal{B}^٢ = \dots\dots\dots$

(د) ١٠

(ج) ١٥


(ب) ٢٠

(١) ٢٥


٦ إذا كانت : $\mathcal{S} = \{٢, ١\}$ فإن المخطط السهمى الذى يمثل دالة على \mathcal{S}

(الأقصر ١٧)


هو




(د)



(ج)



(ب)



(١)

٧ إذا كانت : $\mathcal{S} = \{٥, ٣, ١\}$ ، \mathcal{E} دالة على \mathcal{S} ، بيان $\mathcal{E} = \{(٥, ١), (١, ٣), (٣, ٢)\}$

(الدقهلية ١٨)

فإن : $\mathcal{A} + \mathcal{B} = \dots\dots\dots$

(د) ٢





(ج) ٨

(ب) ٦

(١) ٤

(بور سعيد ١٧)

٨ أي من العلاقات التالية تمثل دالة من س إلى ص؟



(الشرقية ١٨)

٢ إذا كانت : س = {١، ٢، ٣، ٤} ، ص = {٢، ٣} ، ع = {٧، ٢} ، فاوجد :

٢. (س - ص) × ع

١. (س ∩ ص) × ع

٣ إذا كانت : س = {١/٣، ١، صفر، ١/٣، ١} ، ص = {١، ٢، صفر، ١-، ٢-} ، وكانت ع علاقة من س إلى ص حيث «ع» تعني «العدد ١ هو المعكوس الضربي للعدد ب» لكل

١ ∃ س ، ب ∃ ص اكتب بيان ع ومثلها بمخطط سهمي ، وبين هل ع دالة أم لا ، ولماذا ؟ (الشرقية ١٩)

١ آخر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(١) الدالة د : د (س) = س^٢ - (س - ٣)^٢ من الدرجة (الدولية ٢٠)

(أ) صفر (ب) الأولى (ج) الثانية (د) الثالثة

(٢) الدوال الآتية دوال كثيرات حدود من الدرجة الأولى ما عدا د : د (س) = (الإحصائية ١٨)

(أ) $\frac{2}{3}س + ٢$ (ب) $٢\sqrt{س} + ١$ (ج) $س + (س + ٥)$ (د) $س(١ + \frac{1}{س})$

(٣) إذا كانت : د (س) = س^٢ - ١ فإن : س ∃ (المقوية ١٨)

(أ) ع (ب) ع - {٣} (ج) ع - {٤} (د) ع - {١}

(٤) إذا كانت د : د (س) = (س - ٢)س^٢ + ٣س^٢ + س + ٢ كثيرة حدود من الدرجة الثانية

فإن : ٢ = (الشرقية ١٩)

(أ) صفر (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ١

(٥) إذا كانت : د (س) = (٥ - س، ٧ - س) تقع على محور السينات فإن : س = (الإسكندرية ١٨)

(أ) ٢ (ب) ٥ (ج) ٧ (د) ١٢

(٦) الدالة د : د ← ع حيث : د (س) = س(٢س^٢ + ٥س) كثيرة حدود

من الدرجة (البحر الأحمر ١٦)

(أ) الأولى (ب) الثانية (ج) الثالثة (د) الرابعة

(٧) إذا كانت الدالة د : س ← ص فإن مدى الدالة د ∩ (القاهرة ١٧)

(أ) س × ص (ب) س (ج) ص × س (د) ص

(٨) إذا كانت : س = {٣} ، د (ص) = ٥ ، فإن : د (س × ص) = (القاهرة ١٩)

(أ) ١ (ب) ٥ (ج) ٨ (د) ١٥

(٩) إذا كانت : س = {٣، ٥، ٧} ، ص = {س : س ∃ ط ، ٨ > س > ٢٠}

وكانت الدالة د من س ← ص بيانها كالتالي د = {(٢١، ٧)، (١٥، ٥)، (٩، ٣)}

١ اذكر مجال الدالة د ٢ اكتب قاعدة الدالة

(١٠) إذا كانت : د (س) = ٣س + ب ، د (٤) = ١٢ فأوجد قيمة : ب (الإسكندرية ١٧)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت د دالة حيث د : $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ، وكانت د (س) = ٣ فإن : $\frac{د(٦)}{د(صفر)} = \dots\dots\dots$ (الدقهلية ١٧)

(١) ٦ (ب) ١ (ج) ٣ (د) غير معرف.

٢ إذا كانت : س - ص = ٥ ، س + ص = ١ فإن : س^٢ - ص^٢ = $\dots\dots\dots$ (البحر الأحمر ١٢)

(١) $\frac{١}{٢٥}$ (ب) ١ (ج) ٥ (د) ٢٥

٣ إذا كان المستقيم الممثل للدالة د : $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ حيث د (س) = ٢ س + ٣ يمر بنقطة الأصل فإن : ح = $\dots\dots\dots$ (الشرقية ١١)

(١) ٣ (ب) ٣- (ج) صفر (د) $\frac{٣-}{٢}$

٤ الدالة الخطية المعرفة بالقاعدة ص = ٢ س - ١ يمثلها خط مستقيم يقطع محور الصادات في النقطة $\dots\dots\dots$ (مطروح ٢٠)

(١) (١ ، ٠) (ب) (٠ ، ١) (ج) (١ ، ٠) (د) (٠ ، ١-)

٥ الدالة د : $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ حيث د (س) = ٢ س + ١ تمثل دالة خطية بشرط $\exists ! \dots\dots\dots$ (الغربية ٢٠)

(١) ح (ب) ح+ (ج) ح - {٠} (د) ح-

٦ إذا كانت : د (س) = ٧ س - ١ فإن : د (١) = $\dots\dots\dots$ (البحر ١٦)

(١) ٧ (ب) ٦ (ج) ١- (د) ٣

٧ إذا كانت النقطة (ب - ٤ ، ٢ - ب) تقع في الربع الثالث فإن : ب = $\dots\dots\dots$ (الإسماعيلية ١٩)

(١) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٦

٨ إذا كانت النقطة (٣ ، ٢) تقع على الخط المستقيم الممثل للدالة د : $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ حيث د (س) = ٤ س - ٥ فإن : $\dots\dots\dots$ (الوادي الجديد ٢٠)

(١) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥

٢ مثل بيانياً منحنى الدالة د حيث د (س) = ٢ - س^٢ ، س \in [٣ ، ٢-] ومن الرسم استنتج : (سوهاج ٢٠)

١ إحداثي نقطة رأس المنحنى. ٢ معادلة محور التماثل.

٣ القيمة العظمى للدالة.

٣ إذا كانت : س = {١ ، ٥ ، ٦} ، ص = {٥} ، ح = {٢ ، ٢} فأوجد : (القاهرة ١٧)

١ $n(س \times ح)$ ٢ $(ص \cap س) \times (س - ص)$

٧ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(أسبوط ٢٠)

- ١ إذا كان $١٣ = ٨ - ب$ فإن $١ : ب =$
 (أ) $٢ : ٨$ (ب) $٨ : ٢$ (ج) $٢ : ٨$ (د) $٨ : ٢$

(أحجام ١٦)

- ٢ إذا كان $١ : ٤$ ، $٤ : ٢$ ، $٢ : ١$ كميات متناسبة فإن $١ : ب =$
 (أ) $١ : ٢$ (ب) $٢ : ١$ (ج) $١ : ٢$ (د) $٢ : ١$

(أورسعيد ١٧)

- ٣ إذا كان $\frac{١}{٢} = \frac{٤}{٢} = \frac{١}{٢}$ (حيث $١ : ب \neq$ صفر) فإن $\frac{١}{٢} =$
 (أ) $\frac{٢}{٣}$ (ب) $\frac{٢}{٣}$ (ج) $\frac{٢}{٣}$ (د) $\frac{٢}{٣}$

(الفيوم ١٩)

- ٤ إذا كانت $٦ = (٣ - س)$ فإن $٦ - (٢ - س) =$
 (أ) $١٢ -$ (ب) $٢ -$ (ج) ٦ (د) $١٨ -$

(السويس ١٦)

- ٥ إذا كانت $س = \{٥\}$ ، $ص = \{٢\}$ فإن $ص (س \times ص) =$
 (أ) ٨ (ب) ١٥ (ج) ٢ (د) ١

(المنوفية ١٨)

- ٦ إذا كانت الكميات ٢ ، ٢ ، ٦ ، $س - ١$ متناسبة فإن $س =$
 (أ) ١٨ (ب) ٩ (ج) ٢٠ (د) ١٠

(السويس ١٨)

- ٧ إذا كان $\frac{١}{٢} = \frac{١}{٢}$ فإن $٢٤ - ٣ =$
 (أ) صفر (ب) ٣ (ج) ٥ (د) ٧

(الغربية ٢٠)

- ٨ إذا كان $س^٢ + ٦ = س$ ، $س = ٥$ فإن $(س + ص)^٢ =$
 (أ) ١٦ (ب) $١٦ \pm$ (ج) ١١ (د) $١١ \pm$

(بنى سويف ٢٠)

- ٩ إذا كانت $س = (س) - ٢ - ٢٢$ ، $س (س) = س + ١$

١ أوجد $س + (٢) س (٢٢)$

٢ أثبت أن $س = (٢٢) س (١ -)$

(القاهرة ١٩)

- ٣ أوجد العدد الذي إذا أضيف إلى حدى النسبة $٢ : ٥$ فإنها تصبح $١ : ٢$

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(القليوبية ١٨)

١ إذا كان : $\frac{م}{و} = \frac{ح}{س} = \frac{أ}{ب}$ (حيث $م \neq ٠$) فإن $\frac{أ}{و} = \frac{ح}{س} = \frac{م}{ب}$ (أ) $م$ (ب) $٢م$ (ج) $٣م$ (د) $٢م$

(السويس ١٧)

٢ إذا كان : $\frac{أ}{و} = \frac{ح}{س} = \frac{ب}{٤}$ فإن : قيمة $س$ = (أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٦

(الفيوم ١٩)

٣ إذا كانت : $\frac{أ}{و} = \frac{ب}{٣} = \frac{١}{٢}$ فإن كل نسبة تساوى (أ) $\frac{١}{٣}$ (ب) $\frac{١}{٢}$ (ج) $\frac{١}{٥}$ (د) $\frac{١}{٦}$

(المنوفية ١٩)

٤ إذا كانت : $\frac{ب}{و} = \frac{١}{٣}$ فإن : $٥ - ٣ - ٤ =$ (أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٦

٥ نسبة مساحة منطقة مربعة طول ضلعها ل إلى منطقة مربعة أخرى طول ضلعها ٣ ل كنسبة

(قنا ٢٠)

(أ) ٣ : ١ (ب) ١ : ٣ (ج) ٩ : ١ (د) ١ : ٩

(الشرقية ٢٠)

٦ إذا كان : $\frac{م}{و} = \frac{ح}{س} = \frac{أ}{ب}$ فإن $\frac{م}{و} = \frac{ح}{س} = \frac{أ}{ب}$ (أ) $\frac{م}{و} + \frac{ح}{س} + \frac{أ}{ب}$ (ب) $\frac{م}{و}$ (ج) $\frac{ح}{س}$ (د) $\frac{أ}{ب}$

(الإسماعيلية ١٦)

٧ إذا كان : $٢٢ = أ + ب + ح = ٣٦$ وكان : $١٥ = ب + ح$ فإن : قيمة $أ$ = (أ) ٢١ (ب) ١٠ (ج) ٦ (د) ٣

(الدقهلية ١٧)

٨ إذا كانت : $س \times ص = ١٠$ فإن : $س + ص =$ (أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ١٠

(القليوبية ١٩)

٩ إذا كان : $\frac{أ}{و} = \frac{ب}{٣} = \frac{١}{٢}$ فأثبت أن : $\frac{أ}{و} = \frac{ب}{٣} = \frac{١}{٢}$

(الشرقية ٢٠)

١٠ إذا كان : $\frac{ب}{و} = \frac{١}{٤}$ أوجد قيمة : $\frac{أ}{و}$

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : ١ ، ٢ ، ٤ ، س في تناسب متسلسل فإن : $س + ١ =$ (الدقهية ٢٠)

- (١) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ٩

٢ الوسط المتناسب بين ٢ و ٢٧ هو (الإحصائية ٢٠)

- (١) ٩ (ب) ٩- (ج) $٩ \pm$ (د) ١

٣ إذا كانت : ٧ ، س ، $\frac{١}{س}$ في تناسب متسلسل فإن : $س^٢ ص =$ (بورسعيد ١٨)

- (١) ٥ (ب) ٩ (ج) ٧ (د) ١٢

٤ إذا كانت : ٣ ، ٦ ، س متناسبة فإن : س = (كفر الشيخ ١٨)

- (١) $\frac{١}{٣}$ (ب) ٢ (ج) ٩ (د) ١٢

٥ إذا كانت النقطة (٢ ، ١-٩) تقع على المستقيم الممثل للدالة د : د (س) = ٤ س - ٥

فإن : ٩ = (الغربية ١٧)

- (١) ٤ (ب) ١ (ج) ٣ (د) ٢

٦ إذا كانت : ٢ ، ٦ ، س + ١٥ كميات متناسبة فإن : س = (الأقصر ١٦)


- (١) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

٧ $[٧ ، ٢] - [٧ ، ٢] =$ (بنى سويف ١٨)

- (١) \emptyset (ب) $\{٢\}$ (ج) $\{٧\}$ (د) $\{٧ ، ٢\}$

٨ الشكل المقابل يمثل منحنى لدالة تربيعية حيث $٩ (-٤ ، ٠)$

فإن معادلة محور التماثل هي : س = (الدقهية ١٩)



- (١) ١ (ب) ١- (ج) ٢- (د) صفر

٢ إذا كانت : ١ ، ب ، ح ، د في تناسب متسلسل (المنوفية ٢٠)

$$\text{أثبت أن : } \frac{١-ب}{ب} = \frac{د-١}{٢-د}$$

٣ إذا كان ١ : ب : ح = ٤ : ٥ : ٢ (كفر الشيخ ١٦)

$$\text{أثبت أن : } \frac{١}{٣} = \frac{١-ب-ح}{٢-ب+١}$$

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(المنيا ١٨)

(د) $\frac{1}{ص}$

(ج) $\frac{1}{س}$

(ب) $\frac{٧}{ص}$

(١) س

١ إذا كان : س = ص = ٧ فإن : ص = ٧

٢ إذا كانت ص تتغير عكسياً مع س وكانت س = ٣ ص = ٢ عندما ص = $\frac{٢}{٣}$

(الوادي الجديد ٣٠)

(د) ٦

(ج) ٢

(ب) $\frac{٢}{٣}$

(١) $\frac{1}{٣}$

فإن ثابت التناسب يساوي

(الشرقية ١٧)

(د) $\frac{1}{ص}$

(ج) $\frac{1}{س}$

(ب) $\frac{٢}{ص}$

(١) ص

٣ إذا كان : س = ٢ - ٤ س + ٤ ص = صفر فإن : س = ٧

(الشرقية ١٩)

(د) س = ٧





(ج) س = $\frac{1}{٣}$

(ب) س = ٧

٤ إذا كانت : ص = م س حيث م ثابت \neq صفر فأى العبارات الآتية تكون عبارة خطأ ؟

(الجيزة ١٧)

٥ الشكل الذى يمثل تغيراً طردياً بين المتغيرين س ، ص هو الشكل



(المنوفية ٢٠)

(د) $\{٨، ٢\}$

(ج) $[٨، ٢[$

(ب) $[٨، ٢]$

(١) $]٨، ٢[$

٦ إذا كانت : ١ > س > ٢ ، س \in ح فإن : ٣ - س - ١ \in

(الجيزة ١٩)

(د) ٦

(ج) ٦ -

(ب) ١

(١) صفر

٧ إذا كانت : د = (س) = ٣ فإن : د (٣) + د (٣-) =

(السويس ١٨)

(د) \leq

(ج) $>$

(ب) $<$

(١) $=$

٨ إذا كانت : (س ، ص) تقع فى الربع الثانى فإن : س ص

(المنوفية ١٨)

٢ إذا كانت : ص = ٣ - ل حيث ل = $\frac{1}{س}$ وكانت : ص = ٥ عندما س = ١

أوجد العلاقة بين س ، ص واحسب قيمة ص عندما س = ٣

(الشرقية ١٨)

٣ إذا كان : $\frac{١}{س} = \frac{٢-٢٣}{٥٢-٣}$ أثبت أن : ١ ، ب ، ح ، د كميات متناسبة.

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في مجموعة من البيانات يسمى (الشرقية ١٨)

(أ) المدى. (ب) الوسط الحسابي. (ج) الوسيط. (د) الانحراف المعياري.

٢ العلاقة التي تمثل تغيراً طردياً بين ص ، س هي (الغربية ٢٠)

(أ) $S = 5$ (ب) $S - 3 = S$ (ج) $\frac{S}{5} = \frac{S}{3}$ (د) $\frac{4}{S} = \frac{S}{3}$

٣ إذا كان : $\overline{S} = 8$ لمجموعة من القيم عددها ١٢ فإن : $\sigma =$ (القاهرة ١٧)

(أ) ٤ (ب) ٢ (ج) ٢ (د) ٤

٤ إذا كانت ١٨ هي أكبر مفردات مجموعة ما وكان المدى = ٦

فإن أصغر مفردات هذه المجموعة = (المنوفية ١٧)

(أ) ٨ (ب) ١٢ (ج) ١٤ (د) ٣٦

٥ أكثر مقاييس التشتت انتشاراً وأدقها هو (دمياط ١٩)

(أ) الوسيط. (ب) الوسط الحسابي. (ج) المدى. (د) الانحراف المعياري.

٦ إذا كان : $17 = S + 8$ فإن : $17 = S + 11$ (الإسماعيلية ١٩)

(أ) ٨ (ب) ١١ (ج) ١٤ (د) ١٧

٧ إذا كانت : $\frac{2}{3} = \frac{S+4}{S-2}$ فإن : $\frac{S}{2} =$ (المنوفية ٢٠)

(أ) $\frac{1}{8}$ (ب) ٨ (ج) $\frac{1}{8}$ (د) ٨

٨ إذا كانت جميع قيم المفردات متساوية في القيمة فإن (الشرقية ١٦)

(أ) $\overline{S} = 0$ (ب) $\sigma = 0$ (ج) $\overline{S} - S < 0$ (د) $\overline{S} - S > 0$

٢ الجدول الآتي يبين الأعمار بالسنوات لعشرين شخصاً : (دمياط ١٧)

| العمر | ١٥ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٥ | ٣٠ | المجموع |
|-------------|----|----|----|----|----|----|---------|
| عدد الأشخاص | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ١ | ٤ | ٢٠ |


احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري.

٣ إذا كانت : $2, 3, 4, 5$ كميات متناسبة أثبت أن : $\frac{2}{5} = \frac{3+4}{5}$ (الغربية ١٩)

الأسئلة الهامة

في الجبر والإحصاء

من امتحانات المحافظات





ملخص الوحدة الأولى

العلاقات والدوال

حاصل ضرب الديكارتي

★ لأي مجموعتين منتهيتين وغير خاليتين S ، T يكون :

حاصل ضرب الديكارتي $S \times T$ هو مجموعة جميع الأزواج المرتبة التي مسقطها الأول عنصر

ينتمي إلى S ومسقطها الثاني عنصر ينتمي إلى T

أي أن : $S \times T = \{(a, b) : a \in S, b \in T\}$

مع ملاحظة أن : $S \times T \neq T \times S$ حيث : $S \neq T$

★ لأي مجموعة S يكون : $S \times \emptyset = \emptyset \times S = \emptyset$

★ محور السينات ومحور الصادات يقسمان المستوى

إلى أربعة أقسام (أرباع) كما بالشكل المقابل

ويمكن التعرف على الربع الذي تقع فيه أي نقطة

من إشارتي إحداثيها.



★ إذا كان الإحداثي السيني للنقطة يساوي الصفر فإن النقطة تقع على محور الصادات.

★ إذا كان الإحداثي الصادي للنقطة يساوي الصفر فإن النقطة تقع على محور السينات.

العلاقة

★ العلاقة من المجموعة S إلى المجموعة T هي ارتباط يربط بعض أو كل عناصر S ببعض أو كل عناصر T

★ إذا كانت f علاقة من المجموعة S إلى المجموعة T فإن :

* بيان f هو مجموعة من الأزواج المرتبة التي مسقطها الأول ينتمي إلى S ومسقطها الثاني ينتمي إلى T

* $f \subseteq S \times T$

★ إذا كانت f علاقة من S إلى T فيقال إن f علاقة على S ويكون $f \subseteq S \times S$

الدالة

★ يقال لعلاقة من S إلى T إنها دالة إذا تحققت إحدى الحالات الآتية :

① كل عنصر من عناصر S يظهر مرة واحدة فقط كمسقط أول في أحد الأزواج المرتبة

التي تنتمي إلى بيان العلاقة.

② كل عنصر من عناصر S يخرج منه سهم واحد فقط إلى أحد عناصر V وذلك في المخطط السهمي الممثل للعلاقة.

③ كل خط رأسى تقع عليه نقطة واحدة فقط من النقط التي تمثل العلاقة وذلك في المخطط البياني الممثل للعلاقة.

★ إذا كانت D دالة من S إلى V فإنها تكتب $D: S \rightarrow V$ ويكون:

① S هي مجال الدالة D

② V هي المجال المقابل للدالة D

③ مجموعة صور عناصر S بالدالة D هي مدى الدالة ويكون مدى الدالة \subset المجال المقابل للدالة.

دوال كثيرات الحدود

★ الدالة كثيرة الحدود هي دالة قاعدتها حد أو مقدار جبرى ويتوافر فيها الشرطان الآتيان معًا:

① كل من المجال والمجال المقابل للدالة هو مجموعة الأعداد الحقيقية R

② قوة (أس) المتغير فى أى حد من حدود قاعدتها هو عدد طبيعى.

لاحظ أن: درجة الدالة كثيرة الحدود هي أكبر قوة للمتغير فى قاعدة الدالة.

★ الدالة الثابتة:

الدالة $D: R \rightarrow R$ حيث $D(x) = b$ ، $b \in R$ تسمى دالة ثابتة ويمثلها بيانيًا خط مستقيم يوازى محور السينات ويقطع محور الصادات فى النقطة $(0, b)$

★ الدالة الخطية:

الدالة $D: R \rightarrow R$ حيث $D(x) = ax + b$ ، $a \neq 0$ ، $b \in R$ تسمى دالة خطية (دالة من الدرجة الأولى) ويمثلها بيانيًا خط مستقيم يقطع محور الصادات

فى $(0, b)$ ويقطع محور السينات فى $(-\frac{b}{a}, 0)$

★ الدالة التربيعية:

الدالة $D: R \rightarrow R$ حيث $D(x) = ax^2 + bx + c$ ، $a \neq 0$ ، $b, c \in R$ أعداد حقيقية

، $a \neq 0$ تسمى دالة تربيعية وهى دالة كثيرة حدود من الدرجة الثانية ويمثلها بيانيًا منحنى نقطة

رأسه هي: $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a})$



أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

١ إذا كان : $(٥, ٣) \in \{(٨, ٦), (٨, ٣), (س, ٣)\}$ فإن : $س =$
 (١) ٨ (ب) ٦ (ج) ٥ (د) ٣

٢ إذا كانت النقطة $(٤, ١ - ٢)$ تقع على محور السينات فإن : $١ =$
 (١) ٤ - (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٧

٣ إذا كانت : $(٣ - س, س - ١)$ تقع في الربع الرابع حيث $س \in$
 فإن : $س =$
 (١) ٤ (ب) ٣ (ج) ٢ (د) صفر

٤ إذا كان : $(س + ٥, ٨) = (١, ٦ + س + س)$ فإن : $س =$
 (١) ٥ (ب) ٦ (ج) ٢ (د) ١٢

٥ إذا كانت : $س = (٢ - س) = ٤$ ، $س = (س \times س) = ٦$ فإن : $س = (٢ - س) =$
 (١) ٤ (ب) ٩ (ج) ١٦ (د) ١٢

٦ إذا كانت : $س = \{٢\}$ فإن : $س =$
 (١) ٩ (ب) $(٢, ٢)$ (ج) $\{٩\}$ (د) $\{(٢, ٢)\}$

٧ إذا كانت : $س = \{٢, ١\}$ ، $س = \{٤, ٣\}$ فإن : $(٤, ٣) \in$
 (١) $س \times س$ (ب) $س \times س$ (ج) $س^٢$ (د) $س^٢$

٨ إذا كانت : $س \times س = \{(٢, ٢)\}$ فإن : $س =$
 (١) $\{(٩, ٤)\}$ (ب) $\{(٢, ٤)\}$ (ج) $\{(٢, ٢)\}$ (د) $\{(٩, ٢)\}$

٩ إذا كانت : $د (س) = ٤ س + ٣$ ، $د (٣) = ١٥$ فإن : $د =$
 (١) ١٥٦ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٣ -

١٠ إذا كانت : $د (س) = س^٢ + ٢ س - ٣$ فإن مجموعة قيم $د$ الممكنة والتي تجعل $د$ دالة من الدرجة الثانية هي
 (١) $\{٢, ٢\}$ (ب) $\{١, -١\}$ (ج) $\{٢, ١, ٠\}$ (د) $\{١, ٢\}$

إذا كانت : و (س) = د تمثل دمجين متماثلين محور السينات فإنه يمر بالنقطة (الإسقاطية ١)

الأسئلة العامة

(بلى سوف ١٧)

٢١ الدالة $d : d = 3$ من يمثلها بياناً خط مستقيم يمر بالنقطة

- (١) $(3, 0)$ (ب) $(0, 0)$ (ج) $(0, 3)$ (د) $(3, 3)$

(الشرقية ٢٠)

٢١ إذا كانت $d : d \leftarrow c$ حيث $d = (س)$ $س = 2 + 3$ وكانت $d = (2) = 11$

فإن : $d =$

- (١) ٥ (ب) ٢ (ج) ٢ (د) ٣

(الدقهلية ١٩)

٢٢ إذا كانت $d : d = (س + 3) = س - 3$ فإن $d = (7) =$

- (١) ٤ (ب) ١ (ج) ٧ (د) ١٠

(الدقهلية ٠٩)

٢٣ إذا كانت $d : d = (2 س) = 4$ فإن $d = (-س) =$

- (١) ٢- (ب) ٤- (ج) ٤ (د) ٢

(الفيوم ١٧)

٢٤ إذا كان المستقيم الذى يمثل الدالة $d : d = (س) = 2 س - 1$ يمر بنقطة الأصل

فإن : $d =$

- (١) ٢- (ب) ٢ (ج) صفر (د) ٣

(الشرقية ١٨)

٢٥ إذا كانت النقطة $(2, -4, 4, 4)$ تقع على الجزء السالب من محور الصادات

فإن : $d =$

- (١) $2 \pm$ (ب) ٤ (ج) ٢- (د) ٢

(دمياط ١٨)

٢٦ إذا كانت : $س, ص$ مجموعتين غير خاليتين ، $س = (س) = س \times (ص)$

فإن : $س = (ص) =$

- (١) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

(الشرقية ١٥)

٢٧ إذا كان : $\{2\} \times \{س, ص\} = \{(2, 4), (2, 3)\}$ فإن : $س - ص =$

- (١) ١ (ب) ١- (ج) $1 \pm$ (د) صفر

ثانياً الأسئلة المقالية

١ إذا كانت : $س = \{2, 4\}$ ، $ص = \{4, 5\}$ ، $ع = \{5, 6\}$

فأوجد : ١ $س \times (ص \cap ع)$ ٢ $(س - ص) \times ع$

(المنوفية ١٨)

٣ $(س - ص) \times (ص - ع)$

٢ إذا كانت: $\{5, 2\} = \text{ص}$ ، $\{2, 2\} = \text{ص}$ ، $\{2\} = \text{ع}$

٢ ص

فاوجد: $\{1\} \text{ ص} \times \text{ع}$

(أبي سوييف ٢٠)

٣ $\{1\} \text{ ص} \times \text{ع}$

٣ إذا كانت: $\{7, 5, 4\} = \text{ص}$ وكانت ع دالة على ص وكان بيان

$\text{ع} = \{(7, 4), (5, 4), (5, 1)\}$ فاوجد:

(سوهاج ٢٠)

٢ مدى الدالة.

١ القيمة العددية للمقدار $1 + \text{ب}$

٤ إذا كانت: $\text{ص} \times \text{ص} = \{(3, 4), (5, 4), (1, 4), (3, 1), (5, 1), (1, 1)\}$

(الشرقية ١٦)

٢ ص ، ص

أوجد: $\{1\} \text{ ص} \times \text{ص}$

٥ إذا كانت: $\{5, 3, 2, 1\} = \text{ص}$ ، $\{6, 5, 2\} = \text{ص}$

(كفر الشيخ ١٧)

٢ ص (ص)

أوجد: $\{1\} \text{ ص} \times \text{ص}$

٦ إذا كانت: $\{2, 1, 0, 1, 2\} = \text{ص}$ وكانت ع علاقة على ص حيث ع «ب» تعنى

أن «العدد ١ معكوس للعدد ب» لكل $1 \in \text{ص}$ ، $1 \in \text{ص}$ اكتب بيان ع ومثلها بمخطط سهمي ،

(الدقهلية ٢٠)

وهل ع دالة أم لا ؟

٧ إذا كانت: $\{4, 3, 1\} = \text{ص}$ ، $\{2, 2, 1\} = \text{ص}$ وكانت ع علاقة من ص إلى ص حيث

«ع» «ب» تعنى أن $1 + \text{ب} = \text{عدد فردي}$ لكل $1 \in \text{ص}$ ، $1 \in \text{ص}$

(الإسماعيلية ١٧)

٢ إذا كانت $1, 2$ ع فاوجد: قيمة ١

٨ إذا كانت: $\{4, 3, 2\} = \text{ص}$ ، $\{12, 9, 8, 7, 6\} = \text{ص}$ وكانت ع علاقة من ص إلى ص

حيث «ع» «ب» تعنى أن $2 = \text{ب}$ لكل $1 \in \text{ص}$ ، $1 \in \text{ص}$

(الشرقية ١٨)

١ اكتب بيان العلاقة.

٢ هل ع دالة من ص إلى ص أم لا ؟ ولماذا ؟

٩ إذا كانت: $\{2, 2, 1, 0\} = \text{ص}$ ، $\{9, 4, 1, 0, 1\} = \text{ص}$ وكانت

$\text{ع} : \text{ص} \rightarrow \text{ص}$ حيث «ع» «ب» تعنى أن $1 = \text{ب}$ لكل $1 \in \text{ص}$ ، $1 \in \text{ص}$

(الفيوم ١٦)

اكتب بيان ع ومثلها بمخطط سهمي ، هل ع دالة أم لا ؟ مع ذكر السبب.

إذا كانت : س = { ٢ ، ١ ، ١ } ، هـ = { ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٢ } وكانت ط علاقة من س إلى هـ
حيث : ط : س → هـ تعني أن : س + ١ = ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩
اكتب بيان ط ومثلها بمخطط سهمي وهل ط دالة ؟ ولماذا ؟
(الإسكندرية ١٩)

١١ إذا كانت $d = (x, y, z)$ $z = 2 - y - x$ أثبت أن $d(2) = d\left(\frac{1}{2}\right)$ (الأولمبياد ٢٠١٨)

۲۲. إذا كانت: د (س) = $س^2 - ۲س$ ، ر (س) = $س - ۳$
 [۱] أوجد: د (۲۷) + ر (۲۷) [۲] أثبت أن: د (۳) = ر (۳) = صفر
 (قنا ۱۹)

١٢ إذا كانت: $S = \{2, 1, 0\}$ ، $V = \{7, 5, 4, 3, 2, 1\}$
وكانت: $S \leftarrow V$ حيث $d(S) = 5$ S
١ أوجد: مدى الدالة d ٢ ارسم مخططاً بيانياً للدالة d
(الوادي الجديد ١٧)

١٤ إذا كان بيان د = $\{(11, 5), (9, 4), (7, 3), (5, 2), (3, 1)\}$

١ اكتب مجال الدالة د

٢ اكتب مدى الدالة د

٣ اكتب قاعدة للدالة د

(دمياط ١٦)

١٥ إذا كان المستقيم الممثل للدالة $d: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $d(s) = 4 - s$ يقطع محور السينات فى النقطة (٢، ٠) أوجد قيمتى ١، ٢

١٦ إذا كان المستقيم الممثل للدالة $d: E \rightarrow E$ ، $d(s) = s + s$ يقطع محور السينات في النقطة $(0, 3)$ ويقطع محور الصادات في النقطة $(3, 0)$

أوجد : قيمة كل من الثابتين a, b ثم أوجد : قيمة $d(1)$

(الترقية ١٧)

١٧ مثل بياناً الدالة التربيعية د : د (س) = س^٢ - ٤س + ٣ ، س ∈ ح متخذاً س ∈ [-١ ، ٥]

ثم أوجد :

١ معادلة محور تماثل الدالة. ٢ القيمة الصغرى للدالة.

(الجزء ١٨)

١٨ ارسم منحنى الدالة d حيث $d(s) = 1 - s^2$ فى الفترة $[-2, 2]$

ومن الرسم عين :

١ إحداثى نقطة رأس المنحنى. ٢ القيمة العظمى أو الصغرى للدالة.

٣ معادلة محور التماثل.


(الشرقية ١٨)

١٩ إذا كانت : د (س) = $١ + ٢س$ ، ل (س) = كثيرتي حدود حيث ١ ، ح ثابتان وكانت :

د (٢) + ل (٣) = ٦

(الدقيلية ١٩)

أوجد القيمة العددية للمقدار : د (٠) + ل (٧)



٢٠ الشكل المقابل يوضح المستقيم \overleftrightarrow{AB}

الذي يمثل الدالة د حيث د (س) = ٣


فإذا كان \overleftrightarrow{AB} ويمثل الدالة ر

حيث ر (س) = $٢س + ٤$

وكانت مساحة المثلث أ و ب = ٦ وحدات مربعة

أوجد : قيمة كل من ل ، ر حيث و نقطة الأصل.

(الموقفية ١٨)




٢١ الشكل المقابل يمثل الدالة د حيث د (س) = $٤ - ٢س$

أوجد :

١ إحداثي كل من النقطتين أ ، ب

٢ مساحة سطح Δ أ و ب

(الأقصر ١٩)



٢٢ الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة د حيث د (س) = $٩ - س^٢$

أوجد : ١ إحداثي أ ، ح

٢ مساحة المثلث أ ب ح

(كفر الشيخ ١٨)



ملخص الوحدة الثانية

النسبة والتناسب والتغير الطردى والتغير العكسي

النسبة

- ★ قيمة النسبة لا تتغير إذا ضرب حدها في (أو قسمها على) عدد حقيقي لا يساوي الصفر.
- ★ قيمة النسبة ($\neq 1$) تتغير إذا أضيف إلى حديها (أو طرح منهما) عدد حقيقي لا يساوي الصفر.
- ★ إذا كانت النسبة بين عددين هي $a : b$

فإن : العدد الأول = a ، العدد الثاني = b حيث $m \neq 0$

التناسب

★ إذا كانت : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ فإن : a, b, c, d كميات متناسبة.

★ إذا كانت : a, b, c, d كميات متناسبة فإن : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

★ إذا كانت : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ فإن : $a \times d = b \times c$

أي أن : حاصل ضرب الطرفين = حاصل ضرب الوسطين.

★ إذا كان : $a \times d = b \times c$

فإن : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ، $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ ، $\frac{a}{d} = \frac{b}{c}$ ، $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

★ إذا كانت : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ فإن : $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$

أي أن : $\frac{\text{مقدم النسبة الأولى}}{\text{مقدم النسبة الثانية}} = \frac{\text{تالي النسبة الأولى}}{\text{تالي النسبة الثانية}}$

★ إذا كانت : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ فإن : $a = b \times \frac{c}{d}$ ، $c = d \times \frac{a}{b}$ حيث m ثابت $\neq 0$

★ إذا كانت : a, b, c, d كميات متناسبة وفرضنا أن : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = m$

فإن : $a = b \times m$ ، $c = d \times m$

★ إذا كانت : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \dots$ وكانت m, n, p, \dots أعدادًا حقيقية لا تساوي الصفر

فإن : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \dots = \frac{m \times a + n \times c + p \times e + \dots}{m \times b + n \times d + p \times f + \dots}$ إحدى النسب.

يقال إن الكميات a ، b ، c هي تناسب متسلسل إذا كان $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$

يسمى a الأول المتناسب ، c الثالث المتناسب ، أما b فتسمى الوسط المتناسب بين a ، c ،

ويكون : $\boxed{a = 2}$ ، $\boxed{b = 4}$ ، $\boxed{c = 8}$ أي $\boxed{a = 2}$ ، $\boxed{b = 4}$ ، $\boxed{c = 8}$

إذا كان $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = \frac{d}{e} = \frac{e}{f} = \frac{f}{g} = \frac{g}{h} = \frac{h}{i} = \frac{i}{j} = \frac{j}{k} = \frac{k}{l} = \frac{l}{m} = \frac{m}{n} = \frac{n}{o} = \frac{o}{p} = \frac{p}{q} = \frac{q}{r} = \frac{r}{s} = \frac{s}{t} = \frac{t}{u} = \frac{u}{v} = \frac{v}{w} = \frac{w}{x} = \frac{x}{y} = \frac{y}{z} = \frac{z}{a}$ فإن $a = 1$ ، $b = 2$ ، $c = 4$ ، $d = 8$ ، $e = 16$ ، $f = 32$ ، $g = 64$ ، $h = 128$ ، $i = 256$ ، $j = 512$ ، $k = 1024$ ، $l = 2048$ ، $m = 4096$ ، $n = 8192$ ، $o = 16384$ ، $p = 32768$ ، $q = 65536$ ، $r = 131072$ ، $s = 262144$ ، $t = 524288$ ، $u = 1048576$ ، $v = 2097152$ ، $w = 4194304$ ، $x = 8388608$ ، $y = 16777216$ ، $z = 33554432$ ، $a = 67108864$ ، $b = 134217728$ ، $c = 268435456$ ، $d = 536870912$ ، $e = 1073741824$ ، $f = 2147483648$ ، $g = 4294967296$ ، $h = 8589934592$ ، $i = 17179869184$ ، $j = 34359738368$ ، $k = 68719476736$ ، $l = 137438953472$ ، $m = 274877906944$ ، $n = 549755813888$ ، $o = 1099511627776$ ، $p = 2199023255552$ ، $q = 4398046511104$ ، $r = 8796093022208$ ، $s = 17592186044416$ ، $t = 35184372088832$ ، $u = 70368744177664$ ، $v = 140737488355328$ ، $w = 281474976710656$ ، $x = 562949953421312$ ، $y = 1125899906842624$ ، $z = 2251799813685248$ ، $a = 4503599627370496$ ، $b = 9007199254740992$ ، $c = 18014398509481984$ ، $d = 36028797018963968$ ، $e = 72057594037927936$ ، $f = 144115188075855872$ ، $g = 288230376151711744$ ، $h = 576460752303423488$ ، $i = 1152921504606846976$ ، $j = 2305843009213693952$ ، $k = 4611686018427387904$ ، $l = 9223372036854775808$ ، $m = 18446744073709551616$ ، $n = 36893488147419103232$ ، $o = 73786976294838206464$ ، $p = 147573952589676412928$ ، $q = 295147905179352825856$ ، $r = 590295810358705651712$ ، $s = 1180591620717411303424$ ، $t = 2361183241434822606848$ ، $u = 4722366482869645213696$ ، $v = 9444732965739290427392$ ، $w = 18889465931478580854784$ ، $x = 37778931862957161709568$ ، $y = 75557863725914323419136$ ، $z = 151115727451828646838272$ ، $a = 302231454903657293676544$ ، $b = 604462909807314587353088$ ، $c = 1208925819614629174706176$ ، $d = 2417851639229258349412352$ ، $e = 4835703278458516698824704$ ، $f = 9671406556917033397649408$ ، $g = 19342813113834066795298816$ ، $h = 38685626227668133590597632$ ، $i = 77371252455336267181195264$ ، $j = 154742504910672534362390528$ ، $k = 309485009821345068724781056$ ، $l = 618970019642690137449562112$ ، $m = 1237940039285380274899124224$ ، $n = 2475880078570760549798248448$ ، $o = 4951760157141521099596496896$ ، $p = 9903520314283042199192993792$ ، $q = 19807040628566084398385987584$ ، $r = 39614081257132168796771975168$ ، $s = 79228162514264337593543950336$ ، $t = 158456325028528675187087900672$ ، $u = 316912650057057350374175801344$ ، $v = 633825300114114700748351602688$ ، $w = 1267650600228229401496703205376$ ، $x = 2535301200456458802993406410752$ ، $y = 5070602400912917605986812821504$ ، $z = 10141204801825835211973625643008$ ، $a = 20282409603651670423947251286016$ ، $b = 40564819207303340847894502572032$ ، $c = 81129638414606681695789005144064$ ، $d = 162259276829213363391578010288128$ ، $e = 324518553658426726783156020576256$ ، $f = 649037107316853453566312041152512$ ، $g = 1298074214633706907132624082305024$ ، $h = 2596148429267413814265248164610048$ ، $i = 5192296858534827628530496329220096$ ، $j = 10384593717069655257060992658440192$ ، $k = 20769187434139310514121985316880384$ ، $l = 41538374868278621028243970633760768$ ، $m = 83076749736557242056487941267521536$ ، $n = 166153499473114484112975882535043072$ ، $o = 332306998946228968225951765070086144$ ، $p = 664613997892457936451903530140172288$ ، $q = 1329227995784915872903807060280344576$ ، $r = 2658455991569831745807614120560689152$ ، $s = 5316911983139663491615228241121378304$ ، $t = 10633823966279326983230456482242756608$ ، $u = 21267647932558653966460912964485513216$ ، $v = 42535295865117307932921825928971026432$ ، $w = 85070591730234615865843651857942052864$ ، $x = 170141183460469231731687303715884105728$ ، $y = 340282366920938463463374607431768211456$ ، $z = 680564733841876926926749214863536422912$ ، $a = 136088658272321088588503874378980583424$ ، $b = 272177316544642177177007748757961166848$ ، $c = 544354633089284354354015497515922333696$ ، $d = 1088709266178568708708030995031844667392$ ، $e = 2177418532357137417416061990063689334784$ ، $f = 4354837064714274834832123980127378669568$ ، $g = 8709674129428549669664247960254757339136$ ، $h = 17419348258857099339328495920509514678272$ ، $i = 34838696517714198678656991841019029356544$ ، $j = 69677393035428397357313983682038058713088$ ، $k = 139354786070856794714627967364076117426176$ ، $l = 278709572141713589429255934728152234852352$ ، $m = 557419144283427178858511869456304469704704$ ، $n = 1114838288566854357717023738912608939409408$ ، $o = 2229676577133708715434047477825217878818816$ ، $p = 4459353154267417430868094955650435757637632$ ، $q = 8918706308534834861736189911300871515275264$ ، $r = 17837412617069669723472379822601743030550528$ ، $s = 35674825234139339446944759645203486061101056$ ، $t = 71349650468278678893889519290406972122202112$ ، $u = 142699300936557357787779038580813944244404224$ ، $v = 285398601873114715575558077161627888488808448$ ، $w = 570797203746229431151116154323255776977616896$ ، $x = 1141594407492458862302232308646511553955233792$ ، $y = 2283188814984917724604464617293023107910467584$ ، $z = 4566377629969835449208929234586046215820935168$ ، $a = 9110510419909783163806886851879069323712703232$ ، $b = 18221020839819566327613773703758138647425406464$ ، $c = 36442041679639132655227547407516277294850812928$ ، $d = 72884083359278265310455094815032554589701625856$ ، $e = 145768166718556530620910189630065109179403251712$ ، $f = 291536333437113061241820379260130218358806503424$ ، $g = 583072666874226122483640758520260436717613006848$ ، $h = 1166145333748452244967281517040520873435226013696$ ، $i = 2332290667496904489934563034081041746870452027392$ ، $j = 4664581334993808979869126068162083493740904054784$ ، $k = 9329162669987617959738252136324166987481808109568$ ، $l = 18658325339975235919476504272648333974963616219136$ ، $m = 37316650679950471838953008545296667949927232438272$ ، $n = 74633301359900943677906017090593335899854464876544$ ، $o = 149266602719801887355812034181186671799708929753088$ ، $p = 298533205439603774711624068362373343599417859506176$ ، $q = 597066410879207549423248136724746687198835719012352$ ، $r = 1194132821758415098846496273449493374397671438024704$ ، $s = 2388265643516830197692992546898986748795342876049408$ ، $t = 4776531287033660395385985093797973497590685752098816$ ، $u = 9553062574067320790771970187595946995181371504197632$ ، $v = 19106125148134641581543940375191893990362743008395264$ ، $w = 38212250296269283163087880750383787980725486016790528$ ، $x = 76424500592538566326175761500767575961450972033581056$ ، $y = 152849001185077132652351523001535151922901944067162112$ ، $z = 305698002370154265304703046003070303845803888134324224$ ، $a = 611396003740308530609406092006140607691607776268648448$ ، $b = 1222792007480617061218812184012281215383215552537296896$ ، $c = 2445584014961234122437624368024562430766431105074593792$ ، $d = 4891168029922468244875248736049124861532862210149187584$ ، $e = 9782336059844936489750497472098249723065724420298375168$ ، $f = 19564672119689872979500994944196499446131448840596750336$ ، $g = 39129344239379745959001989888392998892262897681193500672$ ، $h = 78258688478759491918003979776785997784525795362387001344$ ، $i = 156517376957518983836007959553571995569051590724774002688$ ، $j = 313034753915037967672015919107143991138103181449548005376$ ، $k = 626069507830075935344031838214287982276206362899096010752$ ، $l = 1252139015660151870688063676428575964552412725798192021504$ ، $m = 2504278031320303741376127352857151929104825451596384043008$ ، $n = 5008556062640607482752254705714303858209650903192768086016$ ، $o = 10017112125281214965504509411428607716419301806385536172032$ ، $p = 20034224250562429931009018822857215432838603612771072344064$ ، $q = 40068448501124859862018037645714430865677207225542144688128$ ، $r = 80136897002249719724036075291428861731354414451084289376256$ ، $s = 160273794004499439448072150582857723462708828902168578752512$ ، $t = 320547588008998878896144301165715446925417657804337157505024$ ، $u = 641095176017997757792288602331430893850835315608674315010048$ ، $v = 1282190352035995515584577204662861787701670631217348630020096$ ، $w = 2564380704071991031169154409325723575403341262434697260040192$ ، $x = 5128761408143982062338308818651447150806682524869394520080384$ ، $y = 10257522816287964124676617637302894301613365049738789040160768$ ، $z = 20515045632575928249353235274605788603226730099477578080321536$ ، $a = 41030091265151856498706470549211577206453460198955156160643072$ ، $b = 82060182530303712997412941098423154412906920397910312321286144$ ، $c = 164120365060607425994825882196846308825813840795820624642572288$ ، $d = 328240730121214851989651764393692617651627681591641249285144576$ ، $e = 656481460242429703979303528787385235303255363183282498570289152$ ، $f = 1312962920484859407958607057574770470606510726366564997140578304$ ، $g = 2625925840969718815917214115149540941213021452733129994281156608$ ، $h = 5251851681939437631834428230299081882426042905466259988562313216$ ، $i = 10503703363878875263668856460598163764852085810932519977124626432$ ، $j = 21007406727757750527337712921196327529704171621865039954249252864$ ، $k = 42014813455515501054675425842392655059408343243730079908498505728$ ، $l = 84029626911031002109350851684785310118816686487460159816997011456$ ، $m = 168059253822062004218701703369570620237633372974920319633994022912$ ، $n = 336118507644124008437403406739141240475266745949840639267988045824$ ، $o = 672237015288248016874806813478282480950533491899681278535976091648$ ، $p = 1344474030576496033749613626956564961901066983799362557071952183296$ ، $q = 2688948061152992067499227253913129923802133967598725114143904366592$ ، $r = 5377896122305984134998454507826259847604267935197450228287808733184$ ، $s = 10755792244611968269996909015652519695208535870394900456575617466368$ ، $t = 21511584489223936539993818031305039390417071740789800913151234932736$ ، $u = 43023168978447873079987636062610078780834143481579601826302469865472$ ، $v = 86046337956895746159975272125220157561668286963159203652604939730944$ ، $w = 172092675913791492319950544250440315123336573926318407305209879461888$ ، $x = 344185351827582984639901088500880630246673147852636814610419758923776$ ، $y = 688370703655165969279802177001761260493346295705273629220839517847552$ ، $z = 1376741407310331938559604354003522520986692591410547258441679035695104$ ، $a = 2753482814620663877119208708007045041973384182815820876883278071390208$ ، $b = 5506965629241327754238417416014090083946768365631641753766556142780416$ ، $c = 11013931258482655508476834832028180167893536731263283507533112285560832$ ، $d = 22027862516965311016953669664056360335787073462526567015066224571121664$ ، $e = 44055725033930622033907339328112720671574146925053134030132449142243328$ ، $f = 88111450067861244067814678656225441343148293850106268060264898284486656$ ، $g = 176222900135722488135629357312450882686296587700212536120529796568973312$ ، $h = 352445800271444976271258714624901765372593175400425072241059593137946624$ ، $i = 704891600542889952542517429249803530745186350800850144482119186275893248$ ، $j = 1409783201085779905085034858499607061490372701601700288964238372551786496$ ، $k = 2819566402171559810170069716999214122980745403203400577928476745103572992$ ، $l = 5639132804343119620340139433998428245961490806406801155856953490207145984$ ، $m = 11278265608686239240680278867996856491922981612813602311713906980414291968$ ، $n = 22556531217372478481360557735993712983845963225627204623427813960828583936$ ، $o = 45113062434744956962721115471987425967691926451254409246855627921657167872$ ، $p = 90226124869489913925442230943974851935383852902508818493711255843314335744$ ، $q = 180452249738979827850884461887949703870767705805017636987422511686628671488$ ، $r = 360904499477959655701768923775899407741535411610035273974845023373257342976$

الأسئلة الهامة على الوحدة الثانية

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

١ إذا كان $٢٣ = ٥ - ب$ فإن $\frac{١٢}{ب} = \dots\dots\dots$ (الفيوم ١٧)

(أ) ٣ (ب) ٥ (ج) $\frac{٢}{٥}$ (د) $\frac{٥}{٨}$

٢ إذا كانت ١، ب، ٢، ٣ متناسبة فإن $\frac{ب}{١} = \dots\dots\dots$ (القاوية ١٧)

(أ) $\frac{٢}{٣}$ (ب) $\frac{٢}{٣}$ (ج) ٣ (د) ٢

٣ إذا كانت ص تتغير عكسياً مع س فإن $\dots\dots\dots$ (الجيزة ١٨)

(أ) ص = س (ب) ص = م - س (ج) س - م = ص (د) ص = $\frac{٢}{س}$

٤ العلاقة التي تمثل تغيراً عكسياً بين المتغيرين ص، س هي $\dots\dots\dots$ (القاهرة ١٩)

(أ) س ص = ٥ (ب) ص = س + ٣ (ج) $\frac{س}{٢} = \frac{ص}{٥}$ (د) ص = ٢ - س

٥ العلاقة التي تمثل تغيراً طردياً بين المتغيرين ص، س هي $\dots\dots\dots$ (المنيا ١٩)

(أ) س ص = ٥ (ب) ص = س + ٣ (ج) $\frac{س}{٣} = \frac{٤}{ص}$ (د) $\frac{س}{٢} = \frac{ص}{٥}$

٦ إذا كانت ص ٥٠ س وكانت : س = ١ عندما ص = ٤ فإن ثابت التناسب يساوي $\dots\dots\dots$ (القاهرة ١٦)

(أ) ٤ (ب) ٣ (ج) ١ (د) $\frac{١}{٣}$

٧ إذا كان ٢، ٦، س + ١٥ في تناسب فإن : س = $\dots\dots\dots$ (الجيزة ١٦)

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

٨ إذا كان ٢، ٤، ب، س في تناسب متسلسل فإن : ب + ٢ = $\dots\dots\dots$ (المنوفية ١٦)

(أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ٩

٩ العدد الذي إذا أضيف لكل من الأعداد ١، ٣، ٦ تصبح في تناسب متسلسل هو $\dots\dots\dots$ (دمياط ١٣)

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

١٠ إذا كانت ٣، س، ١٢ ثلاث كميات متناسبة فإن : س = $\dots\dots\dots$ (الغربية ١٦)

(أ) ١٥ (ب) ٦- (ج) ٦ (د) $٦ \pm$

١١ إذا كان $\frac{س}{ص} = \frac{س}{١} = \frac{س}{٥}$ فإن : (المتعدية ١١)

- (١) ٩ (ب) ١٣ (ج) ١٤ (د) ٨

١٢ إذا كانت $\frac{س}{ص} = \frac{١}{٥}$ فإن : (المتعدية ١٢)

- (١) ٢ (ب) ٧ (ج) ٥ (د) ٢

١٣ إذا كان $\frac{س}{ص} = \frac{١}{٤} = \frac{س}{٤}$ (حيث $م \neq ٠$) فإن : (المتعدية ١٣)

- (١) م (ب) م (ج) م (د) م

١٤ إذا كانت : $س^٢ + ٤س = ٤س$ فإن : (المتعدية ١٤)

- (١) $س = ٥$ (ب) $س = ٢$ (ج) $س = ١$ (د) $س = ٤$

١٥ أي من الجداول الآتية يمثل تغيرًا طرديًا بين س ، ص ؟ (المتعدية ١٥)

| س | ص |
|----|----|
| ١٠ | ٩ |
| ٥ | ١٨ |

(د)

| س | ص |
|---|---|
| ٣ | ٦ |
| ٢ | ٩ |

(ج)

| س | ص |
|---|----|
| ٣ | ٢٠ |
| ٥ | ١٢ |

(ب)

| س | ص |
|---|----|
| ٢ | ٩ |
| ٤ | ١٨ |

(١)





١٦ إذا كان : $س^٢ = ٩$ فإن : (المتعدية ١٦)

- (١) $\frac{٩}{٢}$ (ب) $\frac{٣}{٢}$ (ج) $\frac{٢}{٣}$ (د) $\frac{٣}{٢}$

١٧ إذا كان : $\frac{س}{ص} = \frac{١}{٢} = \frac{س}{٢}$ فإن : (المتعدية ١٧)

- (١) ٢×٥ (ب) ٤٠ (ج) ١٠ (د) ٢×٥

١٨ الشكل البياني الذي يمثل التغير الطردي بين س ، ص هو : (المتعدية ١٨)



(17) $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4$

١٩ إذا كانت: $x^2 + \frac{1}{x} = 3$ فإن $x =$

(1) 30 سے 30 ہے (پ) 30 سے 30 ہے (ج) 2 سے 30 ہے (د) 30 سے 30 ہے

(الشرقية ٧٨)

٢٠ إذا كان : ح ص = ٥ فإن : ح ص = ٥٠

١- ٣ (١) ٣- ٥ (٢) ٣- ٦ (٣) ١- ٣ (٤)

(1A 2,4-dinitrophenol)

٢٦ الوسط المتناسب بين ٥ ، ٢٠ هو

$$V_{\pm} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad V_{\pm} = \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix} \quad V_{\pm} = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \quad V_{\pm} = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

(الفقرية ١٧)

۴۲ إذا كان: $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ، $\frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ فإن ج: ح =

$$\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \delta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \eta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \xi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

ثانياً الأسئلة المقالية

(أسوان ١٥)

❶ إذا كان: $\frac{1}{3} = \frac{s - 2ص}{s + 2ص}$ أوجد: $\frac{ص}{س}$

(۱۹ جلد)

٢ إذا كان : $\frac{س}{ص} = \frac{٢}{٣}$ أوجد قيمة النسبة : $\frac{٣س + ٢ص}{٦ص - س}$

(القاهرة ١٩٦٤)

٣ إذا كانت : ١ ، ب ، ح ، د كميات متناسبة فأثبت أن : $\frac{1-a}{1-b} = \frac{1+c}{1+d}$

(٢٠) الشيخ

٤ إذا كانت : ٢ ، ب ، ح ، د فى تناسب متسلسل أثبت أن : $\frac{2}{2+2\text{ح}} = \frac{1}{2+2\text{ب}}$

١٧٧٧

٥ أوجد العدد الذي إذا أُضيف إلى كل من الأعداد ٣ ، ٥ ، ٨ ، ١٢ فإنها تكون متناسبة.

(الحيزة ١٣)

٦ إذا كان: $\frac{١}{١-ب} = \frac{ح}{ح-ز}$ فاثبت أن: ١، ب، ح، ز كميات متناسبة.

سكندرية (١٦)

٧ إذا كان: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$ أثبت أن: $\frac{1}{3} = \frac{a+b-c}{a-b+c}$

القلبيوية (٩٦)

Ⓐ إذا كان $a : b : c = 1 : 2 : 3$ وكان $a + b + c = 25$ فأوجد قيمة كل من a ، b ، c

(الحيزة ١٨)

٩ إذا كان: $\frac{١}{٢} = \frac{٢}{٣} = \frac{٣}{٤}$ فأوجد: قيمة $\frac{١٢ - ٢٢ + ٥}{٥}$

(الجيزة ١٩)

١٠. أوجد العدد الذي إذا أُضيف إلى حدى النسبة ٧ : ١١ فإنها تصبح ٢ : ٣

(مطروح ۱۷)

١١ أوجد العدد الموجب الذي إذا أُضيف مربعه إلى حدى النسبة $5 : 11$ فإنها تصبح $3 : 5$

١٢ عددان صحيحان النسبة بينهما ٢ : ٣ ، وإذا أُضيف للأول ٧ وطُرِح من الثاني ١٢ صارت النسبة

(س سویف ۶۷)

بينهما ٥ : ٣ أوجد العددين.

(المذوقية ١٦)

١٣ إذا كانت : $\frac{س}{ص} = \frac{ع}{٧} = \frac{ع+ص}{٨}$ فأثبت أن : $٥ = \frac{س+ص+ع}{ع-س}$

(المذوقية ١٧)

١٤ إذا كان : $\frac{ع}{١-٢} = \frac{ص}{٢-٢} = \frac{س}{٢+١}$ فأثبت أن : $\frac{ع+ص+٢}{٦+١٢} = \frac{س+٢}{٢+١+١}$

(كفر الشيخ ٢٠)

١٥ إذا كان : $\frac{س+ع}{٦} = \frac{ع+ص}{٨} = \frac{س+ص}{٢}$ فأثبت أن : $\frac{١٧}{٥٠} = \frac{س+ص+ع}{ع+٢+ص+٢+س+٢}$

(الوادي الجديد ١٧)

١٦ إذا كان : $\frac{س+ع}{٧} = \frac{ع+ص}{٨} = \frac{س+ص}{٥}$ فأثبت أن : $\frac{ع}{٥} = \frac{ص}{٢} = \frac{س}{٢}$

(القاهرة ١٧)

١٧ إذا كانت ب وسطاً متناسباً بين ١ ، ح فأثبت أن : $\frac{١}{ح} = \frac{١+٢}{١+٢+١}$

(ج. سيناء ١٩)

١٨ إذا كانت : ص ٥٠ وكانت ص = ١٤ عندما س = ٤٢
 فأوجد : ١ العلاقة بين ص ، س ٢ قيمة ص عندما س = ٦٠

(القليوبية ١٣)

١٩ إذا كانت : ص ٥٠ وكانت ص = ٣ عندما س = ٢
 فأوجد : ١ العلاقة بين س ، ص ٢ قيمة ص عندما س = ١,٥

(كفر الشيخ ٢٠)

٢٠ إذا كانت : $\frac{س-٢١}{ع-٧} = \frac{ص}{ع}$ أثبت أن : ص ٥٠ ع

(الدقهلية ٢٠)

٢١ إذا كانت : س = ع + ٨ وكانت ع تتناسب عكسياً مع ص وكانت ع = ٢ عندما ص = ٣
 أوجد العلاقة بين : ص ، س ثم أوجد : قيمة ص عندما س = ٣

(كفر الشيخ ١٦)

٢٢ إذا كانت : ص = ١ + ب حيث ب تتغير عكسياً مع مربع س وكانت : ص = ٥ عندما س = ٢
 أوجد العلاقة بين : ص ، س ثم أوجد : قيمة ص عندما س = ٤

(الإسكندرية ١٩)

٢٣ إذا كانت : س^٤ - ١٤ س^٢ + ٤٩ = ٠ فأثبت أن : ص ٥٠ $\frac{١}{س}$

| | | | |
|---|---|---|---|
| ٦ | ٤ | ٢ | س |
| ٢ | ٣ | ٦ | ص |

٢٤ من بيانات الجدول المقابل

أجب عن الأسئلة الآتية :

٢ أوجد ثابت التناسب.

١ بيّن نوع التغير بين ص ، س

٤ أوجد قيمة س عندما ص = $٢\frac{٢}{٥}$

٣ أوجد قيمة ص عندما س = ٣

(دمياط ١٦)



ملخص الوحدة الثالثة الإحصاء

❖ مصادر جمع البيانات :

- مصادر أولية (ميدانية) : وهى المصادر التى يحصل منها الباحث على البيانات بشكل مباشر.
- مصادر ثانوية (تاريخية) : وهى المصادر التى يحصل منها الباحث على البيانات التى تم تجميعها وتسجيلها من قبل بواسطة آخرين.

❖ أساليب جمع البيانات :

- أسلوب الحصر الشامل : ويقوم على جمع البيانات حول الظاهرة محل الدراسة من جميع مفردات المجتمع الإحصائى ، ويستخدم لحصر جميع مفردات المجتمع.
- أسلوب العينات : ويقوم على جمع البيانات حول الظاهرة محل الدراسة من عينة ممثلة للمجتمع كله وإجراء البحث عليها ، ثم تعميم النتائج على المجتمع كله.

❖ العينات :

- العينة هى جزء صغير من مجتمع كبير تشبه المجتمع وتمثله.
- العينة غير العشوائية (العمدية) : هى عينة يتم فيها اختيار مفردات بعينها من مفردات المجتمع الإحصائى دون غيرها بحيث تناسب أهداف البحث.
- العينة العشوائية البسيطة : هى عينة تستخدم مع المجتمعات المتجانسة الغير مقسمة بطبيعتها إلى فئات أو طبقات.
- العينة العشوائية الطبقية : هى عينة تستخدم فى حالة المجتمعات الإحصائية غير المتجانسة المقسمة بطبيعتها إلى مجموعات نوعية تختلف فى الصفات.

$$\text{عدد مفردات الطبقة فى العينة} = \frac{\text{عدد مفردات الطبقة الكلى}}{\text{عدد مفردات المجتمع الكلى}} \times \text{عدد مفردات العينة}$$

«مع تقريب الناتج لأقرب وحدة»

❖ التشتت :

- التشتت هو مقياس يعبر عن مدى تجانس المجموعات.
- المدى لمجموعة من المفردات هو الفرق بين أكبر مفردة وأصغر مفردة فى المجموعة.

المعروف المجهول هو أن يكون المجهول بالمتغير المعطى في المعادلة من خلال المعادلة

المعروف المجهول هو أن يكون المجهول بالمتغير المعطى في المعادلة من خلال المعادلة

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{2} \quad \text{المعروف المجهول هو أن يكون المجهول بالمتغير المعطى في المعادلة من خلال المعادلة}$$

المعروف المجهول هو أن يكون المجهول بالمتغير المعطى في المعادلة من خلال المعادلة

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{2} \quad \text{المعروف المجهول هو أن يكون المجهول بالمتغير المعطى في المعادلة من خلال المعادلة}$$

المعروف المجهول هو أن يكون المجهول بالمتغير المعطى في المعادلة من خلال المعادلة

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{2} \quad \text{المعروف المجهول هو أن يكون المجهول بالمتغير المعطى في المعادلة من خلال المعادلة}$$



أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

١ أبسط وأسهل طرق قياس التشتت هو (الإسماعيلية ١٧)

(أ) الوسط الحسابي. (ب) المدى. (ج) المنوال. (د) الوسيط.

٢ المدى لمجموعة القيم : ٧ ، ٣ ، ٦ ، ٩ ، ٥ يساوى (كفر الشيخ ١٩)

(أ) ٣ (ب) ٦ (ج) ٤ (د) ١٢

٣ إذا كان : $\text{مح} (\text{س} - \overline{\text{س}}) = ٣٦$ لمجموعة من القيم عددها ٩ ، فإن الانحراف المعياري يساوى (الشرقية ٢٠)

(أ) ٢ (ب) ١٨ (ج) ٢٧ (د) ٤

٤ مصنع به ١٢٥ عاملاً وهم ٧٥ فنيًا ، ٥٠ مهندسًا ، وأخذت عينة طبقية حجمها ٥٠ فردًا تُمثل فيها كل طبقة بحسب حجمها فإن عدد المهندسين فى هذه العينة يساوى (المنوفية ١٦)

(أ) ٣٠ (ب) ٢٠ (ج) ٢٥ (د) ١٥

٥ القيمة الأكثر شيوعاً لمجموعة من القيم تسمى (المنوفية ١٨)

(أ) المدى. (ب) الوسيط. (ج) الوسط الحسابي. (د) المنوال.

٦ من المصادر الثانوية لجمع البيانات (الفيوم ١٢)

(أ) المقابلة الشخصية. (ب) الاستبيانات. (ج) قاعدة بيانات الموظفين. (د) الملاحظة والقياس.

٧ اختيار عينة من طبقات المجتمع الإحصائي تسمى بالعينة (الإسكندرية ١٤)

(أ) العشوائية. (ب) الطبقيّة. (ج) العمدية. (د) العنقودية.

٨ الفرق بين أكبر المفردات وأصغرها لمجموعة من المفردات يسمى (سوهاج ١٨)

(أ) المدى. (ب) الوسط الحسابي. (ج) الوسيط. (د) الانحراف المعياري.

٩ الوسط الحسابي لمجموعة القيم : ٧ ، ٣ ، ٦ ، ٩ ، ٥ يساوى (ش. سيناء ١٧)

(أ) ٣ (ب) ٦ (ج) ٤ (د) ١٢

(القاهرة ١٥)

- ١٠ أكثر المجموعات الآتية تشبهاً في المجموعة
 (أ) ٢٠ ، ٢٦ ، ٢٠ ، ١٧ ، ٢٨
 (ب) ١٩ ، ٢٧ ، ٢٦ ، ٢٥ ، ٢٩
 (ج) ٢٠ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ١٩ ، ٢٠
 (د) ٢٧ ، ٢٥ ، ١٩ ، ٢٩ ، ٢٥

(ج. سيناء ١٤)

- ١١ إذا كانت جميع المفردات متساوية في القيمة فإن
 (أ) $\bar{x} = \bar{y}$ ، $\bar{x} > \bar{y}$ ، $\bar{x} < \bar{y}$
 (ب) $\bar{x} = \bar{y}$
 (ج) $\bar{x} = \bar{y}$
 (د) $\bar{x} = \bar{y}$

(أ. ك. ١٤)

- ١٢ الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يسمى
 (أ) المدى
 (ب) الوسيط
 (ج) الانحراف المعياري
 (د) المنوال

(مطروح ١٠)

- ١٣ إذا كان الوسط الحسابي لمجموعة القيم ٢ ، ٥ ، ٨ ، ٧ ، ٦ يساوي ٦ فإن
 (أ) ٤
 (ب) ٦
 (ج) ٨
 (د) ٣٠

(الملود ٢٠)

- ١٤ أي من القيم الآتية للعدد س تجعل مدى مجموعة القيم : س ، ١٥ ، ٢٠ ، ٢٤ يساوي ١٤ ؟
 (أ) ٣٠
 (ب) ٢٥
 (ج) ١٩
 (د) ١٠

ثانياً الأسئلة المقالية

(دمياط ١٩)

- ١ احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم الآتية :
 ١٢ ، ١٣ ، ١٦ ، ١٨ ، ٢١

- ٢ الجدول التالي يمثل التوزيع التكراري لأعمار ١٠ أطفال :

| العمر بالسنوات | ٥ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٢ | المجموع |
|----------------|---|---|---|----|----|---------|
| عدد الأطفال | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١٠ |

(القاهرة ١٨)

احسب الانحراف المعياري للعمر بالسنوات.


- ٣ احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للتوزيع التكراري التالي :

| المجموعات | صفر - | - ٤ | - ٨ | - ١٢ | - ١٦ - ٢٠ | المجموع |
|-----------|-------|-----|-----|------|-----------|---------|
| التكرار | ٣ | ٤ | ٧ | ٢ | ٩ | ٢٥ |

(الغربية ١٧)

الامتحانات النهائية

في الجبر والإحصاء



نموذج ١

أجب عن الأسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ النقطة $(-3, 4)$ تقع في الربع

(أ) الأول. (ب) الثاني. (ج) الثالث. (د) الرابع.

٢ الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يسمى

(أ) المدى. (ب) الوسط الحسابي. (ج) الانحراف المعياري. (د) المنوال.

٣ إذا كان $2 = 4 - 2$ فإن $4 = 2$ =

(أ) $3 : 4$ (ب) $4 : 3$ (ج) $3 : 7$ (د) $4 : 7$

٤ إذا كان $2 = (-3)$ ، $9 = (-2)$ فإن $9 = (-3 \times 2)$ =

(أ) 6 (ب) 18 (ج) 11 (د) 7

٥ المدى لمجموعة القيم $7, 3, 6, 9, 5$ يساوي

(أ) 3 (ب) 4 (ج) 6 (د) 12

٦ إذا كانت 30 x وكانت $2 = 3$ عندما $8 = 3$ فإن $3 = 2$ عندما $3 = 2$ =

(أ) 16 (ب) 12 (ج) 24 (د) 6

٢ (أ) إذا كان $3 = 2$ فإن $2 = 3$ فافوجد :

(أ) $3 = 2$ (ب) $2 = 3$

(ب) إذا كانت $2, 3, 4, 5$ ، $6, 7, 8, 9$ فثبت أن : $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$

٣ (أ) إذا كانت $2 = 3$ ، $4 = 5$ وكانت $6, 7, 8, 9$ فثبت أن : $10 = 11$ وكانت $12 = 13$ فثبت أن : $14 = 15$

حيث $12 = 13$ تعني أن $12 = 13$ لكل $12 = 13$ ، $13 = 14$ ، $14 = 15$ ، $15 = 16$ ، $16 = 17$ ، $17 = 18$ ، $18 = 19$ ، $19 = 20$ ، $20 = 21$ ، $21 = 22$ ، $22 = 23$ ، $23 = 24$ ، $24 = 25$ ، $25 = 26$ ، $26 = 27$ ، $27 = 28$ ، $28 = 29$ ، $29 = 30$ ، $30 = 31$ ، $31 = 32$ ، $32 = 33$ ، $33 = 34$ ، $34 = 35$ ، $35 = 36$ ، $36 = 37$ ، $37 = 38$ ، $38 = 39$ ، $39 = 40$ ، $40 = 41$ ، $41 = 42$ ، $42 = 43$ ، $43 = 44$ ، $44 = 45$ ، $45 = 46$ ، $46 = 47$ ، $47 = 48$ ، $48 = 49$ ، $49 = 50$ ، $50 = 51$ ، $51 = 52$ ، $52 = 53$ ، $53 = 54$ ، $54 = 55$ ، $55 = 56$ ، $56 = 57$ ، $57 = 58$ ، $58 = 59$ ، $59 = 60$ ، $60 = 61$ ، $61 = 62$ ، $62 = 63$ ، $63 = 64$ ، $64 = 65$ ، $65 = 66$ ، $66 = 67$ ، $67 = 68$ ، $68 = 69$ ، $69 = 70$ ، $70 = 71$ ، $71 = 72$ ، $72 = 73$ ، $73 = 74$ ، $74 = 75$ ، $75 = 76$ ، $76 = 77$ ، $77 = 78$ ، $78 = 79$ ، $79 = 80$ ، $80 = 81$ ، $81 = 82$ ، $82 = 83$ ، $83 = 84$ ، $84 = 85$ ، $85 = 86$ ، $86 = 87$ ، $87 = 88$ ، $88 = 89$ ، $89 = 90$ ، $90 = 91$ ، $91 = 92$ ، $92 = 93$ ، $93 = 94$ ، $94 = 95$ ، $95 = 96$ ، $96 = 97$ ، $97 = 98$ ، $98 = 99$ ، $99 = 100$ ، $100 = 101$ ، $101 = 102$ ، $102 = 103$ ، $103 = 104$ ، $104 = 105$ ، $105 = 106$ ، $106 = 107$ ، $107 = 108$ ، $108 = 109$ ، $109 = 110$ ، $110 = 111$ ، $111 = 112$ ، $112 = 113$ ، $113 = 114$ ، $114 = 115$ ، $115 = 116$ ، $116 = 117$ ، $117 = 118$ ، $118 = 119$ ، $119 = 120$ ، $120 = 121$ ، $121 = 122$ ، $122 = 123$ ، $123 = 124$ ، $124 = 125$ ، $125 = 126$ ، $126 = 127$ ، $127 = 128$ ، $128 = 129$ ، $129 = 130$ ، $130 = 131$ ، $131 = 132$ ، $132 = 133$ ، $133 = 134$ ، $134 = 135$ ، $135 = 136$ ، $136 = 137$ ، $137 = 138$ ، $138 = 139$ ، $139 = 140$ ، $140 = 141$ ، $141 = 142$ ، $142 = 143$ ، $143 = 144$ ، $144 = 145$ ، $145 = 146$ ، $146 = 147$ ، $147 = 148$ ، $148 = 149$ ، $149 = 150$ ، $150 = 151$ ، $151 = 152$ ، $152 = 153$ ، $153 = 154$ ، $154 = 155$ ، $155 = 156$ ، $156 = 157$ ، $157 = 158$ ، $158 = 159$ ، $159 = 160$ ، $160 = 161$ ، $161 = 162$ ، $162 = 163$ ، $163 = 164$ ، $164 = 165$ ، $165 = 166$ ، $166 = 167$ ، $167 = 168$ ، $168 = 169$ ، $169 = 170$ ، $170 = 171$ ، $171 = 172$ ، $172 = 173$ ، $173 = 174$ ، $174 = 175$ ، $175 = 176$ ، $176 = 177$ ، $177 = 178$ ، $178 = 179$ ، $179 = 180$ ، $180 = 181$ ، $181 = 182$ ، $182 = 183$ ، $183 = 184$ ، $184 = 185$ ، $185 = 186$ ، $186 = 187$ ، $187 = 188$ ، $188 = 189$ ، $189 = 190$ ، $190 = 191$ ، $191 = 192$ ، $192 = 193$ ، $193 = 194$ ، $194 = 195$ ، $195 = 196$ ، $196 = 197$ ، $197 = 198$ ، $198 = 199$ ، $199 = 200$ ، $200 = 201$ ، $201 = 202$ ، $202 = 203$ ، $203 = 204$ ، $204 = 205$ ، $205 = 206$ ، $206 = 207$ ، $207 = 208$ ، $208 = 209$ ، $209 = 210$ ، $210 = 211$ ، $211 = 212$ ، $212 = 213$ ، $213 = 214$ ، $214 = 215$ ، $215 = 216$ ، $216 = 217$ ، $217 = 218$ ، $218 = 219$ ، $219 = 220$ ، $220 = 221$ ، $221 = 222$ ، $222 = 223$ ، $223 = 224$ ، $224 = 225$ ، $225 = 226$ ، $226 = 227$ ، $227 = 228$ ، $228 = 229$ ، $229 = 230$ ، $230 = 231$ ، $231 = 232$ ، $232 = 233$ ، $233 = 234$ ، $234 = 235$ ، $235 = 236$ ، $236 = 237$ ، $237 = 238$ ، $238 = 239$ ، $239 = 240$ ، $240 = 241$ ، $241 = 242$ ، $242 = 243$ ، $243 = 244$ ، $244 = 245$ ، $245 = 246$ ، $246 = 247$ ، $247 = 248$ ، $248 = 249$ ، $249 = 250$ ، $250 = 251$ ، $251 = 252$ ، $252 = 253$ ، $253 = 254$ ، $254 = 255$ ، $255 = 256$ ، $256 = 257$ ، $257 = 258$ ، $258 = 259$ ، $259 = 260$ ، $260 = 261$ ، $261 = 262$ ، $262 = 263$ ، $263 = 264$ ، $264 = 265$ ، $265 = 266$ ، $266 = 267$ ، $267 = 268$ ، $268 = 269$ ، $269 = 270$ ، $270 = 271$ ، $271 = 272$ ، $272 = 273$ ، $273 = 274$ ، $274 = 275$ ، $275 = 276$ ، $276 = 277$ ، $277 = 278$ ، $278 = 279$ ، $279 = 280$ ، $280 = 281$ ، $281 = 282$ ، $282 = 283$ ، $283 = 284$ ، $284 = 285$ ، $285 = 286$ ، $286 = 287$ ، $287 = 288$ ، $288 = 289$ ، $289 = 290$ ، $290 = 291$ ، $291 = 292$ ، $292 = 293$ ، $293 = 294$ ، $294 = 295$ ، $295 = 296$ ، $296 = 297$ ، $297 = 298$ ، $298 = 299$ ، $299 = 300$ ، $300 = 301$ ، $301 = 302$ ، $302 = 303$ ، $303 = 304$ ، $304 = 305$ ، $305 = 306$ ، $306 = 307$ ، $307 = 308$ ، $308 = 309$ ، $309 = 310$ ، $310 = 311$ ، $311 = 312$ ، $312 = 313$ ، $313 = 314$ ، $314 = 315$ ، $315 = 316$ ، $316 = 317$ ، $317 = 318$ ، $318 = 319$ ، $319 = 320$ ، $320 = 321$ ، $321 = 322$ ، $322 = 323$ ، $323 = 324$ ، $324 = 325$ ، $325 = 326$ ، $326 = 327$ ، $327 = 328$ ، $328 = 329$ ، $329 = 330$ ، $330 = 331$ ، $331 = 332$ ، $332 = 333$ ، $333 = 334$ ، $334 = 335$ ، $335 = 336$ ، $336 = 337$ ، $337 = 338$ ، $338 = 339$ ، $339 = 340$ ، $340 = 341$ ، $341 = 342$ ، $342 = 343$ ، $343 = 344$ ، $344 = 345$ ، $345 = 346$ ، $346 = 347$ ، $347 = 348$ ، $348 = 349$ ، $349 = 350$ ، $350 = 351$ ، $351 = 352$ ، $352 = 353$ ، $353 = 354$ ، $354 = 355$ ، $355 = 356$ ، $356 = 357$ ، $357 = 358$ ، $358 = 359$ ، $359 = 360$ ، $360 = 361$ ، $361 = 362$ ، $362 = 363$ ، $363 = 364$ ، $364 = 365$ ، $365 = 366$ ، $366 = 367$ ، $367 = 368$ ، $368 = 369$ ، $369 = 370$ ، $370 = 371$ ، $371 = 372$ ، $372 = 373$ ، $373 = 374$ ، $374 = 375$ ، $375 = 376$ ، $376 = 377$ ، $377 = 378$ ، $378 = 379$ ، $379 = 380$ ، $380 = 381$ ، $381 = 382$ ، $382 = 383$ ، $383 = 384$ ، $384 = 385$ ، $385 = 386$ ، $386 = 387$ ، $387 = 388$ ، $388 = 389$ ، $389 = 390$ ، $390 = 391$ ، $391 = 392$ ، $392 = 393$ ، $393 = 394$ ، $394 = 395$ ، $395 = 396$ ، $396 = 397$ ، $397 = 398$ ، $398 = 399$ ، $399 = 400$ ، $400 = 401$ ، $401 = 402$ ، $402 = 403$ ، $403 = 404$ ، $404 = 405$ ، $405 = 406$ ، $406 = 407$ ، $407 = 408$ ، $408 = 409$ ، $409 = 410$ ، $410 = 411$ ، $411 = 412$ ، $412 = 413$ ، $413 = 414$ ، $414 = 415$ ، $415 = 416$ ، $416 = 417$ ، $417 = 418$ ، $418 = 419$ ، $419 = 420$ ، $420 = 421$ ، $421 = 422$ ، $422 = 423$ ، $423 = 424$ ، $424 = 425$ ، $425 = 426$ ، $426 = 427$ ، $427 = 428$ ، $428 = 429$ ، $429 = 430$ ، $430 = 431$ ، $431 = 432$ ، $432 = 433$ ، $433 = 434$ ، $434 = 435$ ، $435 = 436$ ، $436 = 437$ ، $437 = 438$ ، $438 = 439$ ، $439 = 440$ ، $440 = 441$ ، $441 = 442$ ، $442 = 443$ ، $443 = 444$ ، $444 = 445$ ، $445 = 446$ ، $446 = 447$ ، $447 = 448$ ، $448 = 449$ ، $449 = 450$ ، $450 = 451$ ، $451 = 452$ ، $452 = 453$ ، $453 = 454$ ، $454 = 455$ ، $455 = 456$ ، $456 = 457$ ، $457 = 458$ ، $458 = 459$ ، $459 = 460$ ، $460 = 461$ ، $461 = 462$ ، $462 = 463$ ، $463 = 464$ ، $464 = 465$ ، $465 = 466$ ، $466 = 467$ ، $467 = 468$ ، $468 = 469$ ، $469 = 470$ ، $470 = 471$ ، $471 = 472$ ، $472 = 473$ ، $473 = 474$ ، $474 = 475$ ، $475 = 476$ ، $476 = 477$ ، $477 = 478$ ، $478 = 479$ ، $479 = 480$ ، $480 = 481$ ، $481 = 482$ ، $482 = 483$ ، $483 = 484$ ، $484 = 485$ ، $485 = 486$ ، $486 = 487$ ، $487 = 488$ ، $488 = 489$ ، $489 = 490$ ، $490 = 491$ ، $491 = 492$ ، $492 = 493$ ، $493 = 494$ ، $494 = 495$ ، $495 = 496$ ، $496 = 497$ ، $497 = 498$ ، $498 = 499$ ، $499 = 500$ ، $500 = 501$ ، $501 = 502$ ، $502 = 503$ ، $503 = 504$ ، $504 = 505$ ، $505 = 506$ ، $506 = 507$ ، $507 = 508$ ، $508 = 509$ ، $509 = 510$ ، $510 = 511$ ، $511 = 512$ ، $512 = 513$ ، $513 = 514$ ، $514 = 515$ ، $515 = 516$ ، $516 = 517$ ، $517 = 518$ ، $518 = 519$ ، $519 = 520$ ، $520 = 521$ ، $521 = 522$ ، $522 = 523$ ، $523 = 524$ ، $524 = 525$ ، $525 = 526$ ، $526 = 527$ ، $527 = 528$ ، $528 = 529$ ، $529 = 530$ ، $530 = 531$ ، $531 = 532$ ، $532 = 533$ ، $533 = 534$ ، $534 = 535$ ، $535 = 536$ ، $536 = 537$ ، $537 = 538$ ، $538 = 539$ ، $539 = 540$ ، $540 = 541$ ، $541 = 542$ ، $542 = 543$ ، $543 = 544$ ، $544 = 545$ ، $545 = 546$ ، $546 = 547$ ، $547 = 548$ ، $548 = 549$ ، $549 = 550$ ، $550 = 551$ ، $551 = 552$ ، $552 = 553$ ، $553 = 554$ ، $554 = 555$ ، $555 = 556$ ، $556 = 557$ ، $557 = 558$ ، $558 = 559$ ، $559 = 560$ ، $560 = 561$ ، $561 = 562$ ، $562 = 563$ ، $563 = 564$ ، $564 = 565$ ، $565 = 566$ ، $566 = 567$ ، $567 = 568$ ، $568 = 569$ ، $569 = 570$ ، $570 = 571$ ، $571 = 572$ ، $572 = 573$ ، $573 = 574$ ، $574 = 575$ ، $575 = 576$ ، $576 = 577$ ، $577 = 578$ ، $578 = 579$ ، $579 = 580$ ، $580 = 581$ ، $581 = 582$ ، $582 = 583$ ، $583 = 584$ ، $584 = 585$ ، $585 = 586$ ، $586 = 587$ ، $587 = 588$ ، $588 = 589$ ، $589 = 590$ ، $590 = 591$ ، $591 = 592$ ، $592 = 593$ ، $593 = 594$ ، $594 = 595$ ، $595 = 596$ ، $596 = 597$ ، $597 = 598$ ، $598 = 599$ ، $599 = 600$ ، $600 = 601$ ، $601 = 602$ ، $602 = 603$ ، $603 = 604$ ، $604 = 605$ ، $605 = 606$ ، $606 = 607$ ، $607 = 608$ ، $608 = 609$ ، $609 = 610$ ، $610 = 611$ ، $611 = 612$ ، $612 = 613$ ، $613 = 614$ ، $614 = 615$ ، $615 = 616$ ، $616 = 617$ ، $617 = 618$ ، $618 = 619$ ، $619 = 620$ ، $620 = 621$ ، $621 = 622$ ، $622 = 623$ ، $623 = 624$ ، $624 = 625$ ، $625 = 626$ ، $626 = 627$ ، $627 = 628$ ، $628 = 629$ ، $629 = 630$ ، $630 = 631$ ، $631 = 632$ ، $632 = 633$ ، $633 = 634$ ، $634 = 635$ ، $635 = 636$ ، $636 = 637$ ، $637 = 638$ ، $638 = 639$ ، $639 = 640$ ، $640 = 641$ ، $641 = 642$ ، $642 = 643$ ، $643 = 644$ ، $644 = 645$ ، $645 = 646$ ، $646 = 647$ ، $647 = 648$ ، $648 = 649$ ، $649 = 650$ ، $650 = 651$ ، $651 = 652$ ، $652 = 653$ ، $653 = 654$ ، $654 = 655$ ، $655 = 656$ ، $656 = 657$ ، $657 = 658$ ، $658 = 659$ ، $659 = 660$ ، $660 = 661$ ، $661 = 662$ ، $662 = 663$ ، $663 = 664$ ، $664 = 665$ ، $665 = 666$ ، $666 = 667$ ، $667 = 668$ ، $668 = 669$ ، $669 = 670$ ، $670 = 671$ ، $671 = 672$ ، $672 = 673$ ، $673 = 674$ ، $674 = 675$ ، $675 = 676$ ، $676 = 677$ ، $677 = 678$ ، $678 = 679$ ، $679 = 680$ ، $680 = 681$ ، $681 = 682$ ، $682 = 683$ ، $683 = 684$ ، $684 = 685$ ، $685 = 686$ ، $686 = 687$ ، $687 = 688$ ، $688 = 689$ ، $689 = 690$ ، $690 = 691$ ، $691 = 692$ ، $692 = 693$ ، $693 = 694$ ، $694 = 695$ ، $695 = 696$ ، $696 = 697$ ، $697 = 698$ ، $698 = 699$ ، $699 = 700$ ، $700 = 701$ ، $701 = 702$ ، $702 = 703$ ، $703 = 704$ ، $704 = 705$ ، $705 = 706$ ، $706 = 707$ ، $707 = 708$ ، $708 = 709$ ، $709 = 710$ ، $710 = 711$ ، $711 = 712$ ، $712 = 713$ ، $713 = 714$ ، $714 = 715$ ، $715 = 716$ ، $716 = 717$ ، $717 = 718$ ، $718 = 719$ ، $719 = 720$ ، $720 = 721$ ، $721 = 722$ ، $722 = 723$ ، $723 = 724$ ، $724 = 725$ ، $725 = 726$ ، $726 = 727$ ، $727 = 728$ ، $728 = 729$ ، $729 = 730$ ، $730 = 731$ ، $731 = 732$ ، $732 = 733$ ، $733 = 734$ ، $734 = 735$ ، $735 = 736$ ، $736 = 737$ ، $737 = 738$ ، $738 = 739$ ، $739 = 740$ ، $740 = 741$ ، $741 = 742$ ، $742 = 743$ ، $743 = 744$ ، $744 = 745$ ، $745 = 746$ ، $746 = 747$ ، $747 = 748$ ، $748 = 749$ ، $749 = 750$ ، $750 = 751$ ، $751 = 752$ ، $752 = 753</$

٤ (١) إذا كانت $s = \{1, 3, 5\}$ وكانت f دالة على s

وكان بيان $f = \{(1, 2), (3, 1), (5, 1)\}$ فأوجد :

١ مدى الدالة. ٢ القيمة العددية للمقدار $f + 1$

(ب) إذا كانت $s = \frac{1}{s}$ وكانت $s = 3$ عندما $s = 2$ فأوجد :

١ العلاقة بين s ، s ٢ قيمة s عندما $s = 1.5$

٥ (١) مثل بياناً منحنى الدالة d حيث $d(s) = (s - 3)^2$ متخذاً $s \in [0, 6]$

ومن الرسم استنتج نقطة رأس المنحنى والقيمة الصغرى للدالة ومعادلة محور التماثل.

(ب) احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم : ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩

نموذج ٢

أجب عن الاسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ النقطة $(2, 4)$ تقع في الربع

(١) الأول. (ب) الثاني. (ج) الثالث. (د) الرابع.

٢ من مقاييس التشتت

(١) الوسيط. (ب) الوسط الحسابي. (ج) الانحراف المعياري. (د) النوال.

٣ الثالث متناسب للعددين ٣ ، ٦ هو

(١) $\frac{1}{3}$ (ب) ٩ (ج) ٢ (د) ١٢

٤ إذا كان $s = 2$ ، $s = (s \times s) = 6$ فإن $s = (s^2) = \dots$

(١) ٤ (ب) ٩ (ج) ١٦ (د) ١٢

٥ المدى لمجموعة القيم : ٧ ، ٣ ، ٦ ، ٩ ، ٥ يساوى

(١) ٣ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ١٢

٦ إذا كان $s = 7$ فإن $s = \dots$

(١) $\frac{1}{s}$ (ب) $s - 7$ (ج) s (د) $s + 7$

٢ (أ) إذا كانت: $S = \{0, 2\}$ ، $S = \{1, 2\}$ ، $E = \{2\}$ فأوجد:

$$E \times (S \cap S) \quad (S \times E)$$

(ب) إذا كانت: S وسطاً متناسباً بين ١ و ٤ ، فأثبت أن: $\frac{S-1}{S+1} = \frac{S-1}{S+1}$

٣ (أ) إذا كانت: $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ، $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ وكانت E علاقة معرف

من S إلى S حيث E تعني أن $a = b + 1$ لكل $a \in S$ ، $b \in S$

١ اكتب بيان E ومثلها بمخطط سهمي. ٢ بين أن E دالة.

(ب) إذا كانت: $S = 15$ ، $S = 3$ أوجد قيمة: $\frac{S-1}{S+1}$

٤ (أ) إذا كانت: $S = (S) = 4$ ، $S + b$ وكانت: $d = (2) = 15$ أوجد قيمة S

(ب) إذا كانت: $S = 30$ وكانت: $S = 6$ عندما $S = 3$ فأوجد:

١ العلاقة بين S ، S ٢ قيمة S عندما $S = 5$

٥ (أ) مثل بيانياً منحنى الدالة d حيث $d = (S) = 4 - S^2$ متخذاً من $[-2, 2]$

ومن الرسم استنتج نقطة رأس المنحنى والقيمة العظمى للدالة ومعادلة محور التماثل.

(ب) الجدول الآتي يمثل عدد الأطفال في ١٠٠ أسرة في إحدى المدن:

| عدد الأطفال (س) | صفر | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | المجموع |
|-----------------|-----|----|----|----|----|---------|
| عدد الأسر (ص) | ٦ | ١٥ | ٤٠ | ٢٥ | ١٤ | ١٠٠ |

احسب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري.

نموذج امتحان للطلاب المدمجين

أجب عن الاسئلة الآتية :

١ أكمل ما يأتي :

١ النقطة (٥ ، ٣) تقع في الربع

٢ الدالة $د : د = (س) = س^2 + ٨$ تسمى دالة كثيرة حدود من الدرجة

٣ المدى لمجموعة القيم : ٤ ، ١٤ ، ٢٥ ، ٣٤ هو

٤ إذا كان : $ص = ٢س$ فإن : $ص = ٥٥$

٥ إذا كانت : $س = \{٢ ، ٤ ، ٦\}$ فإن : $س(س^2) =$

٦ إذا كان : $(٣ ، ٩) = (٢ ، ٦)$ فإن : $٢ + ٦ =$

٢ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان : $س = ٧$ فإن : $ص = ٥٥$

(أ) $\frac{١}{س}$ (ب) $س - ٧$ (ج) $س$ (د) $س + ٧$

٢ إذا كانت : ٢ ، ٢ ، ٦ ، $س$ كميات متناسبة فإن : $س =$

(أ) ٩ (ب) ١٨ (ج) ١٢ (د) ٣

٣ إذا كان : $٢٢ = ٥س$ فإن : $\frac{١}{س} =$

(أ) $\frac{٥}{٢}$ (ب) $\frac{٢}{٥}$ (ج) $\frac{٢}{٥}$ (د) $\frac{٥}{٢}$

٤ من مقاييس التشتت

(أ) الوسط الحسابي. (ب) المدى.

(ج) المنوال. (د) الوسيط.

٥ إذا كان : $س(س) = ٥$ ، $س(س \times ص) = ١٠$ فإن : $س(ص) =$

(أ) ٤ (ب) ٣ (ج) ٢ (د) ١

٦ إذا كانت : $س = \{١\}$ فإن : $س^2 =$

(أ) ١ (ب) (١ ، ١) (ج) $\{(١ ، ١)\}$ (د) $\{١\}$

٣ ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ :

١ إذا كان بيان الدالة $d = \{(3, 2), (4, 2), (3, 1)\}$

فإن مجال الدالة $d = \{2, 2, 1\}$

٢ إذا كانت : ص \propto س وكانت : ص = 6 عندما س = 3 فإن : ص = 2 عندما س = 4

٣ إذا كان : مح (س - س) $^2 = 36$ لمجموعة من القيم عددها يساوي 9 فإن : $\sigma = 4$


٤ نقطة تقاطع المستقيم الذي يمثل الدالة $d : د (س) = س + 2$ مع محور السينات

هي النقطة $(-2, 0)$

٥ إذا كانت $d : س \leftarrow ص$ فإن س تسمى المجال لهذه الدالة.


٦ المخطط السهمي المقابل يمثل دالة

من س إلى ص



٤ صل من العمود (أ) بما يناسبه من العمود (ب) :

| العمود (ب) | العمود (أ) |
|------------|---|
| ٦ | ١ إذا كان $\{4, 1\} \times \{س, 2\} \ni (4, 1)$ فإن : س = |
| ١ | ٢ إذا كانت دالة د حيث $d (س) = س - 4$ يمثلها بيانياً مستقيم يمر بالنقطة $(2, 4)$ فإن : 4 = |
| ١٠ | ٣ $\frac{.....}{16} = \frac{4}{8} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ |
| $6 \pm$ | ٤ إذا كانت : د $(س) = 5$ فإن : د $(5) + د (5-) =$ |
| ٢ | ٥ الوسط المتناسب للعددين 4 ، 9 هو |
| ٨ | ٦ في الشكل المقابل : معادلة خط التماثل للمنحنى هي : س = |





محافظة القاهرة

١

أجب عن الاسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان : $(١ - س ، ٣ + س) = (٤ ، ٢ - س)$ فإن : $س + ١ =$

- (١) صفر (ب) ٢ (ج) ٥ (د) ١٠

٢ إذا كان : $س - س = ٥$ فإن : $٦ - س - ٦ =$

- (١) ٢٠ (ب) ١١ (ج) ١ (د) ١ -

٣ إذا كانت : $س ، ٣ ، ٤ ، ٦$ كميات متناسبة فإن : $س =$

- (١) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

٤ $[٥ ، ٢] \cup \{٣\} =$

- (١) \emptyset (ب) $\{٣\}$ (ج) $[٥ ، ٢[$ (د) $[٥ ، ٣]$

٥ الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يسمى

- (١) المدى. (ب) الانحراف المعياري. (ج) الوسيط. (د) الوسط الحسابي.

٦ إذا كانت : $س^٢ = ٢٥$ حيث $س \in \mathbb{R}$ فإن : $س =$

- (١) ٥ (ب) ٥ - (ج) $٥ \pm$ (د) ٢٥ -

٢ (١) إذا كانت : $س = \{٢\}$ ، $ص = \{٢ ، ٤ ، ٥\}$

أوجد : ١ $س \times ص$ ٢ $ص \cap (ص)^٢$ ٣ $س^٢$

(ب) إذا كان : $\frac{٢}{٥} = \frac{١}{س}$ فأوجد قيمة : $\frac{س^٢ + ١٧}{س^٢ + ٢٤}$ في أبسط صورة.

٣ (١) إذا كانت : $ص \propto \frac{١}{س}$ وكانت $ص = ٣$ عندما $س = ٢$

أوجد : ١ العلاقة بين $ص$ ، $س$ ٢ قيمة $ص$ عندما $س = ١ ، ٥$

(ب) إذا كانت : $س = \{١ ، ٣ ، ٤ ، ٥\}$ ، $ص = \{٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦\}$ وكانت $ك$ علاقة من

$س$ إلى $ص$ حيث « $ك$ $س$ » تعني أن « $٧ = س + ك$ » لكل $س \in س$ ، $ك \in ص$

اكتب بيان $ك$ ومثلها بمخطط سهمي. هل $ك$ دالة أم لا مع ذكر السبب ؟

٤ (١) فيما يلي توزيع تكرارى يبين أعمار ١٠ أطفال :

| العمر بالسنوات | ٥ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٢ | المجموع |
|----------------|---|---|---|----|----|---------|
| عدد الأطفال | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١٠ |

احسب الانحراف المعياري للعمر بالسنوات.


(ب) مثل بيانياً الدالة التربيعية د حيث د (س) = $س^2 + ٢س - ٤$ متخذاً س $\in [-٤, ٢]$ ومن الرسم أوجد :

١ إيجاد رأس منحنى الدالة. ٢ معادلة محور التماثل.

٥ (١) إذا كانت س وسطاً متناسباً بين ٢ و ٤ ، أثبت أن : $\frac{١}{س} = \frac{٢+٢}{٢س+٢س}$

(ب) إذا كانت : د (س) = $س^2 - ٢س$ ، س (س) = $س - ٢$

١ أثبت أن : د (٢) = س (٢) ٢ إذا كانت : س (٤) = ٧ أوجد : قيمة د



محافظة الجيزة

٢

أجب عن الأسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان : س \in ح وكان : $١ < س < ٢$ فإن : (١ - س) \in ٢

(١) ٨ ، ٢ (ب) ٨ ، ٢ (ج) ٨ ، ٢ (د) ٨ ، ٢

٢ المدى لمجموعة القيم : ٧ ، ٣ ، ٦ ، ٥ ، ٩ يساوى

(١) ٣ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ١٢

٣ نصف العدد ٢٠٤ يساوى

(١) ٢٠٢ (ب) ٣٩٢ (ج) ٢٩٢ (د) ١٩٤

٤ إذا كانت : س ، ص مجموعتين غير خاليتين وكان : س (س) = ٤ ، س (س) = ٦

فإن : س (س) = ٥

(١) ٤ (ب) ٩ (ج) ١٦ (د) ١٢

٥ إذا كان : $٢ \times \frac{١}{٣} = \frac{١}{٣}$ فإن : س = ٦

(١) ٢ - (ب) ١ (ج) $\frac{١}{٣}$ (د) ٢

٦ إذا كان : س = ص = ٧ فإن : ص \in ٧

(١) $\frac{١}{س}$ (ب) س - ٧ (ج) س (د) س + ٧

٢ (١) إذا كان : $(س + ٢, ٩) = (٥, ص)$ أوجد : قيم $س, ص$

(ب) إذا كانت : $ص \propto \frac{١}{س}$ وكانت $ص = ٤$ عندما $س = ٢$

أوجد : (١) العلاقة بين $س, ص$ (٢) قيمة $ص$ عندما $س = ٨$


٢ (١) إذا كانت : $س = \{٠, ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦\}$ وكانت $ع$ علاقة على $س$

حيث «١» $ع$ «٢» تعني أن «١» ضعف «٢» لكل $١ \in س, ٢ \in س$

(١) اكتب بيان العلاقة $ع$ وبين ما إذا كانت دالة أم لا. (٢) هل «٢» $ع$ «٤» ؟

(٢) أوجد قيمة $س$ إذا كان «٦» $ع$ «٣»

(ب) إذا كانت $ب$ وسطاً متناسباً بين $٩, ح$ أثبت أن : $\frac{ب-٩}{ب+٩} = \frac{ب-١}{ب+١}$



٤ (١) الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة $د$

حيث $د(س) = م - س^٢$

فإذا كان : $١ = ٤$ وحدات.

أوجد : (١) قيمة $م$

(٢) إحداثي كل من النقطتين $ب, ح$

(٣) مساحة سطح المثلث الذي رؤوسه النقط $٩, ب, ح$

(ب) إذا كانت الدالة $د : ح \rightarrow ح$ حيث $د(س) = ٢س + ١$ وكانت : $د(٢) = ٩$

فأوجد : (١) قيمة ١

(٢) إحداثي نقطة تقاطع المستقيم الذي يمثل الدالة $د$ مع محور السينات.

٥ (١) إذا كان : $\frac{س}{٢} = \frac{ص}{٣} = \frac{ع}{٤} = \frac{٢س - ص + ٥}{٣م}$ فأوجد : قيمة $م$

(ب) احسب الانحراف المعياري للقيم : $٤, ٨, ١٢, ١٠, ٦$



محافظة الإسكندرية

٣

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(١) إذا كان : $(٥, ٣) \in \{٢, ٦\} \times \{س, ٨\}$ فإن : $س = \dots$

(١) ٨ (ب) ٦ (ج) ٥ (د) ٢

(٢) ربع العدد ٨٢ هو

(١) ٦٢ (ب) ١٠٢ (ج) $(\frac{١}{٢})^٤$ (د) $(\frac{١}{٢})^٦$



محافظة القليوبية

٤

أجب عن الاسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت النقطة (هـ ، ب - ٧) تقع على محور السينات فإن : ب =

٢ (١) ٥ (ب) ٧ (ج) ١٢ (د)

٢ إذا كانت : د (س) = ٧ فإن : د (٧) + د (٧-) =

٣ (١) ٧ (ب) ٧- (ج) ١٤- (د)

٣ إذا كان : $\sqrt{27} - \sqrt{3} = \sqrt{24}$ فإن : س =

٩ (١) ٩- (ب) ٣ (ج) ٣- (د)

٤ إذا كان : $\frac{3}{4} = \frac{5}{x}$ فإن : ٨ - ٦ - ٤ + ٤ =

٣ (١) ٤ (ب) ٥ (ج) ٦ (د)

٥ إذا كانت : س = {٢} فإن : س = ٢ =

٤ (١) {٤} (ب) (٢ ، ٢) (ج) (٢ ، ٢) (د)

٦ الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يسمى

(١) الوسط الحسابي. (ب) المدى. (ج) الانحراف المعياري. (د) المتوسط.

٢ (١) إذا كانت ص تتغير عكسياً مع س ، وكانت ص = ٣ عندما س = ٢

١ أوجد : العلاقة بين س ، ص

٢ أوجد : قيمة ص عندما س = $\frac{3}{4}$ (ب) إذا كان : $\frac{1}{2} = \frac{3}{4} = \frac{5}{x}$ فأوجد : قيمة س

٣ (١) إذا كانت : س = {١ ، ٢ ، ٥} ، ص = {٢ ، ٤ ، ٥ ، ٦}

وكانت ك علاقة من س إلى ص حيث «ك» ب تعني أن «ب + ١ = ٧» لكل ١ \exists س ، ب \exists ص

١ اكتب بيان ك ومثلها بمخطط سهمي.

٢ هل ك دالة ؟ ولماذا ؟

(ب) إذا كانت ب وسطاً متناسباً بين ١ ، ح فثبت أن : $\frac{1}{b} = \frac{1}{c} = \frac{1}{a}$

٤ (١) إذا كانت : س × ص = { (١ ، ١) ، (٣ ، ١) ، (٥ ، ١) }

أوجد : ١ س ، ص ٢ ص × س

(ب) مثل بيانياً منحنى الدالة د حيث د (س) = ٢ - س^٢ متخذاً س \in [٢ ، -٢] ومن الرسم استنتج :

١ نقطة رأس المنحنى. ٢ القيمة العظمى للدالة. ٣ معادلة محور التماثل.

٥ (١) إذا كانت : $s = \{1, 2, 3, 4\}$ وكانت f دالة على s وكان بيان

$$f = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$$

أوجد : (١) مدى الدالة. (٢) القيمة العددية للمقدار $f + s$

(ب) أوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري للبيانات التالية :

| الفئة | صفر - | - ٢ | - ٤ | - ٦ | ٨ - ١٠ | المجموع |
|---------|-------|-----|-----|-----|--------|---------|
| التكرار | ١ | ٢ | ٦ | ٥ | ٥ | ٢٠ |



محافظة المنوفية

٥

أجب عن الاسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : $\frac{5}{4} = \frac{5}{s} + \frac{5}{t}$ فإن : $s = \dots$

(١) ٢ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) $\frac{5}{3}$

٢ إذا كانت : $s + s = s + s = ٥$ فإن : $s^2 + s + s^2 = \dots$

(١) ١٠ (ب) ١٥ (ج) ٢٠ (د) ٢٥

٣ إذا كانت : $١ < s < ٢$ ، $s \in \mathbb{R}$ فإن : $٢ - s - ١ \in \dots$

(١) $[٨, ٢]$ (ب) $[٨, ٢[$ (ج) $]٨, ٢[$ (د) $\{٨, ٢\}$

٤ إذا كانت : $\frac{2}{3} = \frac{s+1}{s-1}$ فإن : $\frac{2}{3} = \dots$

(١) $\frac{1}{8}$ (ب) ٨ (ج) $\frac{1}{8}$ (د) ٨-

٥ أى من القيم الآتية للعدد s تجعل مدى مجموعة القيم : $s, ١٥, ٢٠, ٢٤$ يساوى ١٤ ؟

(١) ٣٠ (ب) ٢٥ (ج) ١٩ (د) ١٠

٦ إذا كانت : $s \in \mathbb{R}$ فإن النقطة $(-s, \sqrt{s})$ تقع فى الربع

(١) الأول. (ب) الثانى. (ج) الثالث. (د) الرابع.

٢ (١) إذا كانت : $\{٢, ٤\} = s$ ، $\{٤, ٥\} = s$ ، $\{٦, ٥\} = s$

فاوجد : (١) $s \times (s \cap \mathbb{R})$ (٢) $(s - s) \times \mathbb{R}$ (٣) $s \cap \mathbb{R}$

(ب) إذا كانت : $٢, ٤, ٥, ٦$ فى تناسب متسلسل أثبت أن : $\frac{٢+١}{٢} = \frac{٤-١}{٤-٢}$

٢ (أ) إذا كانت: $S = \{-2, -1, 1, 2\}$ ، $V = \{8, \frac{1}{7}, -1, 1, -8\}$

وكانت g علاقة من S إلى V حيث « a » g « b » تعني أن « a » لكل $a \in S$ ، $b \in V$

١ اكتب بيان g ومثلها بمخطط سهمي.

٢ بين أن ع دالة وأوجد مداها.

(ب) إذا كان المستقيم الممثل للدالة d حيث $d: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ، $d(s) = 1 - s + \dots$ يقطع محور الصادات
في النقطة $(0, 1)$ وكانت $d(2) = 1$ أوجد: قيمة كل من 1 ، 2

٤ (أ) أوجد العدد الذي إذا أضيف مربعه إلى كل من حدى النسبة ٧ : ١١ فإنها تصبح ٤ : ٥

(ب) إذا كانت v تتغير عكسياً مع s وكانت $s = 3$ عندما $v = 4$

فأوجد: ١) العلاقة بين v ، s ٢) قيمة s عندما $v = 9$

5 (i) ارسم منحنى الدالة d حيث $d(s) = 1 - s^2$ متخذًا $s \in [-2, 2]$

ومن الرسم أوجد :

١ إحدائى نقطة رأس المنحنى. ٢ معادلة محور التماثل.

٣ مساحة المثلث الذي رؤوسه نقط تقاطع المنحنى مع المحورين.

(ب) التوزيع التكراري التالي يبين عدد أطفال بعض الأسر في إحدى المدن الجديدة :

| | | | | | |
|-------------|-----|----|----|----|---|
| عدد الأطفال | صفر | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
| عدد الأسر | ٨ | ١٦ | ٥٠ | ٢٠ | ٦ |

احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعدد الأطفال.



محافظة الغربية

7

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ الدالة د : ح ← ح حيث د (س) = س + ب تمثل دالة خطية بشرط ١ ∃

$$- \mathcal{L}(\cdot) - \{ \cdot \} - \mathcal{L}(\cdot) \quad + \mathcal{L}(\cdot) \quad \mathcal{L}(\cdot)$$

٢ الرابع المتناسب للأعداد ٤ ، ١٢ ، ١٦ هو

٢٤ (١) ٢٤ ± (٥) ٤٨ ± (٥) ٤٨ ± (٥)

٣] إذا كان الأجر الأسبوعي بالجنبيات لمجموعة من العمال في أحد المصانع هو ١٧٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ٢٣٠ ، ٢٤٠ فإن الأجر الوسيط يساوي

- (أ) ٢٠٠ (ب) ٧٠ (ج) ١٨٠ (د) ٢٠٥

٤] إذا كان : $ص^2 + ٦ = ٥$ ، $ص = ٥$ فإن : $(ص + ص) = ١$

- (أ) ١٦ (ب) $١٦ \pm$ (ج) ١١ (د) $١١ \pm$

٥] العلاقة التي تمثل تغيراً طردياً بين $ص$ ، $س$ هي

- (أ) $ص = ٥$ (ب) $ص = ٣ - س$ (ج) $\frac{ص}{٥} = \frac{س}{٣}$ (د) $\frac{س}{٣} = \frac{ص}{٤}$

٦] إذا كانت $س = \{١ ، ٣ ، ٥\}$ وكانت $ع$ دالة على $س$ وكان بيان $ع = \{(١ ، ١) ، (٣ ، ٢) ، (٥ ، ١)\}$ فإن القيمة العددية للمقدار : $٢ + ب =$

- (أ) ٤ (ب) ٦ (ج) ٨ (د) غير ذلك.

٢ (أ) إذا كانت : $س = \{-١ ، صفر ، ٢ ، ٣\}$ ، $ص = \{١ ، صفر ، \frac{١}{٣} ، \frac{١}{٤}\}$

، وكانت $ع$ علاقة من $س$ إلى $ص$ حيث «١ ع ب» تعني أن «العدد ١ هو المعكوس الضربي للعدد ب» لكل $١ \in س$ ، $\exists ب \in ص$ اكتب بيان $ع$ ومثلها بمخطط سهمي وبين هل $ع$ دالة أم لا ، ولماذا ؟

(ب) من بيانات الجدول المقابل أجب عن الأسئلة التالية :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ٦ | ٤ | ٢ | س |
| ٢ | ٣ | ٦ | ص |

١] بين نوع التغير بين $س$ ، $ص$

٢] أوجد ثابت التناسب.

٣] أوجد قيمة $ص$ عندما $س = ٣$

٣ (أ) إذا كانت : $١ ، ب ، ح ، د$ في تناسب متسلسل أثبت أن : $\frac{٢}{س + ح} = \frac{١}{س + ب}$

(ب) إذا كانت : $س = \{٦\}$ ، $ص = \{٢ ، ٣\}$ ، $ع = \{٢ ، ٥ ، ٦\}$

أوجد كلاً من : ١] $س(٢)$ ٢] $(ع - ص) \times (س \cap ع)$

٤ (أ) عدنان صحيحان النسبة بينهما ٢ : ٣ وإذا أضيف للأول ٧ وطرح من الثاني ١٢ صارت النسبة بينهما ٥ : ٣ أوجد العددين.

(ب) إذا كانت الدالة $د : د(س) = ٣ - س$ ٦ يمثلها خط مستقيم يمر بالنقطة $(٢ ، ٢)$

أوجد قيمة ١ ثم أوجد نقطة تقاطع الخط المستقيم مع محور الصادات.

٥ (أ) احسب الانحراف المعياري للبيانات الآتية : ١٦ ، ٢٢ ، ٥ ، ٢٠ ، ٢٧ (مقرباً الناتج لأقرب رقم عشري).

(ب) مثل بياناً الدالة $د : د(س) = (س - ٢)^2$ متخذاً $س \in [١ - ، ٥]$ ومن الرسم استنتج :

١] معادلة محور التماثل. ٢] القيمة العظمى أو الصغرى للدالة.



اجب عن الاسئلة الاتية ، (يسمح باستخدام الالة الحاسبة)

١ (١) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت النقطة (س - ٢ ، ٣ - س) تقع في الربع الرابع فإن : س =

٤ (١) ٣ (ب) ٢ (ج) ١ (د)

٢ إذا كانت : د (س) = له س + ٨ ، د (٢) = صفر فإن : له =

٨ (١) ٦ (ب) ٤ (ج) ٤ - (د)

٣ إذا كانت : ١ ، ٢ ، ٤ ، س في تناسب متسلسل فإن : س + ١ =

٢ (١) ٤ (ب) ٦ (ج) ٩ (د)

(ب) إذا كانت : س وسطاً متناسباً بين ٢ ، ح أثبت أن : $\frac{2}{1} = \frac{2-2}{2-2} = \frac{2-2}{2-2}$

٢ (١) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : ص س ، ص $\frac{1}{ع}$ فإن : ص س =

(١) س ع (ب) $\frac{ع}{س}$ (ج) $\frac{س}{ع}$ (د) س ع

٢ الانحراف المعياري للكميات ٥ ، ٥ ، ٥ ، ٥ يساوي

(١) صفر (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ٢

٣ الدالة د : د (س) = س^٢ - (س - ٣)^٢ من الدرجة

(١) صفر (ب) الأولى (ج) الثانية (د) الثالثة

(ب) إذا كانت النقطة (١ - ، ٢) تنتمي إلى منحنى الدالة د : د (س) = س^٢ - ٦ س + ح

أوجد : قيمة ح

٣ (١) إذا كان : ١٣ = ٤ = ٦ ح أوجد : ب : ح ثم أوجد القيمة العددية للمقدار : $\frac{2+2}{4+2}$

(ب) إذا كانت : س = { -٢ ، -١ ، ٠ ، ١ ، ٢ } وكانت ح علاقة على س حيث « ١ ح » تعني أن

« العدد ١ معكوس جمعي للعدد ب » لكل ١ س ، ب س

اكتب بيان ح ومثلها بمخطط سهمي ، وهل ح دالة أم لا ؟

٤ (١) إذا كانت : س = ع + ٨ وكانت ع تتناسب عكسياً مع ص وكانت ع = ٢ عند ص = ٣

أوجد : العلاقة بين ص ، س ثم أوجد : قيمة ص عندما س = ٣

(ب) إذا كانت : د (س) = ٢ س + ٥ ، د (س) = س - ٦ أثبت أن : د (٢) + ٣ د (٣) = صفر

- ٥ (١) احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم : ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ٦
(ب) إذا كان : $(س - ٢) ، (س - ٣) ، (س - ١) = (١ ، ٢)$ فما قيمة كل من : $س$ ، $ص$ ؟



محافظة الإسماعيلية

٨

أجب عن الأسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١ $\sqrt{٣٦} + \sqrt{١٦} = \dots$ (١) ١٠ (ب) ٢٤ (ج) ٥٢ (د) ١٠٠
٢ الوسط المتناسب بين ٣ ، ٢٧ هو (١) ٩ (ب) ٩- (ج) $٩ \pm$ (د) ١
٣ إذا كانت : $د = (س) = ٢$ فإن : $د + (٢) + د - (٢) = \dots$ (١) صفر (ب) ٤ (ج) ٤- (د) ١
٤ العدد الموجب الذي ضعف مربعه يساوي ٥٠ هو (١) ٥ (ب) ١٠ (ج) ٢٥ (د) ١٠٠
٥ إذا كان : $س + ص = س - ص = ٥$ فإن : $س^٢ + ص^٢ = \dots$ (١) ١٠ (ب) ١٥ (ج) ٢٠ (د) ٢٥
٦ أبسط وأسهل مقاييس التشتت هو (١) المدى (ب) الانحراف المعياري (ج) الوسط الحسابي (د) المتوال

٢ (١) إذا كانت : $س = \{٢ ، ٣ ، ٥\}$ ، $ص = \{٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٠\}$

وكانت $ع$ علاقة من $س \leftarrow ص$ حيث « $ع$ » تعني « $٢ = ب$ » لكل $ب \in س$ ، $ب \in ص$

١ اكتب بيان العلاقة $ع$ ومثلها بمخطط سهمي.

٢ هل العلاقة $ع$ دالة ؟ ولماذا ؟ وإذا كانت دالة اذكر مداها.

(ب) عدنان صحيحان النسبة بينهما ٢ : ٧ وإذا طرح من كل منهما ٥ أصبحت النسبة ١ : ٣ أوجد العددين.

٣ (١) أثناء قراءة يوسف لكتاب ، وجد أنه بعد ٢ ساعات تبقى له ٥٠ صفحة ، وبعد ٦ ساعات تبقى له

٢٠ صفحة. فإذا كانت العلاقة بين الزمن ($ن$) وعدد الصفحات المتبقية ($ص$) هي علاقة خطية.

١ مثل العلاقة بين $ن$ ، $ص$ بيانياً. ثم أوجد العلاقة الجبرية بينهما.

٢ ما الوقت الذي ينتهي فيه يوسف من قراءة الكتاب ؟

٣ كم عدد صفحات الكتاب المتبقية عندما بدأ يوسف القراءة ؟

(ب) إذا كانت : $س$ ، $ص$ ، $ع$ ، $ل$ كميات متناسبة أثبت أن : $\frac{س - ل}{ع} = \frac{ص - ع}{س}$

- ٤ (١) إذا كانت : x من 3 ، وكانت : y من 1 ، عندما $x = 11$ فأوجد : العلاقة بين x ، y لم أوجد : قيمة y عندما $x = 8$.
(ب) إذا كانت : x من $\{ (3, 1) , (2, 1) , (3, 2) , (2, 2) \}$ أوجد : y من $\{ (3, 1) , (2, 1) \}$.

- ٥ (١) مثل بياناً الدالة d حيث $d(x) = (x-2)^2$ متخذاً من $[-1, 5]$ ومن الرسم أوجد :

١ إحدائى رأس المنحنى .

٢ معادلة محور التماثل .

٣ القيمة العظمى أو الصغرى للدالة .

(ب) احسب الانحراف المعياري للقيم الآتية : $13, 14, 17, 19, 22$



محافظة بورسعيد

٩

أجب عن الاسئلة الآتية ،

- ١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ $\{1, 0\} - [2, 1] = \dots\dots\dots$

(١) $[2, 1]$ (ب) $[2, 1[$ (ج) $]2, 1]$ (د) $\{2\}$

٢ إذا كانت : $3^x = 6^2$ فإن : $x = \dots\dots\dots$

(١) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ٦٤

٣ ٢٠٪ من ١٠ جنيهات = جنيه .

(١) ٢ (ب) ٢٠٥ (ج) ٥ (د) ٢٠

٤ إذا كان : $x = 3$ ، $y = (x-3)^2$ فإن : $y = \dots\dots\dots$

(١) ٤ (ب) ٩ (ج) ١٥ (د) ٣٦

٥ إذا كان : $2^x = 4$ فإن : $x = \dots\dots\dots$

(١) ٤ : ٣ (ب) ٧ : ٤ (ج) ٧ : ٣ (د) ٣ : ٤

٦ المدى لمجموعة القيم : ٧ ، ٢ ، ٦ ، ٩ ، ٥ يساوى

(١) ٣ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ١٢

- ٢ (١) إذا كانت : $x = \{2, 3, 4\}$ ، $y = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ وكانت x علاقة من

x إلى y حيث « x » \subseteq « y » تعنى « x » لكل $x \in x$ ، $y \in y$

اكتب بيان x ومثلها بمخطط سهمى . بين أن x دالة من x إلى y وأوجد مداها .

(ب) إذا كانت : $d(x) = 4x + 3$ وكانت : $d(3) = 15$ أوجد : قيمة x

٣ (أ) إذا كانت $d = (س) = س^2 - ٣س$ ، $س = (س) = س - ٣$ ، أثبت أن $d = (٣) = س = (٣) = صفر$ (١) أوجد $d = (٣) + (٣) = ٣ + (٣) = ٦$ (٢) أثبت أن $d = (٣) = س = (٣) = صفر$

(ب) مثل بياناً الدالة التربيعية $d = (س) = س^2 - ٣س$ ، $س = (س) = س - ٣$ متخذاً $س \in [٣, ٣]$ ومن الرسم استنتج نقطة رأس المنحنى ، القيمة الصغرى للدالة ، معادلة محور التماثل.

٤ (أ) إذا كانت $س$ وسطاً متناسباً بين ١ ، ٢ ، فاثبت أن $\frac{١}{س} = \frac{١}{١} + \frac{١}{٢}$ (٢) قيمة $س$ عندما $س = ٦٠$

(ب) إذا كانت $س$: ٣٠ وكانت $س = ١٤$ عندما $س = ٤٢$

فأوجد : (١) العلاقة بين $س$ ، $ص$ (٢) قيمة $س$ عندما $س = ٦٠$

٥ (أ) احسب الانحراف المعياري للقيم الآتية : ٢٧ ، ٢٠ ، ٥ ، ٣٢ ، ١٦ (ب) إذا كان $ع$ ارتفاع أسطوانة دائرية قائمة (حجمها ثابت) يتغير عكسياً بتغير مربع طول نصف قطر قاعدتها $نق$ ، وكان $ع = ٢٧$ سم عندما $نق = ١٠$ ، ٥ سم.

فأوجد : $ع$ عندما $نق = ١٥$ ، ٧٥ سم.



محافظة دمياط

١٠

أجب عن الأسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(أ) إذا كان $س = (٣) = ٣$ ، $س = (٣) = ٤$ ، فإن : $س = (س \times ص) = \dots$

(١) ٦ (ب) ١٢ (ج) ١٨ (د) ٣٦

(٢) المدى لمجموعة القيم : ٧ ، ٤ ، ٦ ، ٩ ، ٥ يساوى

(١) ٣ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٦

(٣) إذا كانت : $س = \frac{٥}{٣}$ ، فإن : $ص = \dots$

(١) $س$ (ب) $\frac{١}{س}$ (ج) $س - ٥$ (د) $س + ٥$

(٤) إذا كانت : $\frac{٣}{٤} = \frac{٣}{س} + \frac{٣}{٤}$ ، فإن : $س = \dots$

(١) $\frac{٣}{٤}$ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

(٥) الثالث المتناسب للعددين ٢ ، ٦ هو

(١) $\frac{١}{٣}$ (ب) ٢ (ج) ٩ (د) ١٢

(٦) مجموعة حل المعادلة : $(س - ١) = ٩$ فى $س$ هى

(١) $\{٤\}$ (ب) $\{٢-\}$ (ج) $\{٢، ٤\}$ (د) $\{٣\}$

٢ (١) إذا كانت $s = \{6, 9, 1\}$ ، $m = \{6, 5, 4, 2\}$ ، $c = \{1\}$ أوجد $(s - m) \times c$

(ب) إذا كانت s وسطاً متناسباً بين 2 ، 4 أثبت أن $\frac{1}{c} = \frac{1-s}{1-c} + \frac{1}{c}$

٣ (١) إذا كانت s $20 \times \frac{1}{s}$ وكانت $s = 3$ عندما $s = 2$

(٢) أوجد : العلاقة بين s ، m أوجد : قيمة s عندما $s = 1.5$

(ب) إذا كان $\frac{s}{s-2} = \frac{s}{s} = \frac{s}{s+2}$

أثبت أن : $\frac{1}{c}$ كلاً من هذه النسب $= 2$ (ما لم تكن $s + m$ صفر)

(٢) $s = 2$ $c = 2$

٤ (١) إذا كان : $(s^2, m) = (1 + s, 8)$ أوجد قيمة : $\frac{1}{c} + s + 3$

(ب) إذا كانت $s = \{3, 2, 0, 1\}$ ، $m = \{9, 6, 4, 1, 0\}$ وكانت c علاقة من

s إلى m حيث « c » تعني « c » لكل $s \in s$ ، $m \in m$

(١) اكتب بيان c ومثلها بمخطط سهمي. (٢) بين أن c دالة وأوجد مداها.

٥ (١) احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم الآتية : $59, 70, 61, 53, 72$

(ب) مثل بياناً منحنى الدالة $d : d(s) = s^2 - 2$ متخذاً $s \in [-3, 3]$ ومن الرسم استنتج :

(١) إحداثي رأس المنحنى. (٢) معادلة محور التماثل للدالة.



محافظة البحيرة

١١

أجب عن الاسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(١) إذا كانت $s^3 = 27$ فإن $s =$

(١) ٣ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ٦٤

(٢) المدى لمجموعة القيم : $5, 8, 6, 3, 7$ يساوي

(١) ٣ (ب) ٨ (ج) ١١ (د) ٥

(٣) النقطة $(s - 2, 4 - s)$ حيث $s \in m$ تقع في الربع الثالث فإن $s =$

(١) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٦

(٤) العلاقة التي تمثل تغيراً طردياً بين المتغيرين s ، m هي

(١) $s = 7$ (ب) $s = 5$ (ج) $\frac{s}{3} = \frac{7}{5}$ (د) $\frac{s}{5} = \frac{7}{3}$

- ٥) مجموعة حل المعادلة: $س - ٢ = ٢٥$ ، في ح هي
 (١) $\{٥، ٥\}$ (ب) $[٥، ٥-]$ (ج) ٥ (د) ٥-
 ٦) إذا كان: $(٥، ٣) \in \{٦، ٣\} \times \{٨، ص\}$ فإن: ص =
 (١) ٨ (ب) ٦ (ج) ٥ (د) ٣

- ٢) (١) إذا كانت: $س = \{٥، ٣، ٢\}$ ، $ص = \{١٠، ٨، ٦، ٤\}$ وكانت $ك$ علاقة معرفة من $س$ إلى $ص$ حيث $ك$ « $ب$ » تعني « ٢ » $ب = ٢$ لكل $٢ \in س$ ، $٢ \in ص$
 ١) اكتب بيان $ك$
 ٢) بين أن $ك$ دالة وأوجد مداها.
 (ب) إذا كانت: $ب$ هي الوسط المتناسب بين ٩ ، ح فثبت أن: $\frac{٢}{١} = \frac{٢ \cdot ٢ - ٢ \cdot ٣}{٢ \cdot ٣ - ٢ \cdot ٢}$

- ٣) (١) إذا كانت: $ص \propto \frac{١}{س}$ وكانت: $ص = ٩$ عندما $س = ٢$
 أوجد: ١) العلاقة بين $ص$ ، $س$
 ٢) قيمة $ص$ عندما $س = ٣$
 (ب) إذا كانت: $د (س) = ٥ + س + ١$ وكانت: $د (٢) = ١٢$ أوجد: قيمة ٩

- ٤) (١) إذا كانت: $س = \{٤، ٣\}$ ، $ص = \{٥، ٤\}$ ، $ع = \{٥، ٦\}$
 فأوجد: ١) $(س - ص) \times ع$
 ٢) $ص (س \times ص)$

- (ب) أوجد العدد الذي إذا طرح ثلاثة أمثاله من كل من حدى النسبة $\frac{٤٩}{٦٩}$ فإنها تصبح $\frac{٢}{٣}$

- ٥) (١) احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم الآتية: ٨ ، ١٣ ، ٢٠ ، ١٦ ، ١٨ ، ٢١
 (ب) مثل بيانياً الدالة $د$ حيث $د (س) = ٣ - س$ متخذاً $س \in [٣، ٢-]$
 ومن الرسم استنتج:
 ١) معادلة محور التماثل.
 ٢) القيمة العظمى للدالة.



محافظة الفيوم

١٢

أجب عن الاسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

- ١) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:
 ١) إذا كان: $(س + ١، \sqrt{٢٧}) = (١-، ص)$ فإن النقطة $(س، ص)$ تقع في الربع
 (١) الأول. (ب) الثاني. (ج) الثالث. (د) الرابع.
 ٢) إذا كان: $\frac{٢}{٤} = \frac{٢}{س} + \frac{٢}{٢}$ فإن: $س =$
 (١) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) $\frac{٢}{٢}$

٣] ضعف العدد 12 هو

- (أ) ٢٤ (ب) ١٢ (ج) ١٠٢ (د) ١٦٢

٤] إذا كان : $س = ١٢$ فإن : ص تتغير طردياً مع

- (أ) $\frac{1}{س}$ (ب) $س - ١٢$ (ج) $س$ (د) $س + ١٢$

٥] اشترى عمر ٤ كراسات ، ٢ أقلام بمبلغ ٥٠ جنيهاً ، فإذا كان ثمن القلم ضعف ثمن الكراسة فإن ثمن الكراسة الواحدة = جنيهاً.

- (أ) ٤ (ب) ٥ (ج) ١٠ (د) ٢٠

٦] إذا كان المدى للقيم : ٧ ، ٢ ، ٨ ، ٩ ، ٥ هو ٦ فإن : ٢ =

- (أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ١٢

٢] (أ) إذا كانت : $س = \{٥ ، ٢\}$ ، $ص = \{٢ ، ١\}$ ، $ع = \{٣\}$

فأوجد : ١] $س \cap (ص \times ع)$ ٢] $(ص \cap س) \times ع$

(ب) إذا كانت : $٢ = ٢$ فأوجد قيمة المقدار : $\frac{٢٨ + ٥}{٢٧ - ٢}$

٣] (أ) إذا كانت : $س = \{١ ، ٢ ، ٣\}$ ، $ص = \{١ ، \frac{1}{٢} ، \frac{1}{٣} ، \frac{1}{٤}\}$ ، وكانت $ع$ علاقة من

$س$ إلى $ص$ حيث «١» $ع$ «٢» تعني أن «١» هو المعكوس الضربي للعدد «٢» لكل $٢ \in س$ ، $٢ \in ص$

١] اكتب بيان $ع$ ومثلها بمخطط سهمي. ٢] هل $ع$ دالة ؟ اذكر مداها.

(ب) إذا كانت : $د (س) = ٤س + ٤$ ، وكانت : $د (\frac{1}{٤}) = ١٢$ فأوجد : قيمة $د$ الحقيقية.

٤] (أ) إذا كانت : $٢ ، ب ، ح ، د$ في تناسب متسلسل فأثبت أن : $\frac{٢}{٢س + ٢ح} = \frac{١}{س + ب}$

(ب) إذا كانت : ص تتغير عكسياً مع $س$ ، وكانت : $ص = ٣$ عندما $س = ٢$

فأوجد : ١] العلاقة بين $س$ ، $ص$ ٢] قيمة $ص$ عندما $س = ٣$

٥] (أ) مثل بياناً الدالة $د$ حيث $د (س) = ٤ - س$ متخذاً $س \in [٢ ، ٣]$ ، ومن الرسم استنتج :

١] إحداثيي نقطة رأس المنحنى. ٢] معادلة محور التماثل.

(ب) احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم : ٣ ، ٦ ، ٧ ، ٩ ، ١٥



محافظة المنيا

١٣

اجب عن الاسئلة الاتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) $(\sqrt{2} - \sqrt{2})(\sqrt{2} + \sqrt{2}) = \dots\dots\dots$

(د) $2 - \sqrt{2}$

(ج) $2\sqrt{2}$

(ب) ١٢

(أ) ٢

٢) إذا كانت : $s = 3$ فإن : $s \times \dots\dots\dots$

(د) $s + 3$

(ج) $\frac{1}{s}$

(ب) $s - 3$

(أ) s

٣) $\{1, 2\} - \{1, 2, 3\} = \dots\dots\dots$

(د) $\{3\}$

(ج) $\{1, 2\}$

(ب) $\{1, 2\}$

(أ) $\{1, 2, 3\}$

٤) الوسط الحسابى لمجموعة القيم : ٨ ، ٩ ، ٧ ، ٦ ، ٥ هو

(د) ٧

(ج) ٣

(ب) ٢

(أ) ٥

٥) ٢٠ % من ١٠ جنيهات = جنيه.

(د) ٢٠

(ج) ٥

(ب) ٢, ٥

(أ) ٢

٦) إذا كانت النقطة (س - ٤ ، ٢ - س) حيث $s \in \mathbb{R}$ تقع فى الربع الثالث فإن : $s = \dots\dots\dots$

(د) ٦

(ج) ٤

(ب) ٣

(أ) ٢

٢) (١) أوجد الانحراف المعياري للقيم : ٦ ، ٨ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٤

(ب) إذا كانت : $s = \{2, 5\}$ ، $\sim s = \{1, 2\}$ ، $\sim \sim s = \{3\}$ ، $\sim \sim \sim s = \{3\}$

أوجد : $\sim (\sim s \times \sim \sim s)$ ، $(\sim s \cap \sim \sim s) \times \sim \sim \sim s$

٣) (١) إذا كانت : $s \times \frac{1}{s} = 3$ وكانت : $s = 3$ عندما $s = 2$

أوجد : (١) العلاقة بين s ، s (٢) قيمة s عندما $s = 1, 5$

(ب) إذا كانت : $s = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ، $\sim s = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

وكانت $\sim \sim s$ علاقة من $\sim s$ إلى $\sim s$ حيث « $\sim \sim s$ » تعنى « $\sim s = \sim s + 1$ » لكل $\sim s \in \mathbb{R}$ ، $\sim s \in \mathbb{R}$

اكتب بيان $\sim \sim s$ ومثلها بمخطط سهمى وهل $\sim \sim s$ دالة من $\sim s$ إلى $\sim s$ أم لا ؟ مع ذكر السبب.

٤) (١) إذا كانت : $\frac{s}{3} = \frac{s}{s}$ أوجد قيمة النسبة : $\frac{s+2}{s-6}$

(ب) إذا كان المستقيم الممثل للدالة $d : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $d(s) = 4s - 1$ يقطع محور السينات فى

النقطة (٢ ، ب) أوجد : قيمتى ٢ ، ب

٥ (١) إذا كانت : s وسطاً متناسباً بين a ، b أثبت أن : $\frac{a}{b} = \frac{b}{s}$

(ب) مثل بيانياً الدالة التربيعية d حيث $d(s) = s^2 - 2$ متخذاً $s \in [-3, 3]$ ومن الرسم استنتج :

[١] إحداثي رأس المنحنى.

[٢] معادلة محور التماثل.



محافظة أسبوط

١٤

أجب عن الاسئلة الاتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[١] $[0, 2] \cup \{2\} = \dots\dots\dots$

(١) $[0, 2]$ (ب) $[0, 2)$ (ج) $]-\infty, \infty]$ (د) $[0, 2]$

[٢] $\sqrt{28 - 210} = \dots\dots\dots$

(١) ٨ (ب) ٦ (ج) ٤ (د) ٢

[٣] مجموعة الحل للمعادلة : $s(1 - s) = 0$ صفر في s هي

(١) {صفر} (ب) {١} (ج) {صفر ، ١} (د) \emptyset

[٤] إذا كان : $3 = 8 - s$ فإن $s = \dots\dots\dots$

(١) $3 = 8 - s$ (ب) $3 = 8$ (ج) $8 : 3$ (د) $8 : 3 -$

[٥] إذا كان : $s = 5$ فإن : $s \times \dots\dots\dots$

(١) $\frac{1}{s}$ (ب) $s - 5$ (ج) s (د) $\frac{1}{s}$

[٦] عند إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد فردي يساوي

(١) صفر (ب) \emptyset (ج) ١ (د) $\frac{1}{2}$

٢ (١) إذا كانت : $s = \{1, 5, 6\}$ ، $v = \{2, 4, 5\}$

أوجد : $s \times v$ ومثله بمخطط سهمي.

(ب) ارسم منحنى الدالة التربيعية d : $d(s) = s^2 - 1$ متخذاً $s \in [-2, 2]$

ومن الرسم استنتج : [١] معادلة محور التماثل. [٢] القيمة العظمى أو الصغرى للدالة.

٣ (١) إذا كانت : $d(s) = 4s + m$ وكانت : $d(3) = 15$ أوجد : قيمة m

(ب) إذا كان : $\frac{1}{4} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4} = \frac{d}{5}$ فأوجد : قيمة s

٤ (١) إذا كانت : ص x س وكانت : ص = ٢ عندما س = ٢
فأوجد : ١ العلاقة بين ص ، س ٢ قيمة ص عندما س = $\frac{1}{3}$

(ب) إذا كانت : س وسطاً متناسباً بين ١ ، ح ، فأثبت أن : $\frac{1}{ح} = \frac{1+1}{1+ح}$

٥ (١) إذا كانت : س = { ١ ، ٢ ، ٥ } ، ص = { ٢ ، ٤ ، ٦ } وكانت \mathcal{G} علاقة معرفة من

س إلى ص حيث ١ \mathcal{G} س تعني ١ = س + ١ ، لكل ١ \exists س ، س \exists ص

٢ اكتب بيان \mathcal{G} ومثلها بمخطط سهمي . ٢ بين هل \mathcal{G} دالة أم لا ، وإذا كانت دالة عين مداها .

(ب) أوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم الآتية : ٨ ، ٩ ، ٧ ، ٦ ، ٥



محافظة سوهاج

١٥

أجب عن الأسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ أبسط مقاييس التشتت هو

(١) الوسط الحسابي . (ب) الوسيط .

(د) المتوسط

(ج) المدى .

٢ ٢٠٪ من ١٠٠ جنيه = جنيهًا .

(د) ٢٠

(ج) ١٥

(ب) ١٠

(١) ٥

٣ $\{ ٧ ، ٢ \} - \{ ٧ ، ٢ \} =$

(د) $\{ ٧ ، ٢ \}$

(ج) $\{ ٧ ، ٢ \}$

(ب) $\{ ٧ ، ٢ \}$

(١) $\{ ٧ ، ٢ \}$

٤ مجموعة حل المعادلة : س $^2 - ٩ = ٠$ هي

(د) \emptyset

(ج) $\{ ٣ ، ٣ - \}$

(ب) $\{ ٣ \}$

(١) $\{ ٣ - \}$

٥ إذا كان : ره (س) = ٥ ، ره (س \times ص) = ١٠ ، فإن : ره (ص) =

(د) ١

(ج) ٢

(ب) ٣

(١) ٤

٦ العلاقة التي تمثل تغيراً طردياً بين المتغيرين ص ، س هي

(د) $\frac{ص}{٢} = \frac{س}{٥}$

(ج) $\frac{س}{٢} = \frac{ص}{٤}$

(ب) ص = س + ٢

(١) س ص = ٥

٢ (١) إذا كان : $\frac{س}{٤} = \frac{٢}{ص}$ فأوجد قيمة المقدار : $\frac{٢+س+ص}{س+٥+ص}$

(ب) إذا كانت : س = { ١ ، ٢ ، ٢ } ، ص = { ١ ، $\frac{1}{٢}$ ، $\frac{1}{٢}$ ، $\frac{1}{٥}$ } وكانت \mathcal{G} علاقة من س

إلى ص حيث ١ \mathcal{G} س تعني أن « العدد ١ معكوس ضربي للعدد س ، لكل ١ \exists س ، لكل س \exists ص

اكتب بيان \mathcal{G} ، ومثلها بمخطط سهمي ، ثم بين هل \mathcal{G} دالة أم لا ، مع ذكر السبب .

٣ (١) إذا كانت : $s = \{4, 5, 7\}$ وكانت g دالة على s وكان بيان

$$g = \{(7, 4), (5, 5), (4, 7)\}$$

فأوجد : ١ القيمة العددية للمقدار $g + s$ ٢ مدى الدالة.

(ب) مثل بياناً منحنى الدالة d حيث $d(s) = 2 - s$ ، $s \in [2, 3]$

ومن الرسم استنتج : ١ إحداثي نقطة رأس المنحنى. ٢ معادلة محور التماثل.

٣ القيمة العظمى للدالة.

٤ (١) إذا كانت : s وسطاً متناسباً بين 2 ، 3 فأثبت أن : $\frac{1}{s} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

(ب) من بيانات الجدول المقابل أجب عن الأسئلة الآتية :

| | | | |
|---|---|---|---|
| س | ٢ | ٤ | ٦ |
| ص | ٦ | ٣ | ٢ |

١ بين نوع التغير بين s ، v

٢ أوجد ثابت التغير.

٣ أوجد قيمة v عندما $s = \frac{2}{3}$

٥ (١) إذا كانت النقطة $(4, 2)$ تقع على الخط المستقيم الممثل للدالة $d : s \rightarrow v$ حيث $d(s) = 4 - s$ ،

فأوجد : قيمة 2

(ب) أوجد الانحراف المعياري لمجموعة القيم : $15, 19, 20, 21, 25$



محافظة قنا

١٦

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ الزوج المرتب (s^2, v^2) حيث : $s \neq 0$ ، $v \neq 0$ يقع في الربع

(١) الأول. (ب) الثاني. (ج) الثالث. (د) الرابع.

٢ الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي

يسمى

(١) المدى. (ب) الوسيط.

(ج) الانحراف المعياري. (د) المنوال.

٣ إذا كان : s ، $s + 17$ عددين أوليين فإن : $s =$

(١) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٥

٤ إذا كان : ص = ٥ فإن : ص = ٥

- (١) ص (ب) $\frac{1}{ص}$ (ج) $\frac{1}{ص}$ (د) $\frac{1}{ص}$

٥ إذا كانت : ص = {٢} فإن : ص = {٢}

- (١) ١ (ب) ١ (ج) {٣، ٢} (د) ٣

٦ نسبة مساحة منطقة مربعة طول ضلعها ١ إلى منطقة مربعة أخرى طول ضلعها ٣ كنسبة

- (١) ٣ : ١ (ب) ١ : ٣ (ج) ١ : ١ (د) ١ : ٩

٧ (١) إذا كانت : ص = {١، ٢، ٣} وكانت : ص = {٠، ١، ٢، ٣، ٤} وكانت : ص = {١، ٢، ٣} وكانت : ص = {٠، ١، ٢، ٣، ٤}

وكانت : ص علاقة من ص إلى ص حيث : ص = ١ - ١ = ٠ لكل : ص = ١، ٢، ٣، ٤، ٥
اكتب بيان : ص ومثله بمخطط سهمي ، بين أن : ص دالة واكتب مداها .

(ب) إذا كانت : $\frac{1}{ص} = \frac{1}{ع} = \frac{1}{٥}$ أثبت أن : $\frac{1}{ص} = \frac{1}{ع} = \frac{1}{٥}$

٨ (١) إذا كانت : ص = ٥ وكانت : ص = ٥ عندما ص = ١

اكتب العلاقة بين : ص ، ص ثم أوجد : قيمة ص عندما ص = ١٥

(ب) إذا كانت النقطة (١، ٢) تقع على المستقيم الذي يمثل الدالة : د (ص) = ص - ٦ أوجد : قيمة د

٩ (١) إذا كانت : ص وسطاً متناسباً بين ص ، ع أثبت أن : $\frac{ص}{ص + ع} = \frac{ع}{ص + ع}$

(ب) إذا كانت : ص = {٢، ٢} ، ص = {٥} ، ع = {٥، ٤}

أوجد : (١) (ص - ص) × ع (٢) ص × (ص ∩ ع)

١٠ (١) مثل بيانياً الدالة : د حيث د (ص) = (٣ - ص) متخذاً ص ∈ [٠، ٦]

ومن الرسم أوجد :

(١) رأس المنحنى . (٢) القيمة العظمى أو القيمة الصغرى للدالة .

(ب) احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للبيانات الآتية : ٧٣ ، ٥٤ ، ٦٢ ، ٧١ ، ٦٠



محافظة الأقصر

١٧

أجب عن الأسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(١) $\frac{1}{٣}$ العدد ٣ =

- (١) ٣ (ب) ٣ (ج) ٣ (د) ٣

٢ إذا كان : $١ = (٢س)$ ، $٦ = (س \times ص)$ فإن : $١ = (٢ص)$

- (١) ١٢ (ب) ٩ (ج) ٦ (د) ٣

٣ $\{٦، ٤\} \cap \{٦، ٤\}$

- (١) $\{٥\}$ (ب) $\{٦، ٤\}$ (ج) $\{٦، ٤\}$ (د) \emptyset

٤ إذا كانت : $س$ ، $ص$ ، $ع$ في تناسب متسلسل فإن : $س =$

- (١) $\frac{ص}{ع}$ (ب) $ص \times ع$ (ج) $\frac{ص}{ع}$ (د) $\frac{ص}{ع}$

٥ $\sqrt[٥]{٦٤} = \sqrt[٥]{٦٤}$

- (١) ٢ (ب) ١٦ (ج) ٨ (د) ٤

٦ إذا كانت جميع المفردات متساوية في القيمة فإن :

- (١) $س - س < ٠$ (ب) $س - س > ٠$ (ج) $س = ٠$ (د) $س = ٥$

٢ (١) إذا كانت : $س = \{١، ٢\}$ ، $ص = \{٠، ٤\}$ ، $ع = \{٢، ٥، ٤\}$

أوجد كلاً من : ١ $س \times ص$ ٢ $(ص \cap ع) \times س$ ٣ $ص(ص)$

(ب) ما العدد الذي إذا طرح من مقدم النسبة ١٥ : ١٣ وأضيف إلى تاليها فإنها تصبح ٣ : ٤

٣ (١) إذا كانت : $د(س) = ٢س + ١$ ، $س(س) = س + ١$ وكانت : $د(٢) + س(-٤) = ٣٠$

فأوجد : قيمة ١

(ب) إذا كانت : $١، ب، ح، د$ كميات متناسبة أثبت أن : $\frac{١+ب}{١+ب+ح} = \frac{٢+ح}{٢+ح+د}$

٤ (١) إذا كانت : $س = \{٠، ١، ٢، \frac{١}{٢}\}$ وكانت $ع$ علاقة على $س$ حيث : $١ ع ب$ تعني : ١ معكوس ضربي

١ لكل $١ \exists س، ب \exists س$ اكتب بيان $ع$ ومثلها بمخطط سهمي وهل $ع$ دالة على $س$ أم لا

(ب) إذا كانت : $ص$ ٣٠ $س$ وكانت : $ص = ٦٤$ عند $س = ٢$

أوجد : العلاقة بين $س$ ، $ص$ ثم أوجد : قيمة $ص$ عند $س = \frac{١}{٢}$

٥ (١) احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم الآتية : ٢٢ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ١٨

(ب) مثل بياناً الدالة التربيعية : $د(س) = س^٢ - ٤س + ٥$ متخذاً $س \in [٠، ٤]$

ومن الرسم أوجد معادلة محور التماثل والقيمة العظمى أو القيمة الصغرى للدالة.

(ب) فيما يلي التوزيع التكرارى لدرجات امتحان ما سُجلت في أحد الشهور :

| الدرجة | صفر | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ |
|------------|-----|---|---|---|---|---|---|
| عدد الطلاب | ٣ | ٤ | ٦ | ٩ | ٥ | ٣ | ٤ |

أوجد الانحراف المعياري للدرجات.

٥ (١) إذا كانت : $s = \{١, ٣, ٥\}$ وكانت : g دالة على s

وكان بيان $g = \{(١, ٣), (٣, ١), (١, ٥), (٥, ١)\}$

أوجد : ١ مدى الدالة. ٢ القيمة العددية للمقدار $s + ١$

(ب) إذا كانت : $١, ٢, ٣, ٤$ كميات متناسبة فأثبت أن : $\frac{1}{1-2} = \frac{2}{2-3} = \frac{3}{3-4}$



محافظة جنوب سيناء

١٩

أجب عن الاسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان : $(٢, ٣) \in \{٢, ٥\} \times \{٣, ٤\}$ فإن : $s = \dots\dots\dots$

(١) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥

٢ إذا كان : $s = ص$ فإن : $ص \times \dots\dots\dots$

(١) $\frac{1}{s}$ (ب) s (ج) $s - ٥$ (د) $s + ٥$

٣ من مقاييس التشتت $\dots\dots\dots$

(١) الوسط الحسابى. (ب) الوسيط. (ج) المنوال. (د) الانحراف المعياري.

٤ الوسط الحسابى للقيم : ١, ٢, ٣, ٤, ٥ يساوى $\dots\dots\dots$

(١) ٥ (ب) ٤ (ج) ٣ (د) ٢

٥ $\sqrt[3]{s} = \sqrt[3]{\dots\dots\dots}$

(١) s^4 (ب) s^3 (ج) s^2 (د) s

٦ إذا كانت : $\frac{٥}{٤} = \frac{٥}{٣} + \frac{٥}{٢}$ فإن : $١ = \dots\dots\dots$

(١) $\frac{٥}{٢}$ (ب) $\frac{٥}{٣}$ (ج) ٤ (د) ٤ -

6] إذا كان: $ص = ص$ ، $ه = ه$ ، $س = س$ ، فإن: $ص = ص$ ، $ه = ه$ ، $س = س$.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

۵) إذا كان $v = (v_1, \dots, v_n)$ فإن $v = (v_1, \dots, v_n)$

$$\psi(\phi) \quad \psi(\alpha) \quad \psi(\gamma) \quad \psi(\delta)$$

$$\text{value}(\text{true}) = [0, 1] - [0, 1] \quad (7)$$

$$\{0\} \text{ (a)} \quad \{r\} \text{ (b)} \quad \{0, r\} \text{ (c)} \quad [0, r] \text{ (d)}$$

2 (1) إذا كان: $s \times v = \{(v, v), (0, v), (v, v)\}$

أوجد: [١] ص

٢

(ب) إذا كانت: $2 = 15$ أوجد قيمة المقدار: $\frac{9+17}{2+11}$

۳ (۱) إذا كانت : ص $\propto \frac{1}{س}$ ، وكانت : ص = ۲ عندما س = ۲

أوجد: ١) العلاقة بين S ، V ٢) قيمة V عندما $S = 1.5$

(ب) الشكل المقابل يعبر عن التمثيل البياني للدالة د :


$$2 - \frac{1}{s} = (s)$$

أوجد :

١ رأس المنحنى.

٢ معادلة محور تماثل المنحنى.

٣ القيمة العظمى أو الصغرى للدالة.



٤ (١) إذا كانت $S = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ وكانت g علاقة على S حيث « g » تعني «العدد a معكوس جمعي للعدد b لكل $a \in S, b \in S$ اكتب بيان g ومثلها بمخطط سهمي.

معكوس جمعی للعدد \bar{a} لكل $a \in \mathbb{R}$ ، $\bar{\bar{a}} = a$ اكتب بيان \bar{a} ومنها بمخطط سهمي.

(ب) إذا كانت: s وسطاً متناسباً بين a ، c أثبت أن: $\frac{c}{c+a} = \frac{a}{c-a}$

٥ (١) مثل بيانياً الدالة $d : (s) = s - 3$ ثم أوجد نقطتي تقاطع المستقيم الممثل لها مع محوري الإحداثيات.

(ب) احسب الانحراف المعياري للقيم: ٨، ٩، ٧، ٦، ٥

ثانيًا

حساب المثلثات والهندسة


- ٦٧ • الاختبارات التراكمية (عدد ٦ اختبارات)
- ٧٥ • الأسئلة الهامة في حساب المثلثات والهندسة
- ٨٩ • الامتحانات النهائية :
 - نماذج امتحانات الكتاب المدرسي
 - (عدد ٢ نموذج + نموذج للطلاب المدمجين)
 - امتحانات بعض المحافظات (عدد ٢٠ امتحاناً)



الاختبارات التراكمية

في حساب المثلثات والهندسة

من امتحانات المحافظات



١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(البجيرة ١٨)

١) س ، ص زاويتان متتامتان فإذا كان : ما س = $\frac{2}{5}$ فإن : ما ص =
 (أ) $\frac{1}{5}$ (ب) $\frac{2}{5}$ (ج) $\frac{3}{5}$ (د) $\frac{4}{5}$

(الإسكندرية ١٢)

٢) لأى زاويتين حادتين ١ ، ٢ إذا كان : ١ (د) + ٢ (د) = 90° ، ٢ (د) \neq ١ (د) فإن :

(أ) ما ١ = ما ٢ (ب) ما ١ = ما ٢
 (ج) ما ١ = ما ٢ (د) ما ١ = ما ٢

(سوهاج ١٩)

٣) إذا كانت : ما ١ = ما ٢ فإن : ١ (د) = (حيث ١ زاوية حادة)

(أ) 30° (ب) 45° (ج) 60° (د) 90°

(الوادي الجديد ١٩)

٤) لأى زاوية قياسها ٢ يكون $\frac{\text{ما ١}}{\text{ما ٢}} = \dots\dots\dots$

(أ) ما ١ (ب) ما ٢ (ج) ما ١ (د) ١

(دمياط ١٦)

٥) إذا كان : Δ ١ ٢ ٣ قائم الزاوية في ٢ فإن : ما ١ + ما ٢ + ما ٣ =
 (أ) \geq (ب) $<$ (ج) $>$ (د) \geq

(الوادي الجديد ١٧)

٦) ١ ٢ ٣ مثلث قائم الزاوية في ٢ فإذا كان : ١ ٢ = $3\sqrt{2}$ ح

فإن : ما ٣ =

(أ) $\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (ج) $\sqrt{2}$ (د) ١

(المنوفية ٣٠)

٧) مربع مساحة سطحه ٢٥ سم^٢ فإن طول قطره يساوى سم

(أ) ٥ (ب) ١٠ (ج) $2\sqrt{5}$ (د) $2\sqrt{10}$

(الشرقية ١٨)

٨) فى المثلث ١ ٢ ٣ القائم الزاوية فى ٢ يكون

جيب تمام الزاوية ٢ : جيب الزاوية ٢ =

(أ) $\frac{2}{5}$ (ب) $\frac{4}{3}$ (ج) $\frac{2}{4}$ (د) ١

(الشرقية ١٩)


٩ فى الشكل المقابل :

١ ٢ ٣ مثلث متساوى الساقين حيث :

١ = ٢ = ٣ ح = ١٠ سم ، ٢ ح = ١٢ سم

أوجد : ١ ما ٢

٢ مساحة سطح المثلث ١ ٢ ٣





1. $\angle A = 90^\circ$
 2. $AD \perp BC$
 3. $BD = DC$
 4. $AD = DC$
 5. $AB = AC$

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١. إذا كان : $\sin A = \frac{1}{2}$ حيث A قياس زاوية حادة فإن : $A =$
 (أ) 30° (ب) 45° (ج) 60° (د) 90°

٢. إذا كانت : $\cos A = \frac{1}{2}$ حيث A قياس زاوية حادة فإن : $A =$
 (أ) 30° (ب) 45° (ج) 60° (د) 90°

٣. إذا كان : $\tan A = 1$ حيث A قياس زاوية حادة فإن : $A =$
 (أ) 30° (ب) 45° (ج) 60° (د) 90°

٤. إذا كان : $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ حيث A قياس زاوية حادة فإن : $A =$
 (أ) 30° (ب) 45° (ج) 60° (د) 90°

٥. إذا كانت : $\cos A = \frac{1}{2}$ حيث A قياس زاوية حادة فإن : $A =$
 (أ) 30° (ب) 45° (ج) 60° (د) 90°

٦. إذا كان : $\tan A = 1$ حيث A قياس زاوية حادة فإن : $A =$
 (أ) 30° (ب) 45° (ج) 60° (د) 90°

٧. إذا كانت : $\sin A = \frac{1}{2}$ حيث A قياس زاوية حادة فإن : $A =$
 (أ) 30° (ب) 45° (ج) 60° (د) 90°

٨. في الشكل المقابل :

$\angle A =$ سم

(أ) 30° (ب) 45° (ج) 60° (د) 90°



٩. أثبت أن : $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$

١٠. إذا كان : $\sin A = \frac{1}{2}$ سم ، $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ سم ، أوجد : $\tan A$ لأقرب دقيقة.

١١. أوجد قيمة $\sin A$ إذا كان : $\cos A = \frac{1}{2}$ سم ، $\tan A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ سم ، $\sin A = \frac{1}{2}$ سم

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(القاهرة ١٧)

١ البعد بين النقطتين $(٠, ٥)$ ، $(٠, ٢)$ هو وحدة طول.

٣ (د)

٣ $\frac{1}{2}$ (ج)

$2\sqrt{2}$ (ب)

٧ (أ)

(دمياط ١٦)

٢ بعد النقطة $(٨, -٦)$ عن محور الصادات يساوى وحدة.

٨- (د)

٨ (ج)

٦- (ب)

٦ (أ)

(الشرقية ١٩)

٣ بعد النقطة $أ(٤, 2\sqrt{2})$ عن نقطة الأصل يساوى وحدة طول.

$2\sqrt{2}$ (د)

$2\sqrt{2}$ (ج)

$2\sqrt{2}$ (ب)

$2\sqrt{2}$ (أ)

(إس سويف ١٨)

٤ عدد محاور تماثل المثلث المتساوى الساقين يساوى

٣ (د)

٢ (ج)

١ (ب)

صفر (أ)

٥ دائرة مركزها نقطة الأصل وطول نصف قطرها يساوى ٢ وحدة طول

(الإسكندرية ١٩)

فإن النقطة تنتمى إليها.

$(١, 2\sqrt{2})$ (د)

$(١, ٠)$ (ج)

$(-٥\sqrt{2}, ٢-)$ (ب)

$(٢-, ١)$ (أ)

٦ إذا كانت : $\sin \frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{\sin}{2}$ حيث $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ قياس زاوية حادة

(المنوفية ٢٠)

فإن : $\theta = (١٥ - \text{س}) = \dots\dots\dots$

$\frac{3\sqrt{2}}{2}$ (د)

١ (ج)

$\frac{1}{3\sqrt{2}}$ (ب)


$3\sqrt{2}$ (أ)

(المنوفية ١٧)

٧ في الشكل المقابل :

و $أ ب ح$ مستطيل فى مستوى إحداثى

فإن : $أ ح = \dots\dots\dots$ وحدة طول.



٩ (ب)

١٢ (أ)

٢٥ (د)

١٥ (ج)

(السويس ١٦)

٨ ٢٠° ما ٣٠° ما $٣٠^\circ = \dots\dots\dots$

$\frac{1}{3\sqrt{2}}$ (د)

$\frac{3\sqrt{2}}{2}$ (ج)

١ (ب)

$\frac{1}{3}$ (أ)

٩ $أ ب ح د$ شكل رباعى حيث : $أ(٤, ٢)$ ، $ب(٠, ٣-)$ ، $ح(٥, ٧-)$ ، $د(٩, ٢-)$

(شمال سيناء ٢٠)

أثبت أن : الشكل $أ ب ح د$ مربع.

(الفيوم ١٨)

٢ أوجد θ (د س) حيث \sin زاوية حادة إذا كان : $٣ \text{ ط } ٢ \text{ س} = ٤ \text{ ما } ٣٠^\circ + ٨ \text{ ما } ٦٠^\circ$

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان : $A(2, -1)$ ، $B(5, -10)$ فإن نقطة منتصف \overline{AB} هي

- (أ) $(-2, -4)$ (ب) $(-2, 4)$ (ج) $(2, -4)$ (د) $(2, 4)$

٢ إذا كانت نقطة الأصل هي منتصف \overline{AB} حيث $A(5, 2)$ فإن النقطة B هي

- (أ) $(5, 2)$ (ب) $(2, 5)$ (ج) $(-2, -5)$ (د) $(-5, -2)$

٣ إذا كانت : $(3, -1)$ هي منتصف \overline{AB} حيث $A(2, 5)$ ، $B(4, -1)$ فإن : $س =$

- (أ) ١٧ (ب) ٦ (ج) ١٣ (د) ٧

٤ في المثلث ABC القائمة الزاوية في B يكون $ما ٢ + ما ٣ =$

- (أ) ٢ ما (ب) ٣ ما (ج) ٢ ما (د) ٣ ما

٥ مثلث أطوال أضلاعه ٥ سم ، ١٢ سم ، ١٣ سم تكون مساحته سم^٢

- (أ) ٣٠ (ب) ٣٢,٥ (ج) ٧٨ (د) ١٤٤

٦ إذا كانت : $ما ٤ س = \frac{1}{4}$ حيث $٤ س$ زاوية حادة فإن : $٧ (د س) =$

- (أ) ٣٠° (ب) ٤٥° (ج) ٦٠° (د) ١٥°

٧ \overline{AB} قطر في دائرة مركزها M ، حيث $A(2, 4)$ ، $B(0, -2)$ فإن : $م =$

- (أ) $(2, 0)$ (ب) $(0, 2)$ (ج) $(0, 0)$ (د) $(2, 2)$

٨ إذا كان محور السينات ينصف \overline{AB} حيث $A(2, 3)$ ، $B(2, -٢)$ فإن : $ص =$


- (أ) ٣ (ب) ٢ (ج) -٢ (د) ٤

٢ \overline{AB} حـ شبه منحرف فيه : $\overline{AD} // \overline{BC}$ ، $\angle D = ٩٠^\circ$ ، $AB = ٣$ سم ، $BC = ٦$ سم

، $AD = ٢$ سم أوجد : طول DC ثم أوجد قيمة : $ما (د ح)$

٣ في الشكل المقابل :

النقطة $ح(3, 4)$ منتصف \overline{AB}
أوجد : محيط المثلث ABC



١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ ميل المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها الموجب 30° يساوى

(الجيرة ٢٠)

- (أ) $\tan 30^\circ$ (ب) $\tan 60^\circ$ (ج) $\frac{\tan 30^\circ}{\tan 60^\circ}$ (د) $\tan 30^\circ + \tan 60^\circ$

(الشرقية ١٩)

٢ ميل المستقيم المار بالنقطتين (٢، ٣) ، (٣، ٢) هو

- (أ) صفر (ب) $-\frac{2}{3}$ (ج) $-\frac{3}{2}$ (د) غير معرف.

٣ إذا كان المستقيم ل ميله $\frac{1}{5}$ والمستقيم ل ميله $-\frac{2}{3}$ حيث $ل$ ، $ل$ \perp ل ، فإن : $ل =$

(الشرقية ١٩)

- (أ) $\frac{3}{5}$ (ب) $-\frac{2}{5}$ (ج) ١٥ (د) -15

(الإسكندرية ١٧)

٤ إذا كان المستقيمان اللذان ميلهما $\frac{2}{3}$ ، $\frac{4}{3}$ متوازيين فإن : $ل =$

- (أ) $\frac{3}{4}$ (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) ٣ (د) $-\frac{4}{3}$

(مطروح ٢٠)



٥ في الشكل المقابل :

و (د ح) = 120°

فإن : $س^\circ + ص^\circ =$

- (أ) 90° (ب) 180° (ج) 300° (د) 360°

(الجيرة ١٧)

٦ ميل المستقيم العمودى على المستقيم المار بالنقطتين (٢، ٣) ، (٥، ١) يساوى

- (أ) $\frac{2}{3}$ (ب) $-\frac{2}{3}$ (ج) $\frac{3}{2}$ (د) $-\frac{3}{2}$

(الشرقية ١٦)

٧ بعد النقطة (٣، -٤) عن محور الصادات يساوى وحدات.

- (أ) ٤ (ب) -٤ (ج) ٣ (د) -٣

(الجيرة ٢٠)

٨ إذا كان : $ل (٥، ٧)$ ، $س (١، -١)$ فإن : منتصف $ل س$ هو

- (أ) (٣، ٢) (ب) (٣، ٣) (ج) (٢، ٣) (د) (٤، ٣)

٩ أ ب ح د شكل رباعى حيث النقط (٢، ٣) ، (٦، ٢) ، (٢، -٢) ، (١، -٢)

(دمياط ١٨)

أثبت أن : الشكل أ ب ح د شبه منحرف.

١٠ إذا كان : أ ب ح د متوازي أضلاع فيه : $ل (٣، ٣)$ ، $س (٢، ٢)$ ، $ح (٥، -١)$

(الشرقية ١٩)

فأوجد : ١ إحداثى نقطة تقاطع القطرين.

٢ إحداثى نقطة د

أشهر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المخطئة :
 ٢) معادلة الخط المستقيم المار بنقطة الأصل ويعبر على الاتجاه الموجب لحدود الصفقات بزاوية قياسها ٩٠° وهي

(۲) من = ۴/۵ من + ۹

$$u = \frac{1}{2} \sqrt{1 + 4v^2}$$

1-10

6. 3. 1970

10

 $\lambda = (2)$

والله اعلم

١- (ب)

$$1 \pm (\frac{1}{2})$$

2. (شماره ۱۰۰)

(د) ص = ۲

$$2 = 5 \left(\frac{1}{5} \right)$$

(ب) حص = ۲-

$$2 = s(1)$$

(العربية)

$$V(\underline{b})$$

(ج) ۳

9 (1)

(الوادي الجديد)

$$Y - (1)$$

2 (ج)

$$1 - (\underline{\quad})$$

1. (i)

(الشرقية ٨)

Y. (1)

 $\gamma. (u)$ \circledast 2. (2)

5. (2)


(المُتَوَفِّيَةُ ٣٩)

٢١ ح مثلث قائم الزاوية في ح

، ا ح = 6 سم ، ب ح = 8 سم

أوجد : [١] متنا ٢ متنا - متنا ٢

(د) ۲




(البحيرة ٢٠)

الأسئلة الهامة

في حساب المثلثات والهندسة

من امتحانات المحافظات





ملخص الوحدة الرابعة

حساب المثلثات

النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة

إذا كان ΔABC قائم الزاوية في B فإن :



| | |
|--|--|
| $\sin A = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{BC}{AC}$ | $\cos A = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{AB}{AC}$ |
| $\tan A = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{BC}{AB}$ | $\cot A = \frac{\text{المجاور}}{\text{المقابل}} = \frac{AB}{BC}$ |

إذا كان ΔABC قائم الزاوية في B فإن :

إذا كانت : $\angle A$ و $\angle B$ زاويتين متتامتين فإن :

$\sin A = \cos B$ ، $\cos A = \sin B$

والعكس صحيح أي أنه :

إذا كانت : $\angle A$ و $\angle B$ زاويتين حادتين

وكان : $\sin A = \sin B$ أو $\cos A = \cos B$ فإن : $\angle A = \angle B$ أو $\angle A = 180^\circ - \angle B$

النسب المثلثية لبعض الزوايا الخاصة

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ | $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ |
| $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$ | $\tan 45^\circ = 1$ | $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ |

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

(القاهرة ١٨)

- ١ إذا كانت $\sin A = \frac{1}{2}$ ، فإن $\cos A =$
 (أ) $\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ج) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (د) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(البحر الأحمر ٢٠)

- ٢ إذا كان $\sin A = \frac{1}{2}$ ، فإن $\cos A =$
 (أ) $\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ج) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (د) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(القليوبية ١٩)

- ٣ إذا كانت $\sin A = \frac{1}{2}$ ، فإن $\cos A =$
 (أ) $\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ج) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (د) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(البحر الأحمر ٢١)

- ٤ في ΔABC إذا كان $\angle A = 90^\circ$ ، $\angle B = 45^\circ$ ، فإن $\angle C =$
 (أ) 45° (ب) 90° (ج) 135° (د) 180°

(الغربية ١٦)

- ٥ في ΔABC إذا كان $\angle A = 90^\circ$ ، $\angle B = 45^\circ$ ، فإن $\angle C =$
 (أ) صفر (ب) $\frac{1}{2}$ (ج) ١ (د) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(الإسكندرية ١٨)

- ٦ إذا كانت $\sin A = \frac{1}{2}$ ، فإن $\cos A =$
 (أ) $\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ج) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (د) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(البحر الأحمر ١٩)

- ٧ إذا كانت $\sin A = \frac{1}{2}$ ، فإن $\cos A =$
 (أ) ١ (ب) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ج) $\frac{1}{2}$ (د) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(القاهرة ٢٨)

- ٨ إذا كانت $\sin A = \frac{1}{2}$ ، فإن $\cos A =$
 (أ) ١ (ب) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ج) $\frac{1}{2}$ (د) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(الشرقية ٣٠)

- ٩ في ΔABC إذا كان $\angle A = 90^\circ$ ، فإن $\angle B + \angle C =$
 (أ) 90° (ب) 180° (ج) 270° (د) 360°

(القليوبية ١٧)

- ١٠ إذا كانت $\sin A = \frac{1}{2}$ ، وكانت $\angle A$ قياس زاوية حادة ، فإن $\angle A =$
 (أ) 30° (ب) 60° (ج) 90° (د) 120°

١١ إذا كانت $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ حيث a قياس زاوية حادة فإن b :
 (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

١٢ إذا كانت $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ حيث a قياس زاوية حادة فإن b :
 (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

١٣ إذا كانت قائمة القائمة الزاوية في ΔABC حيث $\angle C = 90^\circ$ فإن $\frac{a}{b}$:
 (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

١٤ إذا كانت قائمة القائمة الزاوية في ΔABC حيث $\angle C = 90^\circ$ فإن $\frac{a}{b}$:
 (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

١٥ إذا كانت قائمة القائمة الزاوية في ΔABC حيث $\angle C = 90^\circ$ فإن $\frac{a}{b}$:
 (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

١٦ في المثلث ΔABC القائمة الزاوية في A يكون جيب تمام الزاوية B : جيب الزاوية C يساوي :
 (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

١٧ إذا كانت $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ حيث a قياس زاوية حادة فإن b :
 (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

١٨ في ΔABC إذا كانت $\angle A = 90^\circ$ فإن ΔABC يكون :
 (أ) منفرج الزاوية.
 (ب) قائم الزاوية.
 (ج) منفرج الزاوية ومتساوي الساقين.
 (د) منفرج الزاوية ومتساوي الساقين.

ثانياً الأسئلة المقالية

١ إذا كانت النسبة بين قياسى زاويتين متكاملتين $3 : 5$ فأوجد القياس الستيني لكل منهما.

٢ إذا كانت النسبة بين قياسات الزوايا الداخلة لمثلث $3 : 4 : 7$ فأوجد القياس الستيني لكل زاوية.


١٣ في الشكل المقابل :

أ ب ح مثلث قائم الزاوية في ب

، أ ب = ٦ سم ، ط أ ح = $\frac{2}{3}$

أوجد : ١ طول كل من أ ب ح ، أ ح

٢ ما أ ح + ما أ ب



(الإسماعيلية ١٢)

١٤ أ ب ح د شبه منحرف متساوي الساقين فيه :

أ ب // د ح ، أ د = ٤ سم ، أ ب = ٥ سم ، ب ح = ١٢ سم

أوجد قيمة المقدار : $\frac{\text{طاب مناح}}{\text{منا' ح} + \text{منا' د}}$

(كفر الشيخ ٣١)

١٥ أ ب ح د شبه منحرف فيه : أ ب // د ح ، ق (د ب) = ٩٠° ، أ ب = ٣ سم

، أ د = ٦ سم ، ب ح = ١٠ سم

أثبت أن : منا (د ح) - ط (د أ ح) = $\frac{1}{4}$

(مطروح ١٨)

١٦ أ ب ح مثلث متساوي الساقين فيه : أ ب = أ ح = ١٠ سم ، ب ح = ١٢ سم

أوجد : ١ ق (د ب)

٢ مساحة سطح المثلث أ ب ح

(بنى سويف ١٦)

١٧ في الشكل المقابل :

إذا كان أ ب ح د مستطيلاً فيه :

أ ب = ٥ سم ، ب ح = ١٢ سم

أوجد : ١ طول أ ح

٢ قيمة ه ط (د أ ح) - ١٣ ما (د أ ح)



(الشرقية ٢٠)

ملخص الوحدة الخامسة الهندسة التحليلية



★ إذا كانت $A(1, 1)$ ، $B(2, 2)$ فإن :

$$\text{طول } \overline{AB} = \sqrt{(\text{فرق السينات})^2 + (\text{فرق الصادات})^2} = \sqrt{(2-1)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$\text{نقطة منتصف } \overline{AB} = \left(\frac{1+2}{2}, \frac{1+2}{2} \right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right)$$

$$\text{ميل } \overline{AB} = \frac{2-1}{2-1} = 1$$

(حيث m قياس الزاوية الموجبة التي يصنعها \overline{AB} مع الاتجاه الموجب لمحور السينات)

★ إذا كان : $A(1, 1)$ ، $B(2, 2)$ مستقيمين ميلهما m_1 ، m_2 على الترتيب فإن :

• $m_1 // m_2$ إذا كان : $m_1 = m_2$ والعكس صحيح.

• $m_1 \perp m_2$ إذا كان : $m_1 \times m_2 = -1$ والعكس صحيح.

★ إذا كانت معادلة الخط المستقيم على الصورة : $mx + ny = c$ فإن :

• ميل الخط المستقيم $= -\frac{m}{n}$

• طول الجزء المقطوع من محور الصادات بالمستقيم $= \frac{c}{n}$ والمستقيم يمر بالنقطة $(0, \frac{c}{n})$

★ إذا كانت معادلة الخط المستقيم على الصورة : $mx + ny = c$ فإن :

$$\text{ميل الخط المستقيم} = -\frac{\text{معامل } x}{\text{معامل } y} = -\frac{m}{n}$$

• طول الجزء المقطوع من محور الصادات بالمستقيم $= \frac{c}{n}$

والمستقيم يمر بالنقطة $(0, \frac{c}{n})$

★ معادلة المستقيم الذي يمر بنقطة الأصل و $(0, 1)$ هي : $mx + ny = 0$ حيث m الميل.

★ معادلة محور السينات هي $y = 0$

★ معادلة محور الصادات هي $x = 0$

الأسئلة الهامة على الوحدة الخامسة

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

(القاهرة ١٤)

- ١ إذا كان : $\vec{a} \perp \vec{b}$ وكان ميل $\vec{a} = \frac{1}{4}$ فإن : ميل $\vec{b} =$
 (أ) ٢ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $-\frac{1}{4}$ (د) -٢

(الجيزة ٢٠)

- ٢ ميل المستقيم الذى يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها الموجب 30° يساوى
 (أ) $\tan 30^\circ$ (ب) $\cot 30^\circ$ (ج) $\frac{\tan 30^\circ}{\cot 30^\circ}$ (د) $\tan 30^\circ + \cot 30^\circ$

(الإسكندرية ٣٠)

- ٣ إذا كانت : ح (٦ ، ٤) هى منتصف \vec{AB} حيث $A(3, 5)$ فإن : نقطة B هى
 (أ) (٧ ، ٥-) (ب) (٧- ، ٥-) (ج) (٧ ، ٥-) (د) (٧- ، ١١-)

(الوادى الجديد ١٩)

- ٤ إذا كان : \vec{a} ح \vec{b} مستطيلاً ، $A(0, 1)$ ، ح (٤ ، ٤) B فإن : $B =$ وحدة طول.
 (أ) ٥ (ب) ٨ (ج) ٩ (د) ١٠

(الإسماعيلية ١٨)

- ٥ المستقيم الذى معادلته : $2x = 3y + 6$ يقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات جزءاً طوله وحدة طول.
 (أ) $\frac{3}{2}$ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٦

(الشرقية ١٨)

- ٦ طول نصف قطر الدائرة التى مركزها $(-2, 3)$ وتمر بالنقطة $(2, -1)$ يساوى وحدة طول.
 (أ) ٥ (ب) $4\sqrt{2}$ (ج) ٢ (د) ٣

(الأقصر ١٦)

- ٧ ميل المستقيم الذى معادلته : $x - y + 3 = 0$ هو
 (أ) -٣ (ب) -١ (ج) ١ (د) ٣

(القاهرة ٠١)

- ٨ فى مستوى إحداثى متعامد النقطة التى تبعد عن نقطة الأصل مسافة ٢ وحدة طول يمكن أن تكون
 (أ) (٢ ، ١) (ب) (١ ، ٢) (ج) (٠ ، ٢) (د) (-٣ ، ٥)

(بنى سويف ١٦)

- ٩ دائرة مركزها نقطة الأصل وطول نصف قطرها ٢ وحدة طول ، فأى من النقاط الآتية تنتمى للدائرة ؟ (بنى سويف ١٦)
 (أ) (١ ، $2\sqrt{2}$) (ب) (-٢ ، ١) (ج) ($2\sqrt{2}$ ، ١) (د) ($2\sqrt{2}$ ، ١)

الأسئلة العامة

١٠ إذا كان : \overline{AB} قطرًا في دائرة حيث $A(3, 5)$ ، $B(5, 1)$ فإن مركز الدائرة هو

(مطروح ١٨)

- (أ) $(2, 4)$ (ب) $(4, 2)$ (ج) $(2, 2)$ (د) $(8, 2)$

١١ إذا كان : \vec{a} ، \vec{b} ميلى مستقيمين متوازيين فإن :

(بور سعيد ٠٨)

- (أ) $\vec{a} - \vec{b} = 0$ (ب) $\vec{a} + \vec{b} = 0$ (ج) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ (د) $\vec{a} - \vec{b} \neq 0$

١٢ إذا كان : \vec{a} ، \vec{b} ميلى مستقيمين متعامدين ، $\vec{a} = 0.75$ فإن : $\vec{b} =$

(الشرقية ١٣)

- (أ) $\frac{3}{4}$ (ب) $\frac{4}{3}$ (ج) $-\frac{4}{3}$ (د) $-\frac{3}{4}$

١٣ المستقيم الذى معادلته : $3x - 3y + 5 = 0$ يصنع زاوية موجبة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات قياسها

(المنوفية ١١)

- (أ) 30° (ب) 45° (ج) 60° (د) 90°

١٤ المستقيم الذى معادلته : $2x + 5y - 10 = 0$ يقطع من الجزء الموجب لمحور السينات جزءًا طوله يساوى وحدة طول.

(الدقهلية ١١)

- (أ) $\frac{2}{5}$ (ب) 2 (ج) $\frac{5}{2}$ (د) 5

١٥ إذا كان المستقيمان : $3x - 4y - 3 = 0$ ، $4x + 8y - 8 = 0$ متعامدين فإن : $\vec{a} =$

(البحيرة ١٥)

- (أ) $4 -$ (ب) $3 -$ (ج) 2 (د) 4

١٦ إذا كان المستقيمان : $5x + 3y - 5 = 0$ ، $2x + 3y - 2 = 0$ متوازيين فإن : $\vec{a} =$

(سوهاج ١٦)

- (أ) $2 -$ (ب) $1 -$ (ج) 1 (د) 2

١٧ المستقيم الذى معادلته : $2x - 3y - 6 = 0$ يقطع من الجزء السالب لمحور الصادات جزءًا طوله وحدة طول.

(القاهرة ١٤)

- (أ) $6 -$ (ب) $2 -$ (ج) $\frac{2}{3}$ (د) 2

١٨ المسافة العمودية بين النقطة $(3, 4)$ ومحور السينات تساوى وحدة طول.

(الشرقية ٢٠)

- (أ) 3 (ب) $4 -$ (ج) 5 (د) 4

(المنفوية ٢١)

٢١ إذا كان المستقيمان اللذان ميلاهما $\frac{2}{3}$ ، $\frac{6}{4}$ متعامدين فإن : $\angle =$
 (أ) ٩ (ب) ٩- (ج) ٤- (د) ٤

(القليوبية ٢٢)

٢٢ إذا كان ميل المستقيم : $4 - 3س + 2ص = 0$ يساوى ٢ فإن : $\angle =$
 (أ) $\frac{1}{3}$ (ب) ٢- (ج) $\frac{1}{4}$ (د) ٢

(الغربية ٢٣)

٢٣ البعد العمودى بين المستقيمين : $س + 2 = 0$ ، $س - 4 = 0$ يساوى وحدة طول.
 (أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٦

(الغربية ٢٤)

٢٤ إذا كان البعد بين النقطتين (٢ ، ٠) ، (٠ ، ١) هو وحدة طول واحدة فإن : $\angle =$
 (أ) ١ (ب) ١- (ج) ٠ (د) ٢

(المنفوية ٢٥)

٢٥ المستقيم الذى معادلته : $\frac{س}{2} - \frac{ص}{3} = 6$ يقطع من الجزء الموجب لمحور السينات جزءاً طوله وحدة طول.
 (أ) ٢ (ب) ١٢ (ج) ٦ (د) ١٨

(القليوبية ٢٦)

٢٦ ميل المستقيم الموازى لمحور السينات هو
 (أ) ١- (ب) صفر (ج) ١ (د) غير معرف.

(المنفوية ٢٧)

٢٧ معادلة المستقيم الذى يمر بالنقطة (٣ ، ٤-) ويوازى محور الصادات هى
 (أ) $ص - ٤ =$ (ب) $س = ٢$ (ج) $ص = ٣$ (د) $س - ٤ =$

(المنفوية ٢٨)

٢٨ إذا كان المستقيمان : $س - ٤ = ٣ - ٠$ ، $٤ = ٨ - ١$ متعامدين فإن : $\angle =$
 (أ) ٦- (ب) ٣- (ج) ٣ (د) ٦

(كفر الشيخ ٢٩)

٢٩ إذا كان المستقيم المار بالنقطتين (٣ ، ١) ، (٢ ، ٣) ميله يساوى ٦٠° فإن : $ص =$
 (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥

(المنفوية ٣٠)

٣٠ المستقيم : $ص = س + ٣٠$ ح يمر بالنقطة (٤ ، ٦) فتكون ح =
 (أ) ٤ (ب) ٦ (ج) ٨ (د) ٢

الأسئلة العامة

٢٩ بُعد النقطة (ل، ٤) عن محور الصادات يساوي وحدة طول حيث $ل \in \mathbb{C}$ (دمياط ١٨)


(د) ١

(ج) ٤

(ب) ل

(١) ٤

٣٠ في الشكل المقابل :



(السويس ١٧)

معادلة المستقيم ل هي

(١) $ص = ٢ - ٣س$

(ب) $ص = ٣ + ٢س$

(ج) $١ = \frac{ص}{٣} + \frac{س}{٢}$

(د) $٥ = \frac{ص}{٣} + \frac{س}{٢}$

٣١ إذا كان المستقيم الذي معادلته : $١س + (٢ - ١)ص = ٥$ يوازي المستقيم المار بالنقطتين (١، ٤) و (٣، ٥) فإن :

(كفر الشيخ ٣٠)

(د) صفر

(ج) ١

(ب) ٢-

(١) ٣

٣٢ البُعد العمودي بين المستقيمين : $ص + ١ = صفر$ ، $ص + ٣ = صفر$ يساوي وحدة طول.

(البحيرة ١٧)

(د) ٥

(ج) ١

(ب) ٢

(١) ٤

٣٣ إذا كان المستقيمان : $ص = ١س + ب$ ، $ص = حس + د$ متعامدين فإن :

(الغربية ٠٨)

(د) $د \times ب$

(ج) $١ \times ح$

(ب) $ب \times ح$

(١) $١ \times د$

٣٤ مساحة المثلث بالوحدات المربعة المحدد بالمستقيما : $٣س - ٤ص = ١٢$ ، $٠ = ص$ ، $٠ = س$ تساوي

(القليوبية ١٥)

(د) ٦-

(ج) ١٢

(ب) ٧

(١) ٦

٣٥ إذا كان المستقيم المار بالنقطتين (٠، ٤) ، (٤، ٠) عمودياً على المستقيم الذي يصنع زاوية موجبة قياسها ٤٥° مع الاتجاه الموجب لمحور السينات فإن :

(أسوان ١٣)

(د) ١-

(ج) ١

(ب) ٤-

(١) ٤

ثانياً الأسئلة المقالية

- ١ أثبت أن النقط $A(3, 4)$ ، $B(1, 1)$ ، $C(-5, 2)$ تقع على استقامة واحدة. (أسبوط ١٤)
- ٢ بين نوع المثلث ABC حيث $A(4, 2)$ ، $B(1, 3)$ ، $C(5, 4)$ بالنسبة لأطوال أضلاعه. (الجيزة ١٧)
- ٣ إذا كان بعد النقطة $(س, ٥)$ عن النقطة $(٦, ١)$ يساوي $\sqrt{٥}$ وحدة طول فأوجد : قيم $س$ (الإسكندرية ٢٠)
- ٤ أثبت أن النقط $A(1, 3)$ ، $B(-4, 6)$ ، $C(2, 2)$ تقع على دائرة واحدة مركزها النقطة $M(-1, 2)$ ثم أوجد محيط الدائرة بدلالة π (الغربية ١٩)
- ٥ أثبت أن المثلث الذي رؤوسه $A(3, 4)$ ، $B(-3, 2)$ ، $C(0, 3)$ قائم الزاوية في C ثم أوجد إحداثي الرأس E التي تجعل الشكل ACE مستطيلاً. (الشرقية ١٧)
- ٦ ABC شكل رباعي رؤوسه $A(3, 5)$ ، $B(6, 2)$ ، $C(1, -1)$ ، $D(4, 0)$ باستخدام الميل أثبت أن الشكل ABC متوازي أضلاع ثم بين أن متوازي الأضلاع ACE يكون معيناً. (الدقهلية ١٧)
- ٧ إذا كانت النقطة $(1, 3)$ هي منتصف القطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين $(1, ص)$ ، $(س, ٢)$ أوجد : قيمتي $س$ ، $ص$ (الإسكندرية ١٨)
- ٨ أثبت أن النقط $A(3, 3)$ ، $B(3, 0)$ ، $C(0, 0)$ ، $D(0, 3)$ الواقعة في مستوى إحداثي متعامد هي رؤوس مربع واحسب طول قطره ومساحته. (الأقصر ٠٩)
- ٩ إذا كانت $A(س, ٢)$ ، $B(2, 3)$ ، $C(١, ٥)$ وكانت $AB = BC$ فأوجد : قيمة $س$ (البحيرة ١٥)
- ١٠ النقط الثلاث $A(3, ٢)$ ، $B(س, ٣)$ ، $C(٢, ٥)$ تقع على استقامة واحدة فإذا كانت AB منتصف AC فأوجد قيمة : $س + ص$ (الدقهلية ١٧)
- ١١ AB قطر في دائرة مركزها M فإذا كانت : $B(٨, ١١)$ ، $M(٥, ٧)$ فأوجد : 1 إحداثي A 2 محيط الدائرة حيث $\pi = ٣,١٤$ (كفر الشيخ ١٨)

الأسئلة العامة

١٢ أثبت أن النقط $A(0, 3)$ ، $B(4, 2)$ ، $C(1, 6)$ هي رؤوس مثلث متساوي الساقين رأسه A ثم أوجد طول القطعة المستقيمة المرسومة من A عمودية على BC (قنا ١٩)

١٣ A ب C متوازي أضلاع فيه $A(2, 3)$ ، $B(4, 5)$ ، $C(0, 3)$ أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطريه ، ثم أوجد إحداثي نقطة (أسوط ١٧)

١٤ إذا كان المستقيم L يمر بالنقطتين $(1, 3)$ ، $(2, 4)$ والمستقيم L يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها 45° أوجد قيمة k التي تجعل L ، L متوازيين. (الحيزه ٣٠)

١٥ أوجد معادلة الخط المستقيم المار بالنقطة $(2, 3)$ ويصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها 45° (الشرقية ١٧)

١٦ أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يقطع من محوري الإحداثيات السيني والصادي جزءين موجبين طولاهما 4 ، 9 على الترتيب. (القليوبية ١٩)

١٧ أوجد معادلة الخط المستقيم المار بالنقطتين $(2, 4)$ ، $(-1, 2)$ ثم أثبت أنه يمر بنقطة الأصل. (الإسكندرية ١٨)

١٨ إذا كانت $A(1, 3)$ ، $B(3, 5)$ نقطتين ، أوجد معادلة محور تماثل AB (الشرقية ٣٠)

١٩ أوجد معادلة المستقيم الذي ميله يساوي ميل الخط المستقيم $\frac{1-s}{s} = \frac{1}{3}$ ويقطع جزءًا سالبًا من محور الصادات مقداره 3 وحدات. (دمياط ١٨)

٢٠ إذا كانت $A(1, 5)$ ، $B(3, 7)$ ، $C(1, 3)$ ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة A ويوازي BC (الشرقية ١٩)

٢١ أوجد الميل وطول الجزء المقطوع من محور الصادات بالمستقيم الذي معادلته :
$$1 = \frac{x}{2} + \frac{y}{3}$$
 (بنى سويف ١٦)

٢٢ أوجد معادلة المستقيم العمودي على المستقيم $3x - 4y + 7 = 0$ صفر ويقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات جزءًا طوله 4 وحدات. (المنوفية ٣٠)

٢٣ A ب C مثلث فيه $A(2, 1)$ ، $B(5, 2)$ ، $C(3, 4)$ ، D منتصف AB ، رسم DE // BC ويقطع AC في F ، أوجد : ١ طول DE ٢ معادلة DE (مطروح ١٨)

٢٤ أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يقطع ٣ وحدات من الجزء الموجب لمحور الصادات

وعمودي على المستقيم : $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$


٢٥ في الشكل المقابل :

النقطة ح منتصف \overline{AB} حيث ح (٤ ، ٣) ،
و نقطة الأصل لنظام إحداثي متعامد.
أوجد :

١ إحداثي كل من النقطتين ١ ، ٢

٢ معادلة \overline{AB}

(الشرقية ١٩)



(الغربية ١٩)

٢٦ في الشكل المقابل :


ح يمر بالنقطتين ١ (٢ ، ٣) ، ٢ (٦ ، ٣-)
ويقطع محوري الإحداثيات في النقطتين ح ، د على الترتيب.

أوجد بالبرهان :

١ معادلة ح د

٢ مساحة المثلث د و ح حيث و نقطة الأصل.

(المنوفية ١٩)



(الشرقية ١٧)

٢٧ في الشكل المقابل :

\overline{AB} يقطع من الجزء الموجب

للمحور الصادي جزءاً طوله ٣ وحدات طول

، ٢ = ٥ وحدات طول.


أوجد : معادلة \overline{AB}

٢٨ في الشكل المقابل :

١ و مثلث متساوي الأضلاع

ح منتصف \overline{AB}


أوجد : معادلة و ح حيث و نقطة الأصل.



(الجيزة ٢٠)

الامتحانات النهائية

في حساب المثلثات والهندسة





نموذج ١

اجب عن الاسئلة الاتية ،

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ ط ٤٥° =

١ (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د)

٢ إذا كانت : $\sin A = \frac{1}{2}$ فإن : $\cos A =$ حيث A قياس زاوية حادة.

١ (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د)

٣ البعد بين النقطتين $(0, 3)$ ، $(4, 0)$ يساوي وحدات طول.

١ (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د)

٤ إذا كان المستقيمان : $3x + 2y = 5$ ، $2x + y = 0$ متعامدين فإن : $\tan \theta =$

١ (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د)

٥ إذا كانت : $P(7, 5)$ ، $Q(1, 1)$ فإن نقطة منتصف \overline{PQ} هي

١ (أ) $(2, 3)$ (ب) $(3, 2)$ (ج) $(3, 3)$ (د) $(2, 2)$

٦ معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة $(3, -5)$ ويوازي محور الصادات هي

١ (أ) $3 = x$ (ب) $5 = -x$ (ج) $2 = x$ (د) $5 = -x$

٢ (أ) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن : $\sin 60^\circ = 2 \sin 30^\circ \cos 30^\circ$

(ب) أثبت أن النقط : $P(-3, 1)$ ، $Q(6, 5)$ ، $R(2, 3)$ تقع على استقامة واحدة.

٣ (أ) إذا كانت : $4 \sin A = 3 \cos A$ فأوجد : قيمة $\sin A$ حيث A قياس زاوية حادة.

(ب) إذا كانت : $6 \cos A = 4 \sin A$ فأوجد إحداثي النقطة P

٤ (أ) إذا كان المستقيم L يمر بالنقطتين $(3, 1)$ ، $(2, 2)$ ، والمستقيم M يصنع مع الاتجاه الموجب

لمحور السينات زاوية موجبة قياسها 45° فأوجد : قيمة $\cos \theta$ إذا كان : $L \parallel M$

(ب) P ح مثلث قائم الزاوية في ح فيه : $4 = \sin A$ ، $6 = \sin B$ ، $8 = \sin C$

أوجد : $1 \sin A - 2 \sin B$ (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥

٥ (أ) أوجد معادلة المستقيم الذي ميله ٢ ويمر بالنقطة (١، ٠).

(ب) أثبت أن النقط : ٢ (١، -١) ، ٣ (-٤، ٦) ، ٤ (٢، -٢) الواقعة في مستوى إحداثي متعامد تمر بها دائرة واحدة مركزها النقطة م (١، ٢) ثم أوجد محيط الدائرة.

نموذج ٢

أجب عن الاسئلة الآتية ،

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ ما ٢٠ ط ٦٠° =

(أ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (ب) ٣ (ج) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (د) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

٢ معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢، -٣) ويوازي محور السينات هي

(أ) $y = -2$ (ب) $y = 3$ (ج) $y = -2$ (د) $y = 3$

٣ إذا كانت : $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ، θ قياس زاوية حادة فإن : ما θ =

(أ) ١ (ب) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ج) ٢ (د) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

٤ دائرة مركزها نقطة الأصل وطول نصف قطرها ٢ وحدة طول فإن النقطة تنتمي إليها.

(أ) (١، ٠) (ب) (٢، -٥) (ج) (١، $\sqrt{3}$) (د) (٠، ١)

٥ البعد العمودي بين المستقيمين : $y = 2x - 1$ ، $y = 3x + 1$ يساوي وحدة طول.

(أ) ١ (ب) ٥ (ج) ٢ (د) ٣

٦ إذا كان المستقيمان اللذان ميلاهما $-\frac{2}{3}$ ، $\frac{1}{3}$ متوازيين فإن : $\theta =$

(أ) ٦ (ب) -٤ (ج) $\frac{2}{3}$ (د) ٢

٢ (١) إذا كانت : $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ، θ فـأوجد : θ (د) حيث θ زاوية حادة.

(ب) بين نوع المثلث الذي رؤوسه النقط : ٢ (٣، ٣) ، ٣ (١، ٥) ، ٤ (٣، ١) بالنسبة لأطوال أضلاعه.

٣ (١) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطتين (١، ٣) ، (١، -٣) ثم أثبت أنه يمر بنقطة الأصل.

(ب) إذا كانت النقطة (٣، ١) في منتصف البعد بين النقطتين (١، ٣) ، (٣، ١) أوجد النقطة (س، ص)

٤ (١) أوجد معادلة المستقيم الذي يقطع من محورى الإحداثيات السينى والصادى جزءين موجبين طولهما ١ ، ٤ وحدات طول على الترتيب ثم أوجد ميل المستقيم.

(ب) أ ب ح مثلث قائم الزاوية فى ب فيه : $ا = ١٠$ سم ، $ب = ٨$ سم

أثبت أن : $ما^٢ = ١ + ٢$ $ما^٢ ح + ح^٢$

٥ (١) أثبت أن المستقيم المار بالنقطتين $(١- ، ٣)$ ، $(٢ ، ٤)$ يوازي المستقيم : $٣ ص - ٤ س - ١ = ٠$.

(ب) أ ب ح د شبه منحرف فيه :

$ا // ب$ ، $ح (د) = ٩٠^\circ$ ، $ا = ٣$ سم ، $ب = ٦$ سم ، $د = ٢$ سم

أوجد : طول $د ح$ ثم أوجد : قيمة $ما (د ح د)$

نموذج امتحان للطلاب المدمجين

اجب عن الاسئلة الآتية ،

1. ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ :
 1. البعد بين النقطتين (0 ، 4) ، (0 ، 9) يساوي 5 وحدات طول. ()
 2. إذا كانت : طاه = 1 فإن : ح (د هـ) = 40° ()
 3. المستقيم الذي معادلته : ص = 2 س + 1 يقطع من محور الصادات جزءاً طوله 1- ()
 4. إذا كان : $\vec{AB} \perp \vec{CD}$ فإن : ميل $\vec{AB} \times$ ميل $\vec{CD} = 1$ ()
 5. حيث كل من \vec{AB} ، \vec{CD} لا يوازي أيًا من المحورين ()
 6. إذا كانت : 4 (1 ، 2) ، 3 (4 ، 3) فإن نقطة منتصف \vec{AB} هي (2 ، 3) ()

2. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1. بعد النقطة (4 ، 3) عن المحور السيني يساوي وحدات طول.
 - (أ) 3- (ب) 2 (ج) 4 (د) 4-
2. 4 من 30° طاه = 60°
 - (أ) 3 (ب) 2 (ج) 6 (د) 12
3. إذا كان المستقيمان : س + ص = 0 ، ل + س + 2 ص = 0 متوازيين فإن : ل =
 - (أ) 2- (ب) 1- (ج) 1 (د) 2
4. النقط (0 ، 0) ، (0 ، 3) ، (4 ، 0)
 - (أ) تكون مثلثاً منفرج الزاوية. (ب) تكون مثلثاً حاد الزوايا.
 - (ج) تكون مثلثاً قائم الزاوية. (د) تقع على استقامة واحدة.
5. إذا كان : $\vec{AB} // \vec{CD}$ وكان ميل $\vec{AB} = \frac{2}{3}$ فإن : ميل $\vec{CD} =$
 - (أ) $\frac{2}{3}$ (ب) $\frac{3}{2}$ (ج) $\frac{2}{3}$ (د) $\frac{3}{2}$
6. إذا كانت : ما س = $\frac{1}{4}$ حيث س قياس زاوية حادة فإن : ما 2 س =
 - (أ) 1 (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $\frac{3}{4}$ (د) $\frac{1}{3}$

٣ صل من العمود (١) بما يناسبه من العمود (ب) :

| العمود (ب) | العمود (١) |
|-----------------------|---|
| ١٠ | ١ ميل المستقيم الموازي للمحور السيني يساوى |
| صفر | ٢ ما ٣٠° + ما ٣٠° = |
| ١ | ٣ إذا كان : أ ب ح د مستطيلاً ، أ (١- ، ٤-) ، ح (٥ ، ٤) فإن : طول ب د = وحدة طول. |
| ٣- | ٤ معادلة المستقيم المار بنقطة الأصل وميله ٢ هى ص = س |
| ٢ | ٥ معادلة المستقيم الذى يمر بالنقطة (٢ ، ٣-) ويوازي محور السينات هى ص = |
| $\frac{٣\sqrt{2}}{٢}$ | ٦ قيمة المقدار : $\frac{٢ \text{ ط } ٣٠^\circ}{١ + ٣٠^\circ \text{ ط } ٣٠^\circ} = \dots\dots\dots$ |

٤ أكمل ما يأتى :


١ إذا كان : أ ب // ح د وكان ميل أ ب = $\frac{١}{٢}$ فإن : ميل ح د =

٢ فى الشكل المقابل :

أ ب ح مثلث قائم الزاوية فى ب

، أ ب = ٣ سم ، ب ح = ٤ سم

فإن : ما ح =



٣ إذا كانت النقطة (٠ ، ٢) تنتمى للمستقيم : ٣ س - ٤ ص = ١٢ فإن : أ =

٤ إذا كان : س ما ٦٠° = ط ما ٤٥° فإن : س =

٥ البعد بين النقطة (٤ ، ٣) ونقطة الأصل فى نظام إحداثى متعامد يساوى

٦ إذا كانت نقطة الأصل هى منتصف أ ب حيث أ (٥ ، ٢-) فإن نقطة ب هى (..... ،)



محافظة القاهرة

١

اجب عن الاسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : ما $s = \frac{1}{4}$ حيث s قياس زاوية حادة فإن : $s = \dots\dots\dots^\circ$
(أ) ٣٠ (ب) ٤٥ (ج) ٦٠ (د) ٩٠

٢ المستقيم الذى معادلته : $s = 3 + 4$ يقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات جزءاً طوله
..... وحدة طول.
(أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٧

٣ قياس الزاوية الخارجة عن المثلث المتساوى الأضلاع يساوى
(أ) ١٢٠ (ب) ٩٠ (ج) ٦٠ (د) ٣٠

٤ إذا كان : $\Delta ABC \equiv \Delta DEF$ s s c فإن : $a = b = \dots\dots\dots$
(أ) b (ب) s (ج) s (د) s

٥ معادلة المستقيم الذى ميله ١ ، ويمر بنقطة الأصل هى
(أ) $s = 1 + s$ (ب) $s = 1$ (ج) $s = 1$ (د) $s = s$

٦ الزاوية التى قياسها 30° تكمل زاوية قياسها
(أ) ٦٠ (ب) ١٢٠ (ج) ١٥٠ (د) ١٨٠

٢ (أ) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن : 4 ما 45° ما $45^\circ = 2$ (مع توضيح خطوات الحل).

(ب) أوجد معادلة الخط المستقيم المار بالنقطة (١ ، ٢) ويوازي المستقيم الذى معادلته : $s = 3 + s$

٣ (أ) أوجد قيمة s التى تحقق أن : s ما 30° ما $30^\circ + 60^\circ$ ما 60°

(ب) أثبت أن المستقيم المار بالنقطتين (٥ ، ٠) ، (٢ ، ٣) عمودى على المستقيم الذى يصنع زاوية قياسها 45° مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.

٤ (أ) ABC متوازي أضلاع تقاطع قطراه فى M حيث : $AB = 1$ ، $BC = 7$
أوجد : إحداثى نقطة M

(ب) ABC مثلث رؤوسه $A(2, 8)$ ، $B(-1, 4)$ ، $C(3, 1)$

أثبت أن : (١) المثلث ABC قائم الزاوية فى B (٢) المثلث ABC متساوى الساقين.

- ٥ (أ) احس مثلث قائم الزاوية في ب ، $ا = ٧$ سم ، $ب = ٢٤$ سم ، أوجد قيمة :
 (ب) إذا كانت : $(٠ ، ١)$ ، $(٢ ، ٣)$ ، $(٢ ، ٥)$ ثلاث نقط على استقامة واحدة أوجد : قيمة $ا$



محافظة البصرة

أجب عن الاسئلة الآتية :



- ١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :
 محيط الشكل المقابل يساوي سم
 (أ) ٤٤ (ب) ٢٢ (ج) ١٨ (د) ١١
 ٢ إذا كان : $س = ٥٠^\circ$ ، $ص = ٢٠^\circ$ قياس زاويتين متتامتين وكانت $ما = ٢٠^\circ$ فإن : $ص =$
 (أ) $\frac{٤}{٥}$ (ب) $\frac{٣}{٥}$ (ج) $\frac{٢}{٤}$ (د) $\frac{٥}{٣}$
 ٣ احس $ا$ ح $ا$ متوازي أضلاع فيه : $ق = (٢ د)$: $ق = (د ب) = ١ : ٢$ فإن : $ق = (د ب) =$
 (أ) ٤٥ (ب) ١٣٥ (ج) ١٢٠ (د) ١١٥
 ٤ الخط المستقيم الذي معادلته : $ص - ٢ س - ٥ = ٥$ صفر يقطع من الجزء الموجب للمحور الصادي جزءاً طوله يساوي وحدة طول.
 (أ) ٢ (ب) ٥ (ج) ٧ (د) ١٠
 ٥ في $\Delta ا ب ح$ إذا كانت الزاويتان $ا$ ، $ب$ متتامتين فإن : $ق = (د ح) =$
 (أ) ٤٥ (ب) ٣٠ (ج) ٩٠ (د) ٦٠
 ٦ ميل المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها ٥٠° يساوي
 (أ) $ما = س$ (ب) $ما = س$ (ج) $\frac{ما}{س}$ (د) $ما = س + ما = س$

- ٢ (أ) احس $ا$ ح $ا$ شبه منحرف فيه : $ا ب // ب ح$ ، $ق = (د ب) = ٩٠^\circ$ فإذا كان :


$$ا = ٣ \text{ سم} ، ا ب = ٦ \text{ سم} ، ب ح = ١٠ \text{ سم} .$$

$$\text{أثبت أن : } ما = (د ح) - ط ا = (د ا ح) = \frac{١}{٣}$$

(ب) إذا كان المستقيم ل يمر بالنقطتين $(١ ، ٣)$ ، $(٢ ، ٤)$ والمستقيم م يصنع مع الاتجاه الموجب

لمحور السينات زاوية قياسها ٤٥° أوجد : قيمة $ك$ التي تجعل المستقيمين : ل ، م متوازيين.

٣ (١) في الشكل المقابل :



أ ب ح مثلث فيه : $\angle 1 = 90^\circ$

، $\angle 2 = 15^\circ$ سم ، $\angle 3 = 20^\circ$ سم.

أثبت أن : $\angle 1$ مناسبات - ما $\angle 2$ ما $\angle 3$ = صفر


(ب) أ ب ح د متوازي أضلاع تقاطع قطراه في هـ حيث $\angle 1 = 30^\circ$ ، $\angle 2 = 60^\circ$ ، $\angle 3 = 70^\circ$ أوجد : إحداثي كل من النقطتين هـ ، د

٤ (١) بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة \sin حيث \sin قياس زاوية حادة موجبة تحقق المعادلة : $\tan \theta = 4$ ما $\theta = 30^\circ$ ما $\theta = 60^\circ$

(ب) أوجد معادلة الخط المستقيم المار بالنقطة $(2, 4)$ عمودياً على المستقيم : $5x - 2y + 7 = 0$ صفر

٥ (١) إذا كان البعد بين النقطتين $(9, 7)$ ، $(0, 3)$ يساوي ٥ وحدات طول فأوجد : قيمة θ

(ب) في الشكل المقابل :



أ ب و مثلث متساوي الأضلاع

، ح منتصف أ ب

أوجد : معادلة و ح حيث و نقطة الأصل.



محافظة الإسكندرية

٣

اجب عن الاسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : ح $(6, -4)$ هي منتصف أ ب حيث $\angle 1 = (5, -3)$ فإن : نقطة ب هي

(أ) $(7, -5)$ (ب) $(-5, 7)$ (ج) $(-5, 7)$ (د) $(11, -7)$

٢ متممة الزاوية التي قياسها 60° هي زاوية قياسها

(أ) 120° (ب) صفر (ج) 30° (د) 90°

٣ إذا كانت : ما هـ $6, 0$ فإن : ح $(د هـ) =$

(أ) $51^\circ 33' 25''$ (ب) $36^\circ 52' 12''$ (ج) $47^\circ 15' 48''$ (د) $45^\circ 15' 6''$

٤ طول قطر المربع الذي مساحته ١٠٠ سم^٢ يساوي سم.

(أ) ١٠ (ب) ٥٠ (ج) $10\sqrt{2}$ (د) $2\sqrt{10}$

٥) أ ب ح مثلث قائم الزاوية في ب فيه : $\angle (1, 1)$ ، $\angle (2, 1)$ ، $\angle (3, 1)$ فإن : ميل ب ح =

(د) ٣-

(ج) $\frac{1}{3}$

(ب) ٢

(أ) $\frac{1}{3}$

٦) مجموع طولى أى ضلعين فى مثلث طول الضلع الثالث.


(د) ضعف

(ج) أكبر من

(ب) يساوى

(أ) أصغر من

٧) (أ) فى الشكل المقابل :



أ ب ح مثلث متساوى الساقين وقائم الزاوية فى ح

وطول كل من ساقيه ل وحدة طول

أوجد : ١) النسبة بين أطوال أضلاع المثلث ٢ ح : ب ح : أ ب

٢) ط أ ، ما ٢

(ب) إذا كان بعد النقطة (س ، ٥) عن النقطة (٦ ، ١) يساوى ٢ $\sqrt{5}$ وحدة طول فأوجد : قيم س

٨) (أ) إذا كانت النقط : ١ (٢ ، ٣) ، ٢ (٤ ، ٣) ، ٣ (١ ، ٢) ، ٤ (٢ ، ١) ، ٥ (٣ ، ٢) ، ٦ (٢ ، ٣) هى رؤوس معين

أوجد : ١) إحداثى نقطة تقاطع القطرين. ٢) مساحة المعين أ ب ح د

(ب) بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة س (حيث س قياس زاوية حادة) التى تحقق :

$$2 \text{ ما } س = 30^\circ \text{ ما } 60^\circ + 30^\circ \text{ ما } 60^\circ$$

٩) (أ) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة (١ ، ٢) عمودياً على الخط المستقيم المار بالنقطتين

١ (٢ ، ٣) ، ٢ (٤ ، ٥)

(ب) أثبت صحة المتساوية الآتية مبيناً الخطوات : $\frac{2 \text{ ط } 30^\circ}{30^\circ - 1} = 60^\circ$

١٠) (أ) إذا كان المستقيم ل يمر بالنقطتين (١ ، ٣) ، (٢ ، ٤) والمستقيم ل_٢ يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور

السينات زاوية قياسها ٤٥° أوجد : قيمة ل_٢ إذا كان : ل_١ // ل_٢

(ب) أثبت أن النقط : ١ (٢ ، ٣) ، ٢ (٤ ، ٥) ، ٣ (١ ، ٢) ليست على استقامة واحدة.



محافظة القليوبية

٤

أجب عن الأسئلة الآتية :

١) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) إذا كانت : $\frac{2\sqrt{2}}{3} = \text{ما } س$ حيث س قياس زاوية حادة فإن : ما ٢ س =

(د) $\frac{2}{3\sqrt{2}}$

(ج) ١

(ب) $\frac{2\sqrt{2}-1}{2}$

(أ) $\frac{1}{3\sqrt{2}}$

٢ عدد محاور التماثل للدائرة يساوي

(أ) صفر (ب) ١

(ج) ٢

(د) عدد لا نهائي

٣ إذا كان \vec{a} و \vec{b} مستطيلًا ، $\vec{a} = (1, -4)$ ، $\vec{b} = (5, 1)$ فإن طول $\vec{a} \times \vec{b}$ = وحدة طول.

(أ) ١٠ (ب) ٦

(ج) ٥

(د) ٤

٤ البعد العمودي بين المستقيمين : $s = 5$ ، $s + 3 =$ صفر يساوي وحدة طول.

(أ) ٢ (ب) ٨

(ج) ٨-

(د) ٥

٥ \vec{a} و \vec{b} مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية في \vec{c} وطول كل من ساقيه يساوي ١ وحدة طول فإن $\vec{a} \times \vec{b} : \vec{c} =$ وحدة طول.


(أ) $1 : 1 : \sqrt{2}$

(ب) $1 : \sqrt{2} : 1$

(ج) $\sqrt{2} : 1 : 2$

(د) $\sqrt{2} : 1 : 1$

٦ في الشكل المقابل :



معادلة المستقيم ل هي

(أ) $s = \sqrt{3}$

(ب) $s = \sqrt{3}$

(ج) $s =$ ص

(د) $s = \sqrt{3}$

٢ (أ) أوجد ميل الخط المستقيم وطول الجزء المقطوع من محور الصادات للمستقيم الذي معادلته : $1 = \frac{s}{3} + \frac{v}{2}$

(ب) إذا كانت : $s = 30^\circ$ ما 60° حيث s قياس زاوية حادة فأوجد قيمة : 4 من s ما s

٣ (أ) أوجد معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة $(2, -5)$ ويوازي المستقيم المار بالنقطتين $(1, 2)$ ، $(7, 2)$

(ب) \vec{a} و \vec{b} مثلث قائم الزاوية في \vec{c} ، فإذا كان : $\vec{a} \times \vec{b} = 2$ ح


أوجد : (أ) 2 ما 2 - ما 2 ح (د ح)

٤ (أ) إذا كان المستقيمان ل : $3 - s - 4 =$ صفر ، ل : $4 + s - 8 =$ صفر متعامدين

فأوجد : قيمة 4

(ب) إذا كانت النقط : $4(2, 3)$ ، $5(3, -2)$ ، $6(1, -2)$ ، $7(2, -3)$

هي رؤوس معين. أوجد : مساحة المعين $\vec{a} \times \vec{b}$ ح



٥ (أ) أثبت أن : $60^\circ = 30^\circ$ ما 30° ما 40°

(ب) في الشكل المقابل :

النقطة ح $(3, 4)$ منتصف $\vec{a} \times \vec{b}$

أوجد : محيط المثلث $\vec{a} \times \vec{b}$



محافظة الشرقية

٥

اجب عن الاسئلة الاتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ في Δ أ ب ح إذا كان : و (د ب) = 90° فإن : ما أ + ما ح =
 (أ) ٢ ما ح (ب) ٢ ما أ (ج) ٢ ما ح (د) ٢ ما أ

٢ إذا كانت : ما ٢ سن = $\frac{1}{4}$ حيث ٢ سن قياس زاوية حادة فإن : سن =
 (أ) ١٥ (ب) ٦٠ (ج) ٧٠ (د) ٣٠

٣ في الشكل المقابل :

إذا كان : ٩ و ٨ وحدات طول

، ب و ٦ وحدات طول.

فإن : معادلة أ ب هي

(أ) سن + $\frac{4}{3}$ = ٨

(ب) سن - $\frac{4}{3}$ = ٨

(ب) سن - $\frac{4}{3}$ = ٨

(د) سن + $\frac{4}{3}$ = ٨

٤ المسافة العمودية بين النقطة (٣ ، ٤) ومحور السينات تساوى وحدة طول.

(أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٤

٥ في المربع سن ع ل إذا كان : ميل $\overrightarrow{س ع} = ١$ فإن : ميل $\overrightarrow{س ل} = \dots\dots\dots$

(أ) ١ (ب) ١- (ج) ± ١ (د) ٤٥°


٦ أ ب ح مثلث قائم الزاوية في ب حيث ٣ أ ح = ٥ ب ح فإن : ط أ =

(أ) $\frac{2}{5}$ (ب) $\frac{5}{3}$ (ج) $\frac{3}{4}$ (د) $\frac{4}{3}$

٢ (أ) إذا كانت النقطة ح (٤ ، ص) هي نقطة منتصف أ ب حيث أ (٣ ، سن) ، ب (٦ ، ٥) فأوجد قيمة : سن + ص

(ب) أثبت أن النقط : ٩ (٣ ، ٥) ، ب (٣ ، ٢-) ، ح (٢- ، ٤-) هي رؤوس مثلث ، ثم أثبت أنه منفرج الزاوية في ب

٣ (أ) في الشكل المقابل :



إذا كان أ ب ح مستطيلاً فيه : أ ب = ٥ سم ، ب ح = ١٢ سم

أوجد : ١ طول أ ح

٢ قيمة ٥ ط أ (د أ ح) - ١٣ ما (د أ ح)

(ب) إذا كانت : ٩ (٣ ، ١-) ، ب (٥ ، ٣) نقطتين أوجد معادلة محور تماثل أ ب

٤ (أ) بدون استخدام الآلة الحاسبة احسب قيمة المقدار: $\frac{٢٠٠ \text{ م} + ٦٠ \text{ م}}{٦٠ \text{ م}}$

(ب) إذا كانت معادلتا الخطين المستقيمين ل، ل_١ هما ل: ٦س + ٤ص = ٣ - صفر، ل_١: ٣ص = ٢س + ٦ على الترتيب أوجد قيمة ل التي تجعل:
١ المستقيمين متوازيين.
٢ المستقيمين متعامدين.

٥ (١) أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة (١، ٤) ويكون موازيًا للمستقيم الذي معادلته: ٣س + ٢ص = ٤ - صفر

(ب) إذا كان: أ- حء مربعاً حيث أ (٢، ٤)، ب- (٣-، صفر)، ح- (٧-، ٥) أوجد:
١ إحداثي النقطة
٢ مساحة المربع أ- حء



محافظة المنوفية

٦

اجب عن الاسئلة الآتية، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١ مربع مساحة سطحه ٢٥ سم^٢ فإن طول قطره يساوى سم

(أ) ٥ (ب) ١٠ (ج) $٢\sqrt{٥}$ (د) $٢\sqrt{١٠}$

٢ فى المثلث أ- ب- ح- إذا كان: (أ- ح) < (ب- ح) + (أ- ب) فإن: د- ح تكون

(أ) حادة. (ب) منفرجة. (ج) قائمة. (د) مستقيمة.

٣ الشكل المقابل يمثل نصف دائرة

طول نصف قطرها ٢ سم

فإن محيط الشكل يساوى سم



(أ) ٢π (ب) ٤π (ج) $٢ + \pi$ (د) $٤ + \pi$

٤ إذا كانت: $\frac{٣\sqrt{٢}}{٢} = \frac{س}{٢}$ حيث $\frac{س}{٢}$ قياس زاوية حادة فإن: ط (س - ١٥) =

(أ) $٣\sqrt{٢}$ (ب) $\frac{١}{٣\sqrt{٢}}$ (ج) ١ (د) $\frac{٣\sqrt{٢}}{٢}$

٥ المستقيم الذى معادلته: $\frac{س}{٢} - \frac{ص}{٣} = ٦$ يقطع من الجزء الموجب لمحور السينات جزءاً طوله وحدة طول.

(أ) ٣ (ب) ١٢ (ج) ٦ (د) ١٨

٦ إذا كان المستقيمان اللذان ميلهما $\frac{٢}{٣}$ ، $\frac{٦}{٩}$ متعامدين فإن: ل =

(أ) ٤ (ب) ٩- (ج) ٤- (د) ٩

٢ (أ) بين نوع المثلث الذى رؤوسه النقط أ (٣، ٠)، ب (١، ٤)، ح (١-، ٢) من حيث أطوال أضلاعه.

(ب) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن: $\frac{٢٠٠ \text{ م} + ٤٥ \text{ م}}{٢٠٠ \text{ م} + ٤٥ \text{ م} - ١} = ٢ + ٣\sqrt{٢}$

٣ (أ) أ ب ح د شكل رباعي فيه : أ (٤ ، ٢) ، ب (٠ ، ٣) ، ج (٥ ، ٧) ، د (٩ ، ٢) أثبت أن : أ ب ح د مربع.

(ب) مثلث أ ب ح قائم الزاوية في ح ، أ ح = ٦ سم ، ب ح = ٨ سم أوجد قيمة : $\sin A$ - $\cos A$

٤ (أ) أثبت أن المستقيم الذي يمر بالنقطتين (٣ ، -٢) ، (٤ ، ٥) يوازي المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 45°

(ب) إذا كان : $\frac{3}{4} \sin A = \frac{2}{5} \cos A$ أوجد : قيمة $\sin A$ (حيث A قياس زاوية حادة)

٥ (أ) أوجد معادلة المستقيم العمودي على المستقيم : $3x - 4y + 7 = 0$ صفر ويقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات جزءاً طوله ٤ وحدات.

(ب) أ ب ح د مستطيل فيه : أ ب = ٣ سم ، أ ح = ٥ سم

أوجد : ١) $\cos A$ ٢) مساحة سطح المستطيل أ ب ح د



محافظة الغربية

٧

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ عدد محاور تماثل المثلث المختلف الأضلاع يساوى

(أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

٢ فى المثلث $\triangle ABC$ إذا كان : $(\sin C)^2 = (\sin A)^2 + (\sin B)^2$ فإن $\angle C$ تكون

(أ) حادة. (ب) قائمة. (ج) منفرجة. (د) مستقيمة.


٣ إذا كان البعد بين النقطتين (٠ ، ٩) ، (١ ، ٠) هو وحدة طول واحدة فإن : $\sin A =$

(أ) ١ (ب) -١ (ج) ٠ (د) ٢

٤ إذا كانت نقطة الأصل هي منتصف \overline{AB} حيث أ (٢ ، ٣) فإن النقطة ب هي

(أ) (٢ ، ٣) (ب) (٣ ، ٢) (ج) (٢ ، -٣) (د) (٣ ، -٢)

٥ فى الشكل المقابل :



أ ب ح مثلث قائم الزاوية في ح فيه : $\overline{AC} \perp \overline{BC}$ يقطعه فى د

، أ ب = ٦ سم ، أ ح = ٨ سم

فإن : $\sin A =$

(أ) ٣ ، ٦ (ب) ٨ ، ٤ (ج) ٤ ، ٨ (د) ٦ ، ٤

٦ فى المثلث أ ب ح القائم الزاوية فى ب يكون ما أ + ٢ ما ح =

(أ) ٢ ما ح (ب) ٣ ما أ (ج) ٢ ما أ (د) ٣ ما أ

٢ (أ) س ص ع مثلث قائم الزاوية في ص فيه : س ص = ٥ سم ، ص ع = ١٢ سم
أوجد قيمة : ما س ما ع = ما س ما ع

(ب) أوجد قياس الزاوية الموجبة التي يصنعها \vec{AB} حيث $A(2, 3)$ ، $B(1, 6)$ مع الاتجاه السالب لمحور السينات.

٣ (أ) أوجد قيمة س إذا كانت : ما $(3 + س) = \frac{1}{4}$ حيث $(3 + س)$ قياس زاوية حادة.

(ب) أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يوازي الخط المستقيم : $\frac{ص - ١}{س} = \frac{١}{٣}$ ويقطع من الجزء السالب لمحور الصادات جزءاً طوله يساوي ٣ وحدات طول.

٤ (أ) أوجد قيمة س التي تحقق : س - ما 30° ما 40° = ما 60°

(ب) إذا كانت النقط : $A(0, 3)$ ، $B(4, 3)$ ، $C(1, 6)$ هي رؤوس مثلث متساوي الساقين رأسه A أوجد طول القطعة المستقيمة المرسومة من A عمودية على BC

٥ (أ) إذا كانت النقطة م $(-1, 2)$ هي مركز الدائرة المارة بالنقطة $A(2, 1)$ فأوجد محيط الدائرة (علمًا بأن $\pi = \frac{22}{7}$)

(ب) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة $(1, 2)$ عمودياً على الخط المستقيم المار بالنقطتين : $A(3, 2)$ ، $B(5, 4)$



محافظة الدقهلية

٨

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ (أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان : $C(1, 5)$ ، ما 70° ، ما 70° حيث B زاوية حادة فإن : $C(1, 5) = \dots$
(أ) 40° (ب) 70° (ج) 10° (د) 100°

٢ إذا كان : A ح مثلثاً متساوي الساقين وقائم الزاوية في C فإن : $\angle A = \dots$

(أ) $\frac{1}{3}$ (ب) $\frac{3}{4}$ (ج) 1 (د) $\frac{1}{2}$

٣ إذا كان : $A \perp B$ و $B \perp C$ فإن : $A \parallel C$ هو \dots


(أ) 1 (ب) -1 (ج) صفر (د) غير معرف

(ب) في الشكل المقابل :

ح منتصف AB ، حيث $C(3, 4)$

أوجد إحداثيات نقطتي A ، B

ثم مساحة المثلث ABC



- ٢ (١) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :
- ١ إذا كانت : $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ ، $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ فإن : $\sin 90^\circ = \dots$ (١) ٢٠ (ب) ٣٠ (ج) ٤٥ (د) ٦٠
- ٢ طول نصف قطر الدائرة التي مركزها (٠ ، ٠) وتمر بالنقطة (٤ ، ٣) يساوي وحدة طول. (١) ٧ (ب) ١ (ج) ١٢ (د) ٥
- ٣ قياس الزاوية الخارجة عن المثلث المتساوي الأضلاع يساوي (١) ٦٠ (ب) ٩٠ (ج) ١٢٠ (د) ٨٠
- (ب) بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة $\sin 2^\circ$ التي تحقق : $\sin 60^\circ - \sin 2^\circ = \sin 40^\circ$
- ٣ (١) أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يقطع من الجزأين الموجبين لمحوري الإحداثيات السيني والصادي جزأين طولهما ٢ ، ٣ وحدات طول على الترتيب.
- (ب) أ ب ح مثلث قائم الزاوية في ح فيه : أ ح = ٥ سم ، ب ح = ١٢ سم أوجد قيمة : $\sin \angle \text{أ} - \sin \angle \text{ب}$

- ٤ (١) أ ب ح د متوازي أضلاع فيه : أ (٢ ، ٣) ، ب (٤ ، ٥) ، ح (٠ ، ٣) أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطريه ثم أوجد إحداثي نقطة د (ب) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن : $\sin 2^\circ + \sin 4^\circ = \sin 60^\circ$
- ٥ (١) أثبت أن النقط : أ (١ ، ٥) ، ب (٣ ، ٧) ، ح (١ ، ٣) ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة. (ب) أوجد معادلة الخط المستقيم العمودي على $\overline{أب}$ من نقطة منتصفها حيث أ (٢ ، ١) ، ب (٤ ، ٥)



محافظة السويس

٩

أجب عن الأسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

- ١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :
- ١ إذا كانت : $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ ، $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ فإن : $\sin 90^\circ = \dots$ (١) ٢٠ (ب) ٣٠ (ج) ٤٥ (د) ٦٠
- ٢ في المثلث أ ب ح إذا كان : $\angle \text{أ} < \angle \text{ب} + \angle \text{ح}$ فإن زاوية ح تكون (١) حادة. (ب) منفرجة. (ج) قائمة. (د) منعكسة.
- ٣ إذا كانت : أ (٢ ، ٥) ، ب (٥ ، ٢) فإن نقطة منتصف $\overline{أب}$ هي (١) (٠ ، ٠) (ب) (٥ ، ٢) (ج) (٢ ، ٥) (د) (٥ ، ٢)
- ٤ إذا كان : $\overrightarrow{أب}$ متماثل $\overrightarrow{أح}$ فإن : $\sin \angle \text{أ} \dots \sin \angle \text{ب}$ (١) $<$ (ب) $>$ (ج) $=$ (د) \geq

٥] إذا كانت $A(7, 5)$ ، $B(1, -1)$ فإن نقطة منتصف \overline{AB} هي

(د) $(4, 2)$

(ج) $(2, 3)$

(ب) $(3, 3)$


(أ) $(3, 2)$

(د) $\frac{2}{3}$

(ج) $\frac{2}{3}$

(ب) $\frac{2}{3}$

(أ) $\frac{2}{3}$



٢] (أ) في الشكل المقابل :

$\angle B$ ح مثلث قائم الزاوية في ح ، $\angle A = 13^\circ$ سم

، $\angle C = 12^\circ$ سم ، $\angle A = 5^\circ$ سم

١] أثبت أن : ما $\angle A$ من $\angle B$ + ما $\angle A$ من $\angle C = 1^\circ$ أوجد قيمة : $1^\circ + 1^\circ$

(ب) أوجد قيمة المقدار التالي : ما 45° من $45^\circ + 30^\circ$ ما 60° - ما 30°

٣] (أ) أوجد \angle حيث \angle قياس زاوية حادة : ما $\angle = 60^\circ$ ما 30° - ما 60° ما 30°

(ب) أثبت أن المستقيم الذي يمر بالنقطتين $(-3, 2)$ ، $(4, 5)$ يوازي المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 45°

٤] (أ) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة $(1, 2)$ وعمودياً على الخط المستقيم المار بالنقطتين :

$A(2, -5)$ ، $B(3, -4)$

(ب) أثبت أن النقط : $A(1, 3)$ ، $B(-4, 6)$ ، $C(2, -2)$ تقع على دائرة مركزها $M(-1, 2)$

٥] (أ) $\angle A$ ح متوازي أضلاع فيه : $\angle A(2, 3)$ ، $\angle B(4, -5)$ ، $\angle C(0, -3)$

أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطريه ثم أوجد إحداثي نقطة


(ب) باستخدام الشكل المقابل :

أوجد :

١] طول الجزء المقطوع من محور الصادات ح

٢] طول الجزء المقطوع من محور السينات.

٣] ميل الخط المستقيم م



محافظة كفر الشيخ

١١

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١] في المثلث $\angle A$ ح : $\angle C(1, 3)$ ، $\angle B(4, -5)$ ، ما $\angle A$ من $\angle B$ + ما $\angle A$ من $\angle C$ =

(د) 10.5°

(ج) 9.0°

(ب) 7.5°

(أ) 3.0°

(7) المساحة المحددة بالمستقيمات : ح = ١ ، ص = ١ ، ع = ٥ ح + ٢ ص = ١٠
في وحدة مربعة.

في وحدة مربعة، ١ ص = ٥ ح + ٢ ص = ١٠

$$A(\omega) \quad V_r(t)$$

(٢) إذا كان المستقيم المار بالنقطتين $(1, \frac{1}{2})$ ، $(2, \frac{1}{2})$ ، $(3, \frac{1}{2})$ متوازيًا مع $y = 0$ فإن \dots

[illegible]

4] إذا كان المستقيم الذي معادلته: $x + (2 - t)y = 0$ يوازي المستقيم المار بالنقطتين $(1, 3)$ و $(4, 1)$ فإن $t =$

$$2 - (u) \qquad 2 (i)$$

٥ إذا كانت : (ل - ٣ ، ٢) تقع في الربع الأول فإن : ل يمكن أن تساوي (ج) ١ (د) صفر

$$r(\omega) \quad r - (1)$$

٦ الزاوية التي قياسها 65° تتمم زاوية قياسها

$^{\circ} 40$ (ج) $^{\circ} 110$ (د) $^{\circ} 20$ (ب) $^{\circ} 20$ (ا)

2 (أ) احمل مثلث قائم الزاوية في $\triangle ABC$ ، $\angle C = 90^\circ$ ، $AC = 3$ سم ، $BC = 4$ سم
اثبت أن : $AB^2 = AC^2 + BC^2$

(ب) إذا كانت النقطة $P(5, 2)$ تقع على الدائرة التي مركزها $M(1, -1)$

فأوجد: ١) مساحة سطح الدائرة بدلالة π ٢) معادلة المستقيم المار بالنقطتين A, B

٣ (١) إذا كانت : ٢ (-٣ ، ٥) ، ١ (-١ ، ٧) فأوجد معادلة محور تماثل ٢

(ب) بدون استخدام حاسبة الجيب أثبت أن : $\tan 60^\circ - \tan 45^\circ = \tan 60^\circ + \tan 30^\circ$

٤ (١) أثبت أن الشكل الرباعي $ABCD$ الذي رؤوسه :

۲- (۱، ۳) ، (۵، ۱) ، (۷، ۴) ، (۱، ۶) متوازی اضلاع.

(ب) ۱۰ حء شبه منحرف متساوی الساقین فیہ :


$\overline{51} // \overline{51}$ ، $51 = 4$ سم ، $1 = 5$ سم ، $12 = 1$ سم

أوجد قيمة المقدار: $\frac{\text{طاب مباح}}{\text{مباح} + \text{مباح}}$

٥ (١) إذا كان المستقيم l يمر بالنقطتين (٣، ١)، (٢، ٤) والمستقيم p يصنع مع الاتجاه الموجب

لمحور السينات زاوية قياسها 40°

فأوجد قيمة \angle إذا كان: $\angle 1 // \angle 2$ $\angle 1 \perp \angle 2$



(ب) في الشكل المقابل :

النقطة ح منتصف \overline{AB}

حيث ح (٤ ، ٣)

، و نقطة الأصل لنظام الإحداثيات.

١ أوجد إحداثيى النقطتين : أ ، ب

٢ أوجد معادلة : \overline{AB}



محافظة البحيرة

١٢

أجب عن الاسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت أ (٧ ، ٥) ، ب (١ ، ١) فإن : منتصف \overline{AB} هو
 (أ) (٣ ، ٢) (ب) (٣ ، ٣) (ج) (٢ ، ٣) (د) (٤ ، ٣)

٢ إذا كان : ح (دب) = ٨٠° فإن : ح (دب) المنعكسة =
 (أ) ١٠° (ب) ١٠٠° (ج) ٨٠° (د) ٢٨٠°

٣ ميل المستقيم الموازي للمستقيم المار بالنقطتين (٣ ، ٢) ، (٤ ، ٢) يساوى
 (أ) ١- (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $\frac{1}{2}$ (د) ١

٤ إذا كانت : ط (س + ١٠) = ٣٧ حيث س قياس زاوية حادة فإن : س =
 (أ) ٣٠° (ب) ٤٥° (ج) ٥٠° (د) ٦٠°

٥ القطران في متوازي الأضلاع


(أ) متعامدان. (ب) متساويان في الطول.

(ج) متعامدان ومتساويان في الطول. (د) ينصف كل منهما الآخر.

٦ المثلث الذى أطوال أضلاعه ٢ سم ، (س + ٢) سم ، ٥ سم يكون متساوى الساقين عندما س =

(أ) صفر (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٥

٢ (أ) في الشكل المقابل :



أ ب ح مثلث قائم الزاوية فى ح

، أ ح = ٦ سم ، ب ح = ٨ سم

أوجد : ١ ما أ ما ب - ما أ ما ب

٢ ح (دب)

(ب) بين نوع المثلث الذى رؤوسه : أ (٤ ، ٢-) ، ب (١- ، ٣) ، ح (٤ ، ٥) بالنسبة لأطوال أضلاعه.

٣ (١) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

(ب) أوجد معادلة مستقيم ميله ٢ ويقطع جزءاً من الجزء السالب لمحور الصادات يساوي ٣ وحدات ، وارسم الخط المستقيم.

٤ (i) أوجد قيمة s التي تحقق: $s \text{ ما } ٢٠ \text{ من } ٤٥ \text{ ما} = ٦٠ \text{ ما}$

(ب) إذا كان المستقيم l_1 يمر بالنقطتين $(1, 3)$ ، $(2, 4)$ ، والمستقيم l_2 يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 45° فأوجد قيمة k إذا كان $l_1 \parallel l_2$

٥ (١) إذا كانت النقطة (٢ ، ١) منتصف البعد بين النقطتين (١ ، ص) ، (س ، ٣) أوجد النقطة (س ، ص)

(ب) أوجد معادلة مستقيم يمر بالنقطة $(3, -5)$ عمودياً على المستقيم: $x + 2y - 7 = 0$ = صفر



محافظة الفيوم

أجب عن الاسئلة الاتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) إذا كانت : $\theta = 3^\circ$ حيث θ زاوية حادة فإن : θ (دس) =

٢. (ج) ٢. (د) ١٥ (ب) ١. (ا)

۲ مربع محیطه ۱۶ سم ، فإن مساحته تكون سم^۲

٩. (ج) ٦. (ح) ١٦ (ب) ٤ (ا)

٣) البعد العمودي بين المستقيمين : $s - 2 = \text{صفر}$ ، $s + 3 = \text{صفر}$ يساوي وحدة طول.

(i) ۱ (ب) ۲ (ج) ۳ (د) ۴ (ه)

٤ في الشكل المقابل :

المثلث ABC يكون

(۱) متساوی الساقین.

(ج) منفرج الزاوية.


٥ مساحة المثلث المحدد بالمستقيمات : ٣س - ٤س = ١٢ ، ٣س = ٠ ، ٤س = ٠ .

تساوی وحدة مربعة.

١٢ (ج) ٥ (ح) ٧ (د) ٦ (هـ)

٦] قياس زاوية السداسى المنتظم يساوى

٦. (ج) ١٢. (ب) ٩. (ج) ١٠. (ب)



(ب) متساوی الاضلاع.

(د) قائم الزاوية.

٥ مساحة المثلث المحدد بالمستقيمات : ٣س - ٤س = ١٢ ، ٣س = ٠ ، ٤س = ٠ .

تساوی وحدة مربعة.

١٢ (ج) ٥ (ح) ٧ (د) ٦ (هـ)

٦] قياس زاوية السداسى المنتظم يساوى

٦. (ج) ١٢. (ب) ٩. (ج) ١٠. (ب)



٢ (١) في الشكل المقابل :

أ ب ح د هـ مستطيل فيه :

أ ب = ١٥ سم ، أ د = ٢٥ سم

أوجد : (١) ح د (٢) أ ب

(٢) مساحة سطح المستطيل أ ب ح د

(ب) إذا كان البعد بين النقطتين (٧ ، ٤) ، (٢ ، ٢) يساوي ٥ وحدات طول فأوجد : قيم أ الحقيقية.

٣ (١) بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة س بحيث س قياس زاوية حادة إذا كان :

$$٢٠^\circ \text{ ما } + ٦٠^\circ \text{ ما } + ٢٠^\circ \text{ ما } = ٩٠^\circ$$

(ب) أثبت أن المستقيم المار بالنقطتين (٢ ، ١) ، (٤ ، ٢) يوازي المستقيم ٣ ص - س - ١ = ٠

٤ (١) أ ب ح د شكل رباعي حيث : أ (٣ ، ٥) ، ب (٢ ، ٦) ، ج (١ ، ١) ، د (٤ ، ٠) أثبت أن : الشكل أ ب ح د معين.

(ب) إذا كانت : أ (٥ ، ٦) ، ب (٢ ، ٧) ، ج (١ ، ٣) أوجد معادلة الخط المستقيم المار بنقطة أ ويمتصف ب ج

٥ (١) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن : $٢ = \frac{٦٠^\circ \text{ ما } + ٢٠^\circ \text{ ما } + ٤٥^\circ \text{ ما }}{٦٠^\circ \text{ ما } - ٢٠^\circ \text{ ما }}$

(ب) إذا كان المستقيم ل يمر بالنقطتين (١ ، ٣) ، (٢ ، ٢) والمستقيم م يصنع زاوية قياسها ٤٥° مع الاتجاه الموجب لمحور السينات أوجد : قيمة ص التي تجعل ل م ⊥



محافظة بنى سويف

١٤

أجب عن الأسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

٢ حاصل ضرب ميلى المستقيمين المتعامدين يساوى

(١) صفر (ب) ١ (ج) ١- (د) $\frac{1}{2}$

٣ أ ب قطر فى دائرة مركزها م ، حيث أ (٤ ، ٢) ، ب (٢ ، ٠) فإن م =

(١) (٢ ، ٠) (ب) (٠ ، ٢) (ج) (٠ ، ٠) (د) (٢ ، ٢)


٤ الشكل الرباعى الذى قطراه متساويان فى الطول ومتعامدان هو

(١) متوازى أضلاع (ب) معين (ج) مستطيل (د) مربع

٥ إذا كان طولاً ضلعين فى مثلث ٢ سم ، ٥ سم فإن طول الضلع الثالث \geq

(١) ٢ ، ٥ (ب) ٢ ، ٧ (ج) ٢ ، ٧ (د) ٢ ، ٥

٥ في الشكل المقابل :



إذا كان : $\angle (د ب أ) = 90^\circ$ ، $\overline{أ ب} \perp \overline{ب ح}$

فإن : $\angle (أ ب ح) = \dots\dots\dots$

(أ) $1 \times 2 = 2$ (ب) $2 \times 5 = 10$ (ج) $1 \times 5 = 5$ (د) $(1 \times 2) + (2 \times 5) = 12$

٦ إذا كانت : $\angle (س + 10) = 1$ حيث \angle زاوية حادة فإن : $\angle (د س) = \dots\dots\dots$

(أ) 60° (ب) 45° (ج) 30° (د) 15°

٢ (أ) أوجد مساحة المستطيل $أ ب ح د$ حيث : $أ (2, 1)$ ، $ب (1, 5)$ ، $ح (4, 6)$ ، $د (6, 0)$

(ب) أوجد قيمة \angle إذا كان : \angle من $60^\circ = \angle$ ما $30^\circ + \angle$ ما 45°

٣ (أ) أثبت أن المستقيم الذي يمر بالنقطتين $(0, 1)$ ، $(4, 3)$ يوازي المستقيم الذي يصنع زاوية موجبة قياسها 45° مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.

(ب) في الشكل المقابل :



$أ ب ح$ مثلث قائم الزاوية في $أ$

$أ ب = 20$ سم ، $أ ح = 15$ سم

أثبت أن : \angle ما $أ ب ح$ - \angle ما $أ ح ب$ = صفر

٤ (أ) إذا كانت : $\angle (س ، 3)$ منتصف $أ ب$ حيث $أ (-2, 3)$ ، $ب (9, 11)$

أوجد قيمة : \angle س + ص

(ب) بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة المقدار : \angle ما $45^\circ + \angle$ ما $30^\circ - \angle$ ما $60^\circ - \angle$ ما 30°

٥ (أ) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة $(2, -5)$ عمودياً على المستقيم الذي معادلته :

ص - 2 س + 7 = صفر

(ب) أثبت أن النقاط : $أ (2, 3)$ ، $ب (6, 2)$ ، $ح (0, 1)$ ، $د (-2, 1)$

تكون رؤوس شبه منحرف.



محافظة أسيوط

١٥

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث يساوى

(أ) 90° (ب) 180° (ج) 360° (د) 540°



٢ في الشكل المقابل :

أ ب = سم

٥ (أ)

٢٠ (ج)

١٥ (ب)

٤٠ (د)

٣ قياس الزاوية الداخلة للشكل السداسي المنتظم يساوي

١٠٨ (أ)

١٢٠ (ب)

٩٠ (ج)

١٨٠ (د)

٤ إذا كانت : ٢ ما س = ١ حيث س زاوية حادة فإن : د س = =

٤٥ (أ)

٩٠ (ب)

٣٠ (ج)

٦٠ (د)

٥ معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة (٢، ٣) ويوازي محور السينات هي

٢ = س (أ)

٣ = ص (ب)

٢ = س (ج)

٣ = ص (د)

٦ إذا كانت نقطة الأصل هي منتصف أ ب حيث أ (٢، ٥) فإن نقطة ب هي

(٢، ٥) (أ)

(٢، ٥-) (ب)

(٢، ٥-) (ج)

(٠، ٠) (د)


٢ (أ) أثبت أن النقط : ١ (٢، -١) ، ٢ (٥، ٦) ، ٣ (٢، ٣) تقع على استقامة واحدة.

(ب) أوجد قيمة س التي تحقق : س ما ٢٠ ما ٢٤٥ ما ٢٦٠

٣ (أ) إذا كان المثلث الذي رؤوسه النقط ص (٤، ٢) ، س (٣، ٥) ، ع (٥، -١) قائم الزاوية

في ص فأوجد : قيمة ؟

(ب) أوجد معادلة الخط المستقيم الذي ميله يساوي ٢ ويقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات جزءاً قدره ٧ وحدات.



٤ (أ) في الشكل المقابل :

أ ب ح د مستطيل فيه :

أ ب = ١٥ سم ، أ ح = ٢٥ سم

أوجد : ١ د أ ح ب

٢ مساحة سطح المستطيل أ ب ح د

(ب) أثبت أن المستقيم المار بالنقطتين (٢، ٢) ، (٠، ٠) يوازي المستقيم المار بالنقطتين

(١، ٤) ، (١، ٧)

٥ (أ) أ ب ح د شكل رباعي حيث أ (٥، ٣) ، ب (٦، -٢) ، ح (١، -١) ، د (٠، ٤)

أثبت أن : الشكل أ ب ح د معين.

(ب) أوجد ميل الخط المستقيم وطول الجزء المقطوع من محور الصادات للمستقيم الذي معادلته :

٢ س - ٣ ص - ٦ = صفر




اجب عن الاسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : $\frac{1}{2} = \frac{3}{x}$ حيث x زاوية حادة فإن : $x =$ (د) ٩٠ (ج) ١٠ (ب) ٦٠ (أ) ٣٠

٢ محيط المربع الذي مساحته ١٠٠ سم^٢ يساوى سم (أ) ١٠ (ب) ٢٠ (ج) ٤٠ (د) ٥٠

٣ إذا كان المستقيمان اللذان ميلاهما $\frac{2}{3}$ ، $\frac{6}{4}$ متعامدين فإن : $x =$ (أ) ٤ (ب) ٩- (ج) ٤- (د) ٩



٤ في الشكل المقابل :

طول $\overline{AC} =$ سم

(أ) ٢ (ب) ٦ (ج) ٤ (د) ٨

٥ معادلة الخط المستقيم المار بنقطة الأصل وميله ١ هي

(أ) $x = y$ (ب) $x = -y$ (ج) $x = 2y$ (د) $x = y = 0$

٦ إذا كانت الأطوال ٣ ، ٧ ، x هي أطوال أضلاع مثلث فإن : x يمكن أن تساوى

(أ) ٣ (ب) ٧ (ج) ٤ (د) ١٠


٢ (أ) إذا كانت : $\angle 1 = 30^\circ$ ، $\angle 2 = 30^\circ$ هي منتصف \overline{BC} حيث $\angle 3 = 120^\circ$ أوجد إحداثي نقطة B

(ب) إذا كانت : $\angle 1 = 30^\circ$ ، $\angle 2 = 60^\circ$ فأوجد قياس زاوية $\angle 3$ (حيث $\angle 3$ زاوية حادة) ثم أوجد طاس

٣ (أ) إذا كان المستقيم الذي معادلته : $x + 2y = 7$ يوازي المستقيم الذي يصنع زاوية قياسها

45° مع الاتجاه الموجب لمحور السينات أوجد : قيمة x

(ب) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن : $\angle 1 = 60^\circ$ ، $\angle 2 = 45^\circ$ ، $\angle 3 = 30^\circ$



٤ (أ) في الشكل المقابل :

$\angle 1$ حاد مستطيل فيه :

$\angle 2 = 6$ سم ، $\angle 3 = 10$ سم

أوجد : (أ) $\angle 1$ و (د) $\angle 2$ (ب) مساحة سطح المستطيل $\angle 1$ حاد

(ب) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة (١ ، ٢) عمودياً على المستقيم : $x + 2y = 7$.

- ٥ (١) أثبت أن النقط : $أ(٣، ١)$ ، $ب(٤، ٦)$ ، $ح(٢، ٢)$ الواقعة في مستوى إحداثي متعامد تمر بها دائرة واحدة مركزها $م(١، ٢)$ ثم أوجد مساحة الدائرة.
(ب) أوجد الميل وطول الجزء المقطوع من محور الصادات للمستقيم الذي معادلته : $٤س + ٥ص - ١٠ = ٠$.



محافظة قنا


١٧

أجب عن الاسئلة الآتية :

- ١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :
١ ما $٣٠^\circ = \dots\dots\dots$
(١) $\frac{٣\sqrt{٢}}{٢}$ (ب) $\frac{٣\sqrt{٢}}{٢}$ (ج) ٦٠ (د) $\frac{١}{\sqrt{٢}}$
٢ عدد أقطار الشكل السداسي يساوى
(١) ٥ (ب) ٦ (ج) ٢ (د) ٩
٣ إذا كانت نقطة الأصل منتصف \overline{AB} حيث $أ(٢، ٥)$ فإن $ب = \dots\dots\dots$
(١) $(٥، ٢)$ (ب) $(٢، ٥)$ (ج) $(٢، -٥)$ (د) $(-٥، ٢)$
٤ إذا كان قياسا زاويتين في مثلث ٧٠° ، ٤٠° فإن عدد محاور تماثله هو
(١) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) صفر
٥ إذا كان : $ل$ ، $ل$ مستقيمين متوازيين ميلهما $١م$ ، $٢م$ على الترتيب فإن :
(١) $١م - ٢م =$ صفر (ب) $١م - ٢م =$ (ج) $١م \times ٢م = ١$ (د) $١م \times ٢م = -١$
٦ إذا كان طولاً ضلعين في مثلث ٢ سم ، ٥ سم فإن طول الضلع الثالث يمكن أن يكون
(١) ٢ سم (ب) ٣ سم (ج) ٤ سم (د) ١ سم

- ٢ (١) بدون استخدام الحاسبة أوجد قيمة : $٦٠^\circ ما - ٣٠^\circ ما - ٦٠^\circ ما$
(ب) أوجد معادلة المستقيم الذى يصنع زاوية موجبة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات قياسها ١٣٥° ويقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات جزءاً طوله ٥ وحدات.

- ٣ (١) أثبت أن المثلث الذى رؤوسه النقط : $أ(١، ٤)$ ، $ب(١، ٢)$ ، $ح(٢، ٢)$ قائم الزاوية فى $ب$ وأوجد مساحته.



(ب) فى الشكل المقابل :

ΔABC قائم الزاوية فى $ح$

$أ = ٦$ سم ، $ب = ٤$ سم ، $٦٠^\circ = \angle ب$

أوجد : طول $أح$

- ٤ (١) أوجد ميل المستقيم الذى معادلته : $2x - 6y = 12$ ثم أوجد نقطتى تقاطعه مع محورى الإحداثيات.
(ب) بدون استخدام الحاسبة أوجد قيمة \sin (حيث \sin قياس زاوية حادة) التى تحقق :
طا $= 4$ ما 60° ما 30°

- ٥ (١) أثبت أن المستقيم المار بالنقطتين (١، ٣) ، (٢، ٤) يوازى المستقيم الذى معادلته : $5x - 5 = 0$
(ب) أثبت أن الشكل $ABCD$ مستطيل حيث $A(1, 0)$ ، $B(-1, 4)$ ، $C(7, 8)$ ، $D(9, 4)$



محافظة الأقصر

١٨

أجب عن الاسئلة الآتية ،

- ١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :
١ طول الضلع المقابل للزاوية التى قياسها 30° فى المثلث القائم الزاوية يساوى طول الوتر.
(أ) ربع (ب) ضعف (ج) نصف (د) ثلث
٢ إذا كانت : طا $(2x - 5) = 1$ حيث \sin قياس زاوية حادة فإن : $\sin =$
(أ) 10° (ب) 75° (ج) 50° (د) 25°
٣ مربع طول قطره يساوى ١٠ سم فإن مساحته تساوى سم^٢
(أ) ١٠٠ (ب) ٧٥ (ج) ٥٠ (د) ٢٥
٤ المستقيم المار بالنقطتين (٠، ٠) ، (٢، ٣) يوازى المستقيم الذى ميله
(أ) $\frac{3}{2}$ (ب) $\frac{2}{3}$ (ج) $\frac{3}{2}$ (د) $\frac{2}{3}$
٥ صورة النقطة (٣، ٢) بالانعكاس فى محور السينات هى
(أ) (٣، ٢-) (ب) (٢، ٣) (ج) (٢، ٢-) (د) (٢-، ٣-)
٦ ميل المستقيم : $5x - 5 = 0$ هو
(أ) ٥ (ب) $\frac{1}{5}$ (ج) صفر (د) غير معرف.

- ٢ (١) أوجد قيمة \sin بالدرجات إذا كانت : طا $= 2$ ما 30° ما 30° حيث $90^\circ > \sin > 0^\circ$

- (ب) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة (٣، ٥) ويوازى المستقيم : $2x - 3y + 6 = 0$

- ٣ (١) أثبت أن المستقيم المار بالنقطتين (٧، ٣-) ، (٥، ١-) عمودى على المستقيم الذى يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها 45°


- (ب) بدون الحاسبة أثبت أن : $2 \sin 30^\circ + 4 \sin 60^\circ = 2 \sin 60^\circ$

٤ (أ) إذا كان البعد بين النقطتين $(0, 0)$ ، $(1, 0)$ يساوي $\sqrt{2}$ وحدة طول أوجد : قيم

(ب) إذا كان $\sqrt{2}$ قطرًا في الدائرة م حيث $(1, 0)$ ، $(0, 1)$ ، $(-1, 0)$ ، $(0, -1)$ أوجد إحداثي م (مركز الدائرة) وطول نصف قطر الدائرة.

٥ (أ) أثبت أن النقط : $(1, -1)$ ، $(0, 1)$ ، $(2, 2)$ على استقامة واحدة.

(ب) في الشكل المقابل :



$$\cos(د) = \cos(أ) = \cos(ب) = 90^\circ$$

$$\sin(أ) = \frac{٤}{١٣} ، \sin(ب) = \frac{٥}{١٣} ، \sin(د) = \frac{١٣}{١٣} = ١$$

أوجد قيمة : $\sin(أ) \cos(ب) - \sin(ب) \cos(أ)$



محافظة الوادي الجديد

١٩

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :


١ مساحة المربع الذي محيطه ١٦ سم تساوي سم^٢

(أ) ٤ (ب) ٨ (ج) ١٦ (د) ٢٥٦

٢ إذا كان طولاً ضلعين في مثلث متساوي الساقين ٣ سم ، ٧ سم فإن : طول الضلع الثالث =

(أ) ٤ سم (ب) ٧ سم (ج) ١٠ سم (د) ٣ سم

٣ في الشكل المقابل :



$$\sin(ب) = \frac{٣}{٤} ، \cos(ب) = \frac{٤}{٤} = ١$$

$$\sin(أ) = \frac{٤}{٤} = ١ ، \cos(أ) = \frac{٣}{٤}$$

$$\sin(أ) = \cos(ب) = ١$$

$$\sin(ب) = \cos(أ) = \frac{٣}{٤}$$

$$\sin(أ) \cos(ب) - \sin(ب) \cos(أ) = ١ \cdot \frac{٣}{٤} - \frac{٣}{٤} \cdot ١ = ٠$$

(أ) $\frac{٣}{٤}$ (ب) $\frac{٣}{٤}$ (ج) $\frac{٣}{٤}$ (د) $\frac{١}{٤}$

٥ إذا كان المستقيمان : $س + ح = ٥$ ، $ل + ح = ٢$ متعامدين فإن : $ل =$

(أ) ١ (ب) -١ (ج) ٢ (د) -٢

٦ إذا كانت : $(٧, ٥)$ ، $(١, -١)$ فإن نقطة منتصف \overline{AB} هي

(أ) $(٣, ٢)$ (ب) $(٣, ٣)$ (ج) $(٢, ٣)$ (د) $(٤, ٣)$

٢ (أ) $\sin(أ) \cos(ب) - \sin(ب) \cos(أ) = 90^\circ$ ، $\sin(أ) = \frac{١٥}{٢٠}$ ، $\sin(ب) = \frac{٢٠}{٢٠} = ١$

أثبت أن : $\sin(أ) \cos(ب) - \sin(ب) \cos(أ) = ٠$

(ب) إذا كانت النقطة ح (١ ، ٣) هي منتصف البعد بين النقطتين أ (١ ، ١) ، ب (٣ ، ٣) فأوجد : النقطة (س ، ص)

٣ (أ) إذا كانت النقط (١ ، ٠) ، (٣ ، ١) ، (٥ ، ٢) تقع على استقامة واحدة فأوجد : قيمة أ

(ب) أثبت أن النقط : أ (١- ، ٣) ، ب (-٤ ، ٦) ، ح (٢- ، ٢) الواقعة في مستوى إحداثي متعامد تمر بها دائرة واحدة مركزها م (١- ، ٢) ثم أوجد بدلالة π محيط الدائرة.

٤ (أ) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة (٥ ، ٣) ويوازي المستقيم : س + ٣ ص = ٧

(ب) أوجد قيمة س (حيث س قياس زاوية حادة) : ٢ ما س = ٣٠ ما + ٦٠ ما + ٦٠ ما

٥ (أ) أوجد معادلة الخط المستقيم الذي ميله = ٢ ويقطع من الجزء السالب لمحور الصادات جزءًا طوله ٣ وحدات.

(ب) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن : ٢ ما = ٦٠ ما + ٣٠ ما



محافظة شمال سيناء

٢٠

أجب عن الأسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان : ح (١ د) = ح (د ب) ، د ب متامتين فإن : ح (١ د) =

(أ) ٣٠ (ب) ٤٥ (ج) ٦٠ (د) ٩٠

٢ إذا كانت : ط ٣ س = ٣١ حيث س زاوية حادة فإن : ح (د س) =


(أ) ١٠ (ب) ٢٠ (ج) ٣٠ (د) ٦٠

٣ مجموع قياسات الزوايا الداخلة للشكل الرباعي يساوي

(أ) ٣٦٠ (ب) ١٨٠ (ج) ٩٠ (د) ٥٤٠

٤ إذا كانت : أ (١- ، ٦) ، ب (٢ ، ٩) فإن نقطة منتصف أ ب هي

(أ) (٢- ، ٥) (ب) (٥- ، ٢) (ج) (٢- ، ٥) (د) (٢ ، ٥-)




(ب) ع = س + ٢ ص

(د) ع = ١/٣ ص

٥ في الشكل المقابل :

(أ) س + ص = ع

(ج) ٢ س = ع



٦ في الشكل المقابل :

ل مستقيم يمر بالنقطتين $(0, 5)$ ، $(5, 0)$


فإن النقطة \exists ل

- (أ) $(6, 1)$ (ب) $(3, 2)$ (ج) $(0, 0)$ (د) $(-4, 3)$

٢ (أ) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن : ما $2 = 60^\circ$ ما 30° ما 30°

(ب) أ ب ح د شكل رباعي حيث أ $(4, 2)$ ، ب $(0, 3)$ ، ج $(5, 7)$ ، د $(9, 2)$ أثبت أن : الشكل أ ب ح د مربع.

٣ (أ) أوجد معادلة الخط المستقيم الذي ميله يساوي ٣ ويمر بالنقطة $(0, 5)$



(ب) في الشكل المقابل :

س ص ع مثلث قائم الزاوية في ع

، س ع = ٧ سم ، س ص = ٢٥ سم

١ أوجد قيمة : ط س \times ط ا ص ٢ أثبت أن : ما $2 = 60^\circ$ ما 30° ما 30°

٤ (أ) بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة س التي تحقق :

٢ ما س = ط ا $2 - 60^\circ$ حيث س قياس زاوية حادة.

(ب) أثبت أن النقط : أ $(-1, 4)$ ، ب $(0, 1)$ ، ج $(2, 2)$ تقع على استقامة واحدة.

٥ (أ) أثبت أن المستقيم الذي يمر بالنقطتين $(2, -3)$ ، $(4, 5)$ يوازي المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه

الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 45°

(ب) إذا كان المستقيم المار بالنقطتين $(2, -3)$ ، $(1, 1)$ عمودياً على مستقيم ميله ٣ -

فأوجد : قيمة ل

بعض امتحانات الرياضيات

الواردة بالامتحانات الممعة ٢٠٢١



امتحانات الرياضيات الواردة بالامتحانات المجمع ٢٠٢١



محافظة القاهرة

١

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١) إذا كان : $(س، ٢) = (٥، ص)$ فإن : $س + ص =$
 (١) ٢ (ب) ٥ (ج) ٧ (د) ١٠
- ٢) إذا كان : $٥، ٧، س، ١٤$ في تناسب فإن : $س =$
 (١) ٥ (ب) ١٠ (ج) ١٢ (د) ١٤
- ٣) الدالة $د : د (س) = ٤س + ٢س - ١$ دالة كثيرة حدود من الدرجة
 (١) الأولى. (ب) الثانية. (ج) الثالثة. (د) الرابعة.
- ٤) المدى لمجموعة القيم : $٨، ١، ٧، ٩، ٦$ يساوى
 (١) ٣ (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ٨
- ٥) إذا كانت : $٦٥^\circ =$ مناس حيث $س$ زاوية حادة فإن : $د (س) =$
 (١) ٢٥ (ب) ٣٠ (ج) ٤٥ (د) ٦٠
- ٦) منتصف \overline{AB} حيث : $A(٧، ٢)$ ، $B(١، ٤)$ هي النقطة
 (١) $(٦، ٢)$ (ب) $(٤، ٣)$ (ج) $(٨، ٦)$ (د) $(٣، ١)$
- ٧) $٢٠^\circ -$ ظل $٤٥^\circ =$
 (١) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣
- ٨) المعادلة : $ص = ٢س + ٥$ تمثل خط مستقيم يقطع من محور الصادات جزءًا طوله وحدة طول.
 (١) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٥



محافظة الجيزة

٢

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١) إذا كان : $(س - ٢، ٣) = (٥، ص + ١)$ فإن : $س + ص =$
 (١) ٣ (ب) $٣ -$ (ج) $٣ \pm$ (د) ٩
- ٢) الثاني المتناسب للأعداد $٢، ٨، ١٢$ هو
 (١) ٤ (ب) ٦ (ج) ٢ (د) ٣

- ٣] إذا كانت النقطة (٢ ، ص) تقع على محور السينات فإن : ص + ٤ =
 (١) ٥ (ب) ٤ (ج) ٢ (د) ٣
- ٤] إذا كانت : ص = ٣ - ٦ فإن : ص =
 (١) ٣ (ب) ٣ - ٦ (ج) ٢ - ٦ (د) ٢ - ٦
- ٥] $\frac{1}{2} = \frac{3}{x}$
 (١) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤
- ٦] إذا كانت : ما = $\frac{1}{2}$ فإن : د = حيث : قياس زاوية حادة.
 (١) ٤٥° (ب) ٦٠° (ج) ٣٠° (د) ٩٠°
- ٧] البعد بين النقطتين (٠ ، ٤) ، (٠ ، ٤) يساوى وحدة طول.
 (١) ٤ (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ٧
- ٨] إذا كان المستقيمان : ص + ص = ٥ ، ل + ص + ٢ = صفر متعامدين ، فإن : ل =
 (١) ٢ - (ب) ١ - (ج) ١ (د) ٢



محافظة الإسكندرية

٣

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١] إذا كانت : ل = (٢ - ص) ، ل = (٢ - ص) = ٩ فإن : ل = (٢ - ص) × ص =
 (١) ١٨ (ب) ١١ (ج) ٧ (د) ٦
- ٢] إذا كانت : ص = $\frac{1}{2}$ وكانت ص = ٢ عندما ص = ٢ فإن : قيمة ص = عندما ص = ١,٥
 (١) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٦
- ٣] إذا كانت : د = (٤ - ص) ، وكان : د = (٢) = ١٥ فإن : ل =
 (١) ١ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥
- ٤] إذا كان : مح (ل - ل) = ٢ = ٣٦ لمجموعة من القيم عددها يساوى ٩ فإن : ل =
 (١) ١ (ب) ٢ (ج) ٩ (د) ٣٦
- ٥] في المثلث $\triangle ABC$ إذا كان : ل = (د) = ٩٠° فإن : ما + ما =
 (١) ٢ ما (ب) ٢ ما (ج) ٢ ما (د) ٢ ما

٦) البعد العمودي بين المستقيمين : $s + 2 =$ صفر ، $s + 3 =$ صفر يساوى وحدة طول.

- (١) ٥ (ب) ٣ (ج) ٢ (د) ١

٧) إذا كان المستقيمان اللذان ميلاهما : $\frac{2}{3}$ ، $\frac{6}{7}$ متعامدان فإن : لك =

- (١) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤- (د) $\frac{3-}{7}$

٨) $٣٠^\circ \text{ م} + ٣٠^\circ \text{ م} - ٣٠^\circ \text{ ط} = ٤٥^\circ$

- (١) ٠ (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣



محافظة القليوبية

٤

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) إذا كان : $(٢, ٣) \in \{٢, ٥\} \times \{٦, s\}$ فإن : $s =$

- (١) ٦ (ب) ٥ (ج) ٣ (د) ٢

٢) الرابع المتناسب للكميات ٢ ، ٣ ، ٦ هو

- (١) ٩ (ب) ٣ (ج) ١٢ (د) ١٨

٣) إذا كانت s تتغير عكسياً مع s وكانت $s = \sqrt{3}$ عندما $s = \frac{2}{3}$ فإن ثابت التناسب =

- (١) $\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{2}{3}$ (ج) ٢ (د) ٦

٤) إذا كان : مح $(s - \overline{s}) = ٤٨$ لمجموعة من القيم عددها ١٢ فإن : $\sigma =$

- (١) ٢- (ب) ٢ (ج) ٤ (د) ٦

٥) $٢٠^\circ \text{ م} + ٣٠^\circ \text{ ط} = ٦٠^\circ$

- (١) $\sqrt{3}$ (ب) ٣ (ج) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (د) $\frac{1}{3}$

٦) البعد بين النقطتين $(٠, ٣)$ ، $(٠, -٤)$ = وحدة طول.

- (١) ٤ (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ٧

٧) إذا كان : $٤(٥, ٧)$ ، $s(١, -١)$ فإن نقطة منتصف \overline{AB} هي

- (١) $(٣, ٢)$ (ب) $(٣, ٣)$ (ج) $(٢, ٣)$ (د) $(٤, ٣)$

٨) معادلة الخط المستقيم المار بالنقطة $(٢, -٥)$ ويوازي محور السينات هي

- (١) $s = ٢-$ (ب) $s = ٥$ (ج) $s = ٢-$ (د) $s = ٥$



محافظة الشرقية

٥

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١] إذا كان : س = { ٥ ، ٤ ، ٢ } ، ص = { ٦ ، ٢ } فإن : $(س \times ص) =$
 (١) ٢ (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ٩
- ٢] إذا كان : ١ ، ٢ ، ٣ ، ٦ كميات متناسبة فإن : $\frac{1}{س} =$
 (١) ٦ (ب) $\frac{1}{٦}$ (ج) $\frac{1}{٣}$ (د) ٤
- ٣] إذا كان : س = ص = ١٢ فإن : ص \times
 (١) ١٢ س (ب) س - ١٢ (ج) س (د) $\frac{1}{س}$
- ٤] إذا كان مدى القيم : ٢ ، ٧ ، ٩ ، س هو ١١ حيث س < ٠ فإن : س =
 (١) ١٣ (ب) ٧ (ج) ٩ (د) ٣
- ٥] إذا كان : ط = (س + ١٥) = ١ حيث س قياس زاوية حادة فإن : س =
 (١) ٢٠ (ب) ٣٠ (ج) ٤٠ (د) ٥٠
- ٦] المستقيم الذي معادلته : ص = ٢س + ٤ يقطع من محور الصادات جزءاً طوله وحدة طول.
 (١) ١٠ (ب) ٨ (ج) ٦ (د) ٤
- ٧] إذا كان : ٤ (١ ، ٦) ، س (٢ ، ٣) فإن إحداثي نقطة منتصف \overline{AB} هي
 (١) (٢ ، ٤) (ب) (٤ ، ٣) (ج) (٨ ، ٤) (د) (٣ ، ٢)
- ٨] معادلة المستقيم الذي ميله ٢ ويمر بنقطة الأصل هي
 (١) س = ٢ (ب) ص = - س (ج) ص = ٢س (د) ص = ٣



محافظة المنوفية

٦

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١] المستقيم : ٢ ص = ٣س + ١٠ يقطع من الاتجاه الموجب لمحور الصادات جزءاً طوله وحدة طول.
 (١) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥
- ٢] منتصف \overline{AB} حيث ٤ (١ ، ٦) ، س (٢ ، ٣) هو
 (١) (٢ ، ٤) (ب) (١ ، ٢) (ج) (٤ ، ٤) (د) (٨ ، ٤)
- ٣] لأي زاويتين حادتين س ، ص إذا كان : ما س = ما ص فإن : $ق(دس) + ق(دص) =$
 (١) ٣٠ (ب) ٦٠ (ج) ٩٠ (د) ١٨٠

٤ إذا كانت : $5 + 2$ من $6 =$ فإن : u (د ص) = حيث u قياس زاوية حادة.

- (أ) ٣٠ (ب) ٤٥ (ج) ٦٠ (د) ١٢٠

٥ إذا كان : u (س) = 2 ، u (ص) = 4 فإن : u (س × ص) =

- (أ) ٥ (ب) ٦ (ج) ١٢ (د) ١٨

٦ المدى لمجموعة القيم : $10, 8, 12, 5, 9$ يساوى

- (أ) ٤ (ب) ٦ (ج) ٧ (د) ٢

٧ إذا كانت : $2, 2, 6$ ، ص كميات متناسبة فإن : ص =

- (أ) ٩ (ب) ١٢ (ج) ١٨ (د) ٣

٨ إذا كانت : $(5, 6 - b)$ تقع على محور السينات فإن : $b =$

- (أ) ٩ (ب) ٧ (ج) ٥ (د) ٦



محافظة بورسعيد

٧

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : $2, 2, 6$ ، س كميات متناسبة فإن : س =

- (أ) ٩ (ب) ١٨ (ج) ١٢ (د) ٣

٢ إذا كانت : ص $\propto \frac{1}{س}$ وكانت : ص = 2 عندما س = 2 فإن العلاقة بين : س ، ص هي

- (أ) $ص = \frac{س}{6}$ (ب) $ص = \frac{6}{س}$ (ج) $ص = 6س$ (د) $ص = \frac{1}{س}$

٣ إذا كانت : د (س) = $س^2 - 2س$ ، م (س) = $س - 2$ فإن : د $(\sqrt{2}) + م(\sqrt{2}) =$

- (أ) ٤- (ب) ٥- (ج) ٦- (د) ٧-

٤ الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يسمى

- (أ) المدى (ب) الوسط الحسابي (ج) الانحراف المعياري (د) المنوال

٥ 4 من 30° ط $60^\circ =$

- (أ) ٣ (ب) $2\sqrt{2}$ (ج) ٦ (د) ١٢

٦ إذا كان : $\frac{2}{3}$ ، $\frac{6}{7}$ هما ميلان مستقيمان متوازيان فإن : قيمة $u =$

- (أ) $\frac{2}{3}$ (ب) ٢ (ج) ٥ (د) ٤-

٧ معادلة الخط المستقيم الذي ميله 2 ويمر بالنقطة $(0, 3)$ هي

- (أ) $ص = 2س + 2$ (ب) $ص = 2س + 3$

- (ج) $ص = 2س - 2$ (د) $ص = 2س - 3$

٨ إذا كانت : $(1, 2)$ ، $(3, 4)$ فإن إحداثي منتصف AB هي

- (أ) $(4, 6)$ (ب) $(2, 3)$ (ج) $(8, 12)$ (د) $(0, 0)$



محافظة كفر الشيخ

٨

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١] إذا كان : $(٥, ٢) \in \{٢, ٤\} \times \{٨, -٨\}$ فإن : -٨ =

- (١) ٢ (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ٨

٢] العلاقة التي تمثل تغيراً طردياً بين $ص$ ، $س$ هي

- (١) $ص = ٥$ (ب) $ص = س + ١$ (ج) $\frac{ص}{٢} = \frac{س}{٢}$ (د) $\frac{ص}{٢} = \frac{س}{٢}$

٣] الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة لمجموعة أعداد هو

- (١) الوسط الحسابي. (ب) الوسيط. (ج) المنوال. (د) المدى.

٤] إذا كانت الأعداد : ٤ ، $س$ ، ٩ متناسبة فإن : -٨ =

- (١) -١٢ (ب) -٦ (ج) $١٢ \pm$ (د) $٦ \pm$

٥] إذا كانت : $س = \frac{١}{٢}$ حيث ٢ $س$ قياس زاوية حادة فإن : -٨ =

- (١) ١٥ (ب) ٣٠ (ج) ٤٥ (د) ٦٠

٦] إذا كانت : $(٤, ٠)$ منتصف $أب$ حيث : $أ(١, -١)$ ، $ب(س, ص)$ فإن : $(س, ص) =$

- (١) $(٥, ١)$ (ب) $(٤, ٣)$ (ج) $(١, ٩)$ (د) $(٩, ١)$

٧] ميل المستقيم الذي معادلته $٢ص = ٦س + ١$ هو

- (١) ٠ (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

٨] إذا كان : $أ(٤, ٥)$ ، $ب(٨, ٨)$ فإن : $أب =$ وحدة طول.

- (١) ٥ (ب) ٦ (ج) ٨ (د) ١٢



محافظة المنيا

٩

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١] إذا كان : $س = (-٣)$ ، $ص = (-٤)$ فإن : $ص \times س =$

- (١) ٣ (ب) ٤ (ج) ١٢ (د) ١٥

٢] الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربع انحرافات القيم عن وسطهما يسمى

- (١) المدى. (ب) الوسط الحسابي. (ج) المنوال. (د) الانحراف المعياري.

٣] إذا كان : $ص = ٥$ فإن : $ص$ تتناسب عكسياً مع

- (١) ٥ (ب) $س$ (ج) $س - ٥$ (د) $س + ٥$

- ٤] الوسط المتناسب بين ٤ ، ١٦ هو
 (١) ٨ (ب) ٨- (ج) ٨± (د) ٤
- ٥] ٤ ما ٣٠° ما ٦٠° =
 (١) ١ (ب) ٢ (ج) ٤ (د) ٦
- ٦] المسافة بين النقطتين (٠ ، ٥) ، (١٢- ، ٠) = وحدة طول.
 (١) ١٢ (ب) ١٣ (ج) ١٤ (د) ١٥
- ٧] معادلة المستقيم الذى ميله ٣ ويمر بالنقطة (١ ، ٠) هى
 (١) ص = س + ٣ (ب) س = ٣ (ج) ص = ٣ (د) ص = ٣ - س
- ٨] إذا كانت نقطة الأصل هى منتصف \overline{AB} وكانت $A(٢ ، ٣-)$ فإن نقطة B =
 (١) (٢ ، ٣) (ب) (٣- ، ٢) (ج) (٣ ، ٢-) (د) (٢- ، ٣)



محافظة سوهاج

١٠

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١] إذا كان : $٩ = (س-٢)$ ، $٦ = (س-٣)$ فإن : $س =$
 (١) ٢ (ب) ٣ (ج) ٦ (د) ٩
- ٢] العلاقة التى تمثل تغيراً طردياً بين $س$ ، $ص$ هى
 (١) $س = ٥$ (ب) $ص = س + ٣$ (ج) $\frac{س}{٥} = \frac{ص}{٢}$ (د) $\frac{س}{٤} = \frac{ص}{٣}$
- ٣] من أبسط مقاييس التشتت
 (١) الوسط الحسابى. (ب) المدى. (ج) الوسيط. (د) المنوال.
- ٤] إذا كان : $٤ = ٣ - ٢$ ، $٠ = ٣ - ٢$ فإن : $\frac{س}{٤} = \frac{ص}{٢}$
 (١) $\frac{٣}{٤}$ (ب) $\frac{٣}{٥}$ (ج) $\frac{٤}{٣}$ (د) $\frac{٤}{٥}$
- ٥] البعد بين النقطتين (٠ ، ٣) ، (٤- ، ٠) يساوى وحدة طول.
 (١) ٤ (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ٧
- ٦] إذا كان : $١ = ٣ - ٢$ ، $١ = ٣ - ٢$ فإن : $س =$ حيث $س$ قياس زاوية حادة.
 (١) ٤٥ (ب) ٦٠ (ج) ٣٠ (د) ٩٠
- ٧] إذا كان المستقيمان اللذان ميلهما $-\frac{٢}{٣}$ ، $\frac{٦}{٥}$ متوازيين فإن : $س =$
 (١) ٦ (ب) ٤- (ج) $\frac{٢}{٣}$ (د) ٢
- ٨] معادلة المستقيم الذى ميله ٥ ويمر بنقطة الأصل هى
 (١) $ص = ٥$ (ب) $س = ٥$ (ج) $ص = ٥ س$ (د) $١ + س = ٥$

امتحانات المحافظات في الجبر والإحصاء



محافظة القاهرة

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١ أبسط مقاييس التشتت هو
 (أ) الوسط الحسابي. (ب) الوسيط. (ج) المدى. (د) النوال.
- ٢ ٢ من ٣ × ٢ من ٣ =
 (أ) ٦ من ٢ (ب) ٥ من ٢ (ج) ٦ من ٢ (د) ٥ من ٢
- ٣ إذا كانت : س = {٢} ، ر = (ص) = ٥ فإن : ر = (س × ص) =
 (أ) ١ (ب) ٥ (ج) ٨ (د) ١٥
- ٤ أبسط صورة للمقدار : ٣ - ص - ٤ ص + ٥ ص + ٧ ص هي
 (أ) ٧ ص + ١٢ ص (ب) ١١ ص
 (ج) ١٠ ص + ٩ ص (د) ٨ ص + ٣ ص
- ٥ العلاقة التي تمثل تغيراً عكسياً بين المتغيرين ص ، س هي
 (أ) س ص = ٥ (ب) ص = س + ٣ (ج) $\frac{س}{٥} = \frac{ص}{٣}$ (د) ص = ٢ س
- ٦ إذا كان : $\frac{١}{س} = ٤$ فإن : س = حيث س ∈ ص
 (أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٨ (د) ١٦

(١) ارسم منحنى الدالة $d : (s) = s^2$ متخذاً $s \in [-3, 3]$ ومن الرسم أوجد :

١ القيمة العظمى أو الصغرى للدالة. ٢ معادلة محور التماثل.

(ب) أوجد الانحراف المعياري لمجموعة القيم: ١٥ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٥


(١) إذا كانت : $\{٤, ٣\} = \text{س}$ ، $\{٥, ٤\} = \text{ص}$ ، $\{٦, ٥\} = \text{ع}$ ،

أوجد: $\boxed{1}$ س \times ص $\boxed{2}$ (س - ص) \times ع

(ب) إذا كانت : ح ، ص ، ع ، ل كميات متناسبة أثبت أن : $\frac{ح - ل}{ع} = \frac{ص - ع}{ح}$

٤ (١) أوجد العدد الذي إذا أضيف إلى جدى النسبة ٣ : ٥ فإنها تصبح ١ : ٢

(ب) فى الشكل المقابل :



المخطط السهمى يمثل العلاقة على المجموعة سـ

١ اكتب بيانك

٢ هل العلاقة دالة ؟ وإذا كانت دالة أوجد مداها.

٥ (١) إذا كانت : ص ٣٠ س ، وكانت : ص = ٢٠ عندما س = ٤

أوجد : ١ ثابت التناسب بين ص ، س ٢ قيمة س عندما ص = ٤٠

(ب) إذا كانت : د (س) = ٢ س + ٤ ، د (٥) = ١٢ أوجد : قيمة د



محافظة الجيزة

٢

أجب عن الاسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ ضعف العدد ٨٢ هو

(١) ١٠٢ (ب) ١٦٢ (ج) ٨٤ (د) ٩٢

٢ إذا كان : س ص = ٣ فإن : ص ٣٠

(١) س (ب) ٣ س (ج) $\frac{1}{3} س$ (د) $\frac{1}{4} س$

٣ إذا كان : س + ٢ ص = ٢٥ ، (س + ص) = ٤٩

فإن : س ص =

(١) ٦ (ب) ١٠ (ج) ١٢ (د) ٢٤

٤ إذا كانت : د (س) = ٣ فإن : د (٣) + د (٣-) =

(١) صفر (ب) ١ (ج) ٦- (د) ٦

٥ $[٥ ، ٢ - [\cup \{٥ ، ٢ - \}$ =

(١) $[٥ ، ٢ - [$ (ب) $[٥ ، ٢ - [$ (ج) $[٥ ، ٢ - [$ (د) $[٥ ، ٢ - [$

٦ المدى لمجموعة القيم : ٥ ، ١٤ ، ٤ ، ٢٣ ، ١٥ هو

(١) ١٢ (ب) ١٤ (ج) ١٩ (د) ٢٣

٢ (١) إذا كانت : س = {٥ ، ٢} ، ص = {٢ ، ١} ، ع = {٢}

فأوجد : ١ $ص \times س$ (ج) ٢ $(ص \cap س) \times ع$

(ب) إذا كانت : د (س) = ٤ س + ب وكانت : د (٢) = ١٠ فأوجد : قيمة ب

٣ (١) إذا كانت : س = {٥ ، ٢} ، ص = {٥ ، ٢ ، ٦ ، ٨ ، ١٠} وكانت د :

علاقة من س إلى ص حيث «أ» د «ب» تعنى « $\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ » لكل $١ \in س$ ، $٢ \in ص$ اكتب بيانك ومثلها بمخطط سهمى. هل د دالة ؟ ولماذا ؟

(ب) أوجد العدد الذى إذا أضيف إلى جدى النسبة ٧ : ١٧ فإنها تصبح ٢ : ٢

٤ (١) إذا كان : ٢٢ = ٣ = ٣ - ح فأوجد القيمة العددية للمقدار : $\frac{٢٦ + ب + ح}{٢٤ + ب + ح}$

(ب) احسب الانحراف المعياري لمجموعة القيم : ٥٥ ، ٥٢ ، ٥٧ ، ٥٦ ، ٥٤

٥ (١) إذا كانت : ص ٣٠ س وكانت : ص = ٦ عندما س = ٣

فأوجد : ١ العلاقة بين س ، ص ٢ قيمة ص عندما س = ٤

(ب) مثل بيانياً منحنى الدالة : د (س) = ٤ - س حيث س $\in [٣ ، ٢]$

ومن الرسم استنتج نقطة رأس المنحنى ، معادلة محور التماثل.



محافظة الإسكندرية

٣

أجب عن الاسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان : س (س) = ٥ ، س (س × ص) = ١٠ فإن : س (ص) =

(١) ٤ (ب) ٢ (ج) ٢ (د) ١



٥ (١) إذا كانت : a, b, c في تناسب متسلسل فأثبت أن : $\frac{a}{b} = \frac{c}{a+b}$

(ب) مثل بياناً الدالة d حيث $d = (x) = x^2 + 2x + 1$ متخذاً $x \in [-4, 2]$

ومن الرسم استنتج :

١ إيجاد رأس المنحنى. ٢ معادلة محور التماثل.

٣ القيمة العظمى أو الصغرى للدالة.



محافظة القليوبية

٤

أجب عن الأسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ $\sqrt{x^2} = \dots$

(١) x (ب) $-x$ (ج) x (د) $-x$

٢ إذا كان : $(x + 5, 8) = (1, 6 + x)$ فإن : $x = \dots$

(١) ٥ (ب) ٦ (ج) ٢ (د) ١٢

٣ مجموعة حل المعادلة : $x^2 + 4 = 0$ في \mathbb{R} هي

(١) $\{4\}$ (ب) $\{2, -2\}$ (ج) $\{-2\}$ (د) \emptyset

٤ إذا كان : $x = 7$ فإن : $3x = \dots$

(١) $\frac{1}{x}$ (ب) $x - 7$ (ج) x (د) $7 + x$

٥ إذا كان : $x^2 - 2x = 16$ ، $x + 8 = 0$ فإن : $x = \dots$

(١) ٢ (ب) ١ (ج) ١٢٨ (د) ٦٤

٦ إذا كان : $(x - 3) = 36$ لمجموعة من القيم عددها يساوي ٩

فإن : $\sigma = \dots$

(١) ٢ (ب) ٤ (ج) ١٨ (د) ٢٧

٢ إذا كانت : $x = \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{2}}$ ، $\sqrt{2} + \sqrt{2} = x$ فإن : $(x + 2) = \dots$

(١) ١٢ (ب) $\sqrt{2} + \sqrt{2}$ (ج) $2\sqrt{2}$ (د) صفر

٣ الوسط الحسابي للقيم : ٨ ، ٩ ، ٧ ، ٦ ، ٥ يساوي

(١) ٢٥ (ب) ٧ (ج) ٣٥ (د) ٥

٤ لأي مجموعة S يكون : $\emptyset \subseteq S$

(١) \subseteq (ب) $\not\subseteq$ (ج) \supset (د) $\not\supset$

٥ العلاقة التي تمثل تغيراً طردياً بين المتغيرين x, y هي

(١) $y = x$ (ب) $y = x + 3$ (ج) $y = \frac{x}{3}$ (د) $y = \frac{x}{2}$

٦ $100x = 99x + \dots$

(١) ٢ (ب) ١ (ج) ٩٩ (د) ٩٩

٢ (١) إذا كانت : $d = (x) = 3x$ حيث : $x \in \mathbb{R}$

اذكر درجة d ثم أوجد $d(-2)$ ، $d(\sqrt{2})$

(ب) إذا كانت : $5 = 4x - 3$ أوجد قيمة : $\frac{9 + 4x}{-2 + 4x}$

٣ (١) إذا كانت : $S = \{-1, 1, 2\}$ ، $T = \{2, 4, 6, 8\}$ وكانت G

علاقة من S إلى T حيث « G » تعني أن « $b = a + 2$ ».

لكل $a \in S$ ، $b \in T$ اكتب بيان G ومثلها بمخطط سهمي وهل G دالة ؟ ولماذا ؟

(ب) إذا كان : $x^2 - 14x + 49 = 0$ فأثبت أن : $x = \frac{1}{x}$

٤ (١) إذا كان : $(x - 2, 3) = (5, x + 1)$ أوجد : قيمة كل من x, y

(ب) التوزيع التكراري التالي يبين عدد أطفال بعض الأسر في إحدى المدن الجديدة :

| عدد الأطفال | صفر | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|-------------|-----|----|----|----|---|
| عدد الأسر | ٨ | ١٦ | ٥٠ | ٢٠ | ٦ |

احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعدد الأطفال.



محافظة الشرقية

٥

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان الوسط الحسابي للكميات ٢ س ، ٢ ، ٤ ، ٥ يساوي ٤ فإن : س =

(١) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

٢ إذا كان : س × ص = { (١ ، ٢) ، (٢ ، ٣) ، (٣ ، ٤) } فإن : س ∩ ص =

(١) { ٢ ، ١ } (ب) { (٢ ، ٣) } (ج) ∅ (د) { ٤ ، ١ }

٣ إذا كانت : ص = م س حيث م ثابت ≠ صفر فأى العبارات الآتية تكون عبارة خطأ ؟

(١) ص ∞ س (ب) س ∞ ص (ج) س = ١/م ص (د) س ∞ ١/ص

٤ إذا كانت : أ ، ب ، ج ، د كميات متناسبة فإن : $\frac{أ-ب}{ج+د} = \frac{ب-ج}{د+أ}$

(١) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

٥ إذا كانت د : د (س) = (٢ - ١٢) س + ٢ س + ٢ س + ٢ + كثيرة حدود من الدرجة الثانية فإن : أ =

(١) صفر (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ١

٦ إذا كانت النقطة (١ - ٥ ، ٥ - ٥) تقع فى الربع الرابع فإن :

(١) ١ ≤ ٠ (ب) ٠ ≤ ١ (ج) ١ < ٠ (د) ٠ > ١

٢ (١) إذا كانت : س = { ١ ، ٢ ، ٢ } ، ص = { ٢ ، ٤ } أوجد :

١ س - ص ٢ (ص ∩ س) × ص ٣ ص (ص)

(ب) إذا كانت : أ ، ب ، ج ، د فى تناسب متسلسل

$$\frac{أ}{ج} = \frac{ب}{د} = \frac{س}{د} = \frac{ب+د}{س+د}$$

٢ (١) مثل بياناً الدالة د حيث د (س) = (٢ - س) ، س ∈ [٠ ، ٤]

ومن الرسم استنتج :

١ معادلة محور التماثل.

٢ القيمة العظمى أو الصغرى للدالة.

(ب) إذا كانت : ص ∞ ١/س ، وكانت : س = ٤/٢ عندما ص = ٤/٧ أوجد قيمة ص عندما س = ٣ ١/٥

٣ (١) إذا كانت : س = { ٢ ، ٢ ، ٥ } ، ص = { ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٠ }

وكانت د علاقة معرفة من س إلى ص حيث « د س » تعنى أن « ٢ = س » لكل ∃ س ، ∃ ب ∃ ص

١ اكتب بيان د ومثلها بمخطط سهمى.

٢ هل العلاقة دالة ؟

(ب) إذا كانت : أ ، ب ، ج ، د كميات متناسبة فأثبت أن : $\frac{أ+ب}{س+د} = \frac{أ-ب}{س-د} = \frac{أ}{س} = \frac{ب}{د}$

٤ (١) إذا كانت : س = { ٢ ، ٤ } ، ص = { ٠ ، ٤ } ، ع = { ٤ ، ٥ ، ٢ }

أوجد : ١ (ع - ص) × (س ∩ ص) ٢ ص (س)

(ب) إذا كانت : د (س) = ٤ س + ب وكانت : د (٢) = ١٥ فأوجد : قيمة ب

٥ (١) إذا كان : $\frac{أ}{س+٢} = \frac{ب}{س+٣} = \frac{ج}{س+٤} = \frac{د}{س+٥}$

$$\frac{أ+ب}{١٧} = \frac{ب+٢}{٧}$$

(ب) أوجد الانحراف المعياري للتوزيع التكرارى التالى :

| س | صفر | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | المجموع |
|-----|-----|----|----|----|----|----|---------|
| ١٠٠ | ٢ | ١٦ | ١٧ | ٢٥ | ٢٠ | ١٩ | ١٠٠ |

٢ (١) إذا كانت : $s = \{ \frac{1}{p}, 1, \text{صفر}, -\frac{1}{p}, -1 \}$

، $s = \{ 1, 2, \text{صفر}, -1, -2 \}$ وكانت g علاقة من s إلى s حيث « g » تعني «العدد ٢ هو المعكوس الضربي للعدد s » لكل $s \in s$ ، $s \in s$ اكتب بيان g ومثلها بمخطط سهمي ، وبين هل g دالة أم لا ، ولماذا ؟

(ب) إذا كانت : s تتغير عكسياً مع s^2 حيث $s = 9$ عندما $s = \frac{2}{3}$

أوجد : ١ العلاقة بين s ، s ٢ قيمة s عند $s = \frac{1}{3}$

٤ (١) مثل بيانياً منحنى الدالة $d : d(s) = (s - 3)^2 + 1$ متخذاً $s \in [0, 6]$

ومن الرسم أوجد :

١ إحداثي نقطة رأس المنحنى. ٢ القيمة الصغرى للدالة.

٣ معادلة محور التماثل للمنحنى.

(ب) إذا كان : $\frac{s}{p} = \frac{s}{p} = \frac{s}{p}$ أوجد قيمة : $\frac{s + s + s}{s^2 + s^2 + s^2}$

٥ (١) احسب الانحراف المعياري للقيم : ١٢ ، ١٣ ، ١٦ ، ١٨ ، ٢١

(ب) إذا كانت $d(s) = 4s + s$ وكانت : $d(4) = s$

فأوجد قيمة المقدار : $4s^2 + 5$



محافظة المنوفية

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ العدد ٢ ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة :

(١) $s < 2$ (ب) $s > 2$ (ج) $s \leq 2$ (د) $s \geq 2$

٢ $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ $\left(\frac{3}{4}\right)^2$

(١) $>$ (ب) $<$ (ج) $=$ (د) \geq

٣ العدد الذي يقع بين : ٠.٠٢ ، ٠.٠٣ هو

(١) ٠.٠٠٠٢٥ (ب) ٠.٠٠٠٢٥ (ج) ٠.٠٢٥ (د) ٠.٢٥

٤ إذا كانت : $0 > 4$ فإن النقطة (٢ ، ٤ - ٥) تقع في الربع

(١) الأول. (ب) الثاني. (ج) الثالث. (د) الرابع.

٥ إذا كانت : $\frac{p}{q} = \frac{p}{q}$ فإن : $4 - 3 - 4 + 5 =$

(١) ٢ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٦

٦ إذا كان : $مح (s - s) = 48$ لمجموعة من القيم عدها ١٢

فإن : $s =$

(١) ٢ (ب) ٢- (ج) ٤- (د) ٤

٢ (١) إذا كانت : $s = \{ -1, 1, 2 \}$ ، $s = \{ 2, 4, 6, 8 \}$ وكانت g علاقة

من s إلى s حيث « g » تعني أن « $4 + 2 = s$ » لكل $s \in s$ ، $s \in s$

١ اكتب بيان g ومثلها بمخطط سهمي.

٢ بين أن g دالة وأوجد مداها.

(ب) إذا كان المستقيم الممثل للدالة $d : d(s) = 6s - 4$ يقطع

محور الصادات في النقطة (٣ ، ب) فأوجد : قيمة $4 - 5$

٣ (١) إذا كانت : $s = \{ 1 \}$ ، $s = \{ 2, 2 \}$ ، $s = \{ 3, 4, 5 \}$

أوجد ما يلي : ١ $s \times s$ ٢ $s \times (s - s)$

٣ $s(s)$

(ب) إذا كانت : s وسطاً متناسباً بين ٢ ، ٤ فأثبت أن : $\frac{s + s}{s} = \frac{s + s}{s}$

٤ (١) إذا كانت : $s : b : c = 2 : 3 : 5$ وكانت : $4 + b + c = 35$

فأوجد : قيمة كل من ٢ ، ب ، ج

(ب) إذا كانت : $s = 4 + 7$ وكانت : $4 \times \frac{1}{s} = 3$ وكانت : $4 = 3$ عندما $s = 2$ فأوجد :

١ العلاقة بين s ، s ٢ قيمة s عندما $s = 3\frac{1}{2}$



٥ (١) ارسم منحنى الدالة د حيث د (س) = س^٢ - ٤ س متخذاً س ∈ [-١، ٥]

ومن الرسم أوجد :

١ إحداثيتي نقطة رأس المنحنى.

٢ القيمة العظمى أو القيمة الصغرى للدالة.

(ب) أوجد الانحراف المعياري للقيم الآتية : ٢٠، ٢٧، ٥، ١٦، ٢٢



محافظة الغربية

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ الدوال الآتية هي دوال كثيرات حدود ما عدا الدالة د حيث د (س) =

(١) س + ٢ (ب) ٢√س + ١

(ج) س (س + ١) (د) س^٢ (س + ٤)

٢ مجموعة حل المعادلة : (س - ٥) = ١ في ح هي

(١) {٥} (ب) {٥، -٥} (ج) ح (د) ح - {٥}

٣ إذا كان : (١ - ٢) = (٢٦، ٧ - ١) فإن : ٢√س + ٢ =

(١) ٥ (ب) -٥ (ج) ٥ ± (د) ٧ ±

٤ الثاني المتناسب للأعداد : ٢، ...، ٨ هو

(١) ٤ (ب) ٦ (ج) ٤ ± (د) ٦ ±

٥ المدى لمجموعة القيم : ٧، ٢، ٦، ٩، ٥ هو

(١) ٣ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ١٢

٦ إذا كانت : ص = ٣ وكانت : ص = ٢ عندما س = ٨

فإن : ص = ٣ عندما س =

(١) ١٦ (ب) ١٢ (ج) ٢٤ (د) ٦

امتحانات الجبر والإحصاء

٢ (١) إذا كانت : س = {-٢، -٣، ٢} ، ص = {١/٨، ١/١٧، ٨} وكانت د علاقة

من س إلى ص حيث «١ د ب» تعني أن «١ = ب» لكل ١ ∈ س ، ب ∈ ص
اكتب بيان د ومثلها بمخطط سهمي. هل د دالة أم لا ؟ مع ذكر السبب.

(ب) إذا كانت : س^٤ - ٢ - ١٤ س^٢ + ٤٩ = ٠ فاثبت أن : ص = ١/٣

٣ (١) إذا كانت : ١، ب، ح، د كميات متناسبة أثبت أن : ١/ب + ١/ح = ١/د

(ب) مثل بياناً منحنى الدالة د : د (س) = ٢ - س^٢ متخذاً س ∈ [-٢، ٢]
ومن الرسم استنتج معادلة محور التماثل ، القيمة العظمى أو الصغرى للدالة.

٤ (١) إذا كان : س × ص = {-١، ١، ٢، ٣} أوجد : ص^٢
ومثلها بمخطط بياني.

(ب) أوجد العدد الموجب الذي إذا أضيف مربعه إلى كل من حدى النسبة ٥ : ١١
فإنها تصبح ٥ : ٣

٥ (١) إذا كان المستقيم الممثل للدالة د : ح ← ح حيث د (س) = ٦ س - ل

يقطع محور الصادات في النقطة (٣، م) فأوجد : قيمتي م ، ل

(ب) احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للبيانات الآتية : ٢٣، ١٢، ١٧، ١٣، ١٥
(مقرباً الانحراف المعياري لأقرب رقم عشري)



محافظة الدقهلية

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ (١) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان : ٥ = س = ٩ فإن : ٣/س =


(١) ١٠ : ٢٧ (ب) ٥ : ٩ (ج) ٩ : ٥ (د) ٢٥ : ٨١

٢ الشكل المقابل منحنى لدالة تربيعية حيث ١ (٤، -٥)

فإن معادلة محور التماثل هي : س =

(١) ١ (ب) -١

(ج) -٢ (د) صفر



٣ العدد الذي إذا أضيف إلى كل من الأعداد ١، ٢، ٦ فإنها تصبح متناسبة هو

- (أ) ٤ (ب) ٣ (ج) ١ (د) ٢

(ب) إذا كانت ب وسطاً متناسباً بين ١، ح أثبت أن: $\frac{1}{2} = \frac{2}{3} + \frac{3}{4}$

٤ (١) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت د (س) = (س + ٣) - س - ٢ فإن د (٧) =

- (أ) ٤ (ب) ١ (ج) ٧ (د) ١٠

٢ إذا كانت د (س) = (س - ٣) - ٢ = ٣٦ لمجموعة من القيم عددها ٩

فإن الانحراف المعياري يساوي

- (أ) ٢ (ب) ١٨ (ج) ٢٧ (د) ٤

٣ إذا كانت د (س) = ٣ - س فإن د (٢) - د (٧) =

- (أ) ٥ (ب) -٥ (ج) صفر (د) -٤

(ب) إذا كانت د (س) = {٤، ٥، ٧} وكانت د دالة على س

وكان بيان د : {٤، ٥، ٦، ٧} = {٤، ٥، ٦، ٧}

أوجد : ١ القيمة العددية للمقدار ٢٣ + ٣ ب ٢ مدى الدالة.

٣ (١) إذا كان : $\frac{1}{4} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2}$ أثبت أن : $\frac{1}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$

(ب) احسب الانحراف المعياري للقيم : ١٢، ١٣، ١٦، ١٨، ٢١

٤ (١) الشكل المقابل لمنحنى الدالة التربيعية

د : د (س) = (س) - ٢ - (٢ - س) (س - ٤) + ٤


فإذا كان الشكل و ١ ب ح مربيعاً

فأوجد : قيمة الثابت لـ

(ب) إذا كانت د (س) = ١ + ب حيث ب تتغير عكسياً

مع مربع س وكانت د (س) = ١ عندما س = ٥

أوجد العلاقة بين : س، ح ثم أوجد قيمة ح عندما س = ٢



٥

(١) إذا كانت د (س) = ٢ + س، ل (س) = ح كثيرتي حدود حيث ١، ح ثابتان

وكان د (٢) ل (٢) + ٢ = ٦ أوجد القيمة العددية للمقدار : د (٠) + ٢ ل (٧)

(ب) إذا كانت د (س) = {٢، ٥، ٧}، ح = {س : س > ٨، س > ٣٠} وكانت

الدالة د من س - ح بيّنها كالتالي د = {٢، ٩}، {٥، ١٥}، {٧، ٢١}

١ انكر مجال الدالة د ٢ اكتب قاعدة الدالة.

محافظة الإسماعيلية

٩

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ توقع أى نتيجة لمباراة النادي الإسماعيلي يسمى فى علم الرياضيات

- (أ) احتمالات. (ب) معادلات. (ج) متباينات. (د) علاقات.

٢ الثالث المتناسب للأعداد : ٢، ٣، ٦ هو

- (أ) ١ (ب) ٤ (ج) ٩ (د) ١٢

٣ يكون العدد $\frac{2}{3}$ نسبياً إذا كانت د (س) =

- (أ) صفر (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) $\frac{2}{3}$ (د) ٥

٤ إذا كانت النقطة (ب - ٢، ٤ - ٢) تقع فى الربع الثالث فإن د (ب) =

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٦

٥ إذا كان : ١٧ س + ٨ = ١١ فإن : ١٧ س + ١١ =

- (أ) ٨ (ب) ١١ (ج) ١٤ (د) ١٧

٦ إذا تساوت مجموعة من القيم فإن التشتت لتلك القيم

- (أ) < صفر (ب) > صفر (ج) ١ (د) = صفر

(١) إذا كانت د (س) = {٢، ٣}، ح = {٢، ٤، ٥}،

أوجد : ١ س - ح ٢ س - ح ٣ ح - س

(ب) إذا كانت د (س) = ٢٣ - ٤ ب أوجد قيمة المقدار : $\frac{2+2}{3-4}$



٥ مجموع قيم المفردات
عدد هذه القيم

(أ) المدى (ب) الانحراف المعياري

(ج) الوسط الحسابي (د) المنوال

٦ إذا كانت النقطة (٢، ص) تقع على محور السينات فإن : ص + ٤ =
(أ) ٥ (ب) ٤ (ج) ٢ (د) ٣

٢ (أ) إذا كانت : ٤ = ٣ ب أوجد : قيمة $\frac{٤+١}{٢-١}$

(ب) إذا كانت : س = {٠، ٢، ٤} ، ص = {١، ٢، ٤، ٥} وكانت ع علاقة من س إلى ص حيث «١ ع ب» تعني أن «١ = ب + ٥»
لكل ١ س ، ٢ س ، ٣ س

١ اكتب بيان العلاقة. ٢ مثل ع بمخطط سهمي. ٣ هل ع دالة ؟

٣ (أ) إذا كان : س × ص = { (٢، ٦) ، (٢، ٩) ، (٣، ٦) ، (٣، ٩) }
أوجد : ١ س ، ٢ ص × ص

(ب) مثل بياناً منحنى الدالة د : د = (س) + ١ حيث س ∈ [٢، ٢-]

ومن الرسم استنتج :

١ نقطة رأس المنحنى. ٢ معادلة محور التماثل. ٣ القيمة الصغرى.

٤ (أ) إذا كانت : س ، ص ، ع ، ل كميات متناسبة فأثبت أن : $\frac{س}{ص} = \frac{ع}{ل}$

(ب) من بيانات الجدول المقابل أجب عن الأسئلة الآتية :

| | | | |
|---|---|---|---|
| س | ٢ | ٤ | ٦ |
| ص | ٦ | ٣ | ٢ |

١ بين نوع التغير بين ص ، س

٢ أوجد ثابت التغير.

٣ أوجد قيمة ص عندما س = ٣

٥ (أ) إذا كانت د (س) = ٣ - س ، م (س) = س - ٢

١ أوجد : د (٢) + م (٢) ٢ أثبت أن : د (٣) + م (٣) = صفر

(ب) احسب الانحراف المعياري للقيم : ١٢ ، ١٣ ، ١٦ ، ١٨ ، ٢١

٣ (أ) إذا كان ١ تتغير عكسياً مع مربع ب ، وكانت : ١ = ٥ عندما ب = ٢

أوجد : قيمة ١ عندما ب = ٢

(ب) إذا كان المستقيم الممثل للدالة د : ح ← ح حيث د (س) = ٣ - س

يقطع محور الصادات في النقطة (ب ، ٥) أوجد : قيمتي ١ ، ب

٤ (أ) إذا أضيف ضعف العدد س إلى كل من الأعداد ١ ، ٢ ، ٧ أصبحت كميات متناسبة

فأوجد : قيمة س

(ب) إذا كانت : س = {١، ١، ٢} ، ص = {٢، ٤، ٦، ٨} وكانت ع علاقة

من س إلى ص حيث «١ ع ب» تعني «١ = ٢ + ٤» لكل ١ س ، ٢ س ، ٣ س

١ أوجد بيان ع ومثلها بمخطط سهمي. ٢ هل ع دالة ؟ ولماذا ؟

٥ (أ) مثل بياناً منحنى الدالة د حيث د (س) = ٢ - س حيث س ∈ [٢، ٢-]

ومن الرسم استنتج : ١ إحداثي رأس المنحنى. ٢ معادلة محور التماثل.

٣ القيمة الصغرى أو العظمى للدالة.

(ب) احسب الانحراف المعياري للقيم الآتية : ١٢ ، ١٣ ، ١٦ ، ١٨ ، ٢١



محافظة السويس

أجب عن الأسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : ٢ ، ٣ ، ٦ ، س كميات متناسبة فإن : س =
(أ) ٩ (ب) ١٨ (ج) ١٢ (د) ٣

٢ إذا كانت : ٢ × ١٢ = ٢ × ١٢ فإن : ٢ =
(أ) ٢٤ (ب) ٢٢ (ج) ٢٤ (د) ٢٢

٣ إذا كانت : س = {١، ٢} ، ص = {٢، ٤} فإن : (٤، ٣) ∈
(أ) س × ص (ب) ص × س (ج) س (د) ص

٤ إذا كان : (١، ٥) = (٦، ب) فإن : ١ + ب =
(أ) ١ (ب) ١١ (ج) ٦ (د) ١



محافظة بورسعيد

١١

أجب عن الأسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١ إذا كان : $(٥, ٢) \in \{٦, ٢\} \times \{٨, ٣\}$ فإن : $٣ =$
 (أ) ٨ (ب) ٦ (ج) ٥ (د) ٣

٢ الدالة الخطية المعرفة بالقاعدة : $٢ - ٣ = ١$ يمثلها بيانيًا خط مستقيم يقطع محور الصادات في النقطة

- (أ) $(٠, \frac{1}{٢})$ (ب) $(١, ٠)$ (ج) $(٠, -١)$ (د) $(\frac{1}{٢}, ٠)$

٣ الفرق بين أكبر المفردات وأصغرها لمجموعة من المفردات يسمى

- (أ) الانحراف المعياري. (ب) الوسط الحسابي.
 (ج) الوسيط. (د) المدى.

٤ إذا كانت النقطة $(٤ - ٢, ٣ - ٢)$ حيث $٣ \in$ ص تقع في الربع الرابع فإن : $٣ =$

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٦

٥ أي من الجداول الآتية يمثل تغيرًا طرديًا بين ٣ ، ٥ ؟

| ٣ | ٥ |
|----|---|
| ٩ | ٢ |
| ١٨ | ٤ |

(أ)

| ٣ | ٥ |
|---|---|
| ٦ | ٣ |
| ٩ | ٢ |

(ب)

| ٣ | ٥ |
|----|---|
| ٢٠ | ٣ |
| ١٢ | ٥ |

(ج)

| ٣ | ٥ |
|----|----|
| ٩ | ١٠ |
| ١٨ | ٥ |

(د)

٦ إذا كان : $(١١, ١) = (٨, ٣)$ فإن : $٣ + ٢ =$
 (أ) ٥ (ب) $٥ \pm$ (ج) $\sqrt{١٧}$ (د) ٢٥

٢ (أ) إذا كانت : $٣ = \{١, ٢\}$ ، $٣ = \{٢, ٤\}$ ، $٤ = \{٥, ٤\}$

فأوجد : ١ (٣×٤) ٢ $(٣ - ٣) \cap ٤$

(ب) مثل بيانيًا : $٣ = (٣) = ٢ + ٣ + ١$ متخذًا $٣ \in [-٤, ٢]$

ومن الرسم استنتج :

١ إحدائيه رأس المنحنى. ٢ القيمة العظمى أو الصغرى للدالة.

٣ (أ) إذا كانت : $٤ = (٣) = ٣ + ٣$ وكانت : $٣ = (٢) = ١٥$ أوجد : قيمة ٣

(ب) إذا كانت : $٣ \propto \frac{1}{٣}$ وكانت : $٣ = ٦$ عندما $٣ = ٥$ ،

فأوجد : ١ العلاقة بين ٣ ، ٣ ٢ قيمة ٣ عندما $٣ = ٥$

٤ (أ) إذا كانت : $٣ = \{١, ٢, ٣\}$ ، $٣ = \{١٢, ٢١, ٤٧, ٥٢\}$ وكانت ٣ علاقة

من ٣ إلى ٣ حيث « ٣ » تعني « رقم من أرقام العدد »
 لكل $٣ \in ٣$ ، $٣ \in ٣$

١ اكتب بيان ٣ ومثلها بالمخطط السهمي.

٢ أي من العلاقات التالية صواب مع ذكر السبب : ١ $٥٢ \in ٣$ ، ٢ $٢١ \in ٣$ ، ٣ $٤٧ \in ٣$ ؟

(ب) إذا كانت : ٧ ، ٣ ، ٣ في تناسب متسلسل فأوجد : قيمة ٣ ص

٥ (أ) إذا كان : $\frac{٣}{٢} = \frac{٣}{٤} = \frac{٣}{٥}$ فأثبت أن : $\frac{٣ - ٢}{٢} = \frac{٣ - ٤}{٤} = \frac{٣ - ٥}{٥}$

(ب) احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم الآتية : ٢ ، ٦ ، ٧ ، ٩ ، ١٥



محافظة دمياط

١٢

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ $\sqrt[3]{٣٦} =$

- (أ) ٦ (ب) ٦- (ج) $٦ \pm$ (د) ١٨

٢ النقطة $(٢, ٥)$ تقع في الربع

- (أ) الأول. (ب) الثاني. (ج) الثالث. (د) الرابع.



٥ (أ) إذا كان : $\frac{س}{٣} = \frac{ص}{٤} = \frac{ع}{٥}$ أثبت أن : $\sqrt[٣]{٣س + ٢ص + ٢ع} = ٢س + ٢ص + ٢ع$

(ب) مثل بياناً الدالة د : د (س) = $٢س + ٢ص$ متخذاً س $\in [٢, -٢]$

ومن الرسم استنتج : ١ معادلة محور التماثل للدالة. ٢ القيمة الصغرى للدالة.



محافظة كفر الشيخ

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ (أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ الثالث المتناسب للأعداد : ٤ ، ١٢ ، ... ، ٤٨ هو

(أ) ٧ (ب) ٣٢ (ج) ١٦ (د) ٣٦

٢ \emptyset $\{٢, ١\}$

(أ) \supset (ب) $\not\subset$ (ج) $\not\supset$ (د) \supset

٣ المدى لمجموعة القيم : ٧ ، ٢ ، ٦ ، ٩ ، ٥ يساوى

(أ) ٢ (ب) ٦ (ج) ٤ (د) ١٢

(ب) مثل بياناً منحنى الدالة د حيث د (س) = $(٢س - ٢)$ متخذاً س $\in [-١, ٥]$

ومن الرسم استنتج نقطة رأس المنحنى للدالة ومعادلة محور التماثل والقيمة الصغرى للدالة.

٢ (أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ $(\sqrt{٧٢} + \sqrt{٧٢})(\sqrt{٧٢} - \sqrt{٧٢}) =$

(أ) ٢ (ب) ١٢ (ج) ٣٥ (د) ٢-

٢ $|-٥| + |٥| =$

(أ) صفر (ب) ٢٥ (ج) ١٠ (د) ١٠-

٣ إذا كان : د (س) = $(٢س - ٢)$ متخذاً س $\in [-١, ٥]$ فإن : س - ص =

(أ) ٧ (ب) ٢ (ج) ١١ (د) ١١-

(ب) إذا كانت : ص وسطاً متناسباً بين س ، ع

أثبت أن : $\frac{س - ص}{س - ع} = \frac{ص}{س + ع}$

٣ أكثر مقاييس التشتت انتشاراً وأدقها هو

(أ) الوسيط (ب) الوسط الحسابي.

(ج) المدى (د) الانحراف المعياري.

٤ ع =

(أ) \cap (ب) \cup (ج) \cap (د) \cup

٥ إذا كان : د (س) = $(٢س - ٢)$ متخذاً س $\in [-١, ٥]$ فإن : س - ص =

(أ) $(٢, ٥)$ (ب) $(٥, ٢)$ (ج) $(٥, ٥)$ (د) $(٢, ٢)$

٦ إذا كان : س - ص = ٨ فإن : ص =

(أ) س - ٨ (ب) $\frac{١}{س}$ (ج) س (د) س + ٨

٢ (أ) إذا كانت : س = $\{٥, ٢\}$ ، ص = $\{٢, ١\}$ ، ع = $\{٣\}$

أوجد : ١ $(س \times ص)$ ٢ $(س - ص) \times ع$ ٣ ص

(ب) إذا كانت : ب وسطاً متناسباً بين ٩ ، ح أثبت أن : $\frac{ب - ٩}{ح - ٩} = \frac{ب}{ح + ٩}$

٣ (أ) إذا كانت : س = $\{١, ٢, ٣, ٤, ٥\}$ ، ص = $\{١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦\}$

وكانت ع علاقة من س إلى ص حيث «ع» تعني أن «ب + ٩ = ٧»

لكل ؟ س ، ب \exists ص

١ اكتب بيان ع

٢ اذكر مع بيان السبب هل ع تمثل دالة من س إلى ص أم لا ، وإذا كانت دالة

أوجد مداها.

(ب) إذا كان : $\frac{س - ص}{س - ع} = \frac{ص}{س + ع}$ أثبت أن : ص = ٥

٤ (أ) احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم الآتية : ١٢ ، ١٣ ، ١٦ ، ١٨ ، ٢١

(ب) إذا كانت ص = ٥ ، وكانت : ص = ٦ عندما س = ٣

أوجد : ١ العلاقة بين س ، ص ٢ قيمة ص عندما س = ٥

٤ إذا كانت : ٧ ، ح ، $\frac{1}{ص}$ في تناسب متسلسل فإن : $ص^2 = \dots\dots\dots$

$$\varepsilon^q (J) \qquad 1\varepsilon (J) \qquad \frac{1}{V} (B) \qquad V (I)$$

٥ إذا كان : $٧ = ٣ + ١$ ، $٣ = ح$

فإن القيمة العددية للمقدار : $4 + 3(b + c) = \dots\dots\dots$

۲۰ (ج) ۲۱ (د) ۱۶ (ب) ۱۰ (ا)

٦ الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في المجموعة يُسمى

(أ) الوسط الحسابي. (ب) الوسطي.

(ج) المدى. (د) الانحراف المعياري.

(١) إذا كانت: $\{١\} = \text{س}$ ، $\{٢, ٢\} = \text{ص}$ ، $\{٦, ٥, ٢\} = \text{ع}$ ،

أوجد: $\boxed{1} \times (ص \cap ع)$ $\boxed{2} \cup (ع^c)$

(ب) أوجد العدد الموجب الذي إذا أُضيف مربعه إلى كل من حدى النسبة ٥ : ١١

فَإِنهَا تَصْبِحُ ٣ : ٥

(١) إذا كانت النقطة $(١, ٢)$ تقع على الخط المستقيم الممثل للدالة

د. ح ← ح حيث: $(س) = ٤ - س - ٥$ فأوجد: قيمة ١

(ب) إذا كان: $\frac{1+a}{0} = \frac{a+b}{6} = \frac{b+1}{3}$ فأثبت أن: $v = \frac{a+b+1}{1}$

(۱) إذا كانت: $S = \{1, 2, 5\}$ ، وكانت E علاقة على S حيث « E »

تعنی أن « $1 + 6 = 7$ » لكل $1 \in S$ ، $6 \in S$.

١ اكتب بيانك. ٢ بين أن $\sqrt{2}$ دالة ، وأوجد مداها.

(ب) احسب الانحراف المعياري للقيم الآتية : ١٧ ، ٢٢ ، ٢٠ ، ٢٣ ، ١٨

(۱) إذا كانت : ص ۳۰ ح و كانت ص = ۶ عندما ح = ۳

فأوجد: ١) العلاقة بين α و β ٢) قيمة α عندما $\beta = 0$

(ب) مثل بيانياً منحني الدالة d حيث $d = (s) = s^2 - 3$ متخذاً $s \in [-2, 2]$

ومن الرسم استنتج :

١ معادلة محور التماثل. ٢ القيمة الصغرى للدالة.

اِذَا كَانَتْ : س = {٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١} ، ص = {٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١}

، وكانت **ع** علاقة معرفة من **س** إلى **ص** حيث **«أ ع ب»** تعني أن **«ب = أ - ٦»**

لکل ۱۳۳۷ سہ، ۱۳۳۸ ص

١ اكتب بيانك ومثلها بمخطط سهمي. ٢ بين أن كل دالة وانكر مداها.

(ب) إذا كانت : $3س = 2ص$ أوجد قيمة النسبة : $\frac{3س + 2ص}{6ص - 3س}$

(أ) إذا كانت: $\{١, ٢\} = \sim$ ، $\{٠, ٤\} = \sim$ ، $\{٢, ٥, ٤\} = \sim$

أوجد: ١ \times $ص$ ٢ $(ص \cap ع) \times س$ ٣ $ص (ص \cup ع)$

(ب) إذا كانت د (س) = ٢س + ١ وكانت د (٢) = ١ أوجد : قيمة ١

(۱) إذا كانت : ص تتغير عكسيًا مع \sqrt{S} وكانت : $v = 2$ عندما $S = 4$

١) أوجد العلاقة بين x ، y ٢) استنتج قيمة x عندما $y = 16$

(ب) احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم: ٥، ٦، ٧، ٩، ٨

محافظة البحيرة

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ مجموعة الحل في \mathbb{C} للمعادلة: $z^2 + 9 = 0$ هي

$$\emptyset \text{ (a)} \quad \{r, r-\} \text{ (b)} \quad \{r\} \text{ (c)} \quad \{r-\} \text{ (d)}$$


٢ إذا كانت النقطة (٤ - ٢، ٤ - ٢) حيث $\mathcal{L} \ni \mathcal{V}$ تقع في الربع الثالث

فاین : لے =

٦ (ج) ٤ (د) ٣ (ب) ٢ (ا)

٣) المعكوس الضربي للعدد $\frac{3}{4}$ هو

$$\sqrt[3]{x-1} \quad \sqrt[3]{x-2} \quad \sqrt[3]{x-3} \quad \sqrt[3]{x-4} = (i)$$



محافظة الفيوم

١٥

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يسمى

(أ) الوسيط. (ب) المنوال.

(ج) المدى. (د) الانحراف المعياري.

٢ إذا كانت : د (٣ س) = ٦ فإن د (٢-) =

(أ) ١٢- (ب) ٣- (ج) ٦ (د) ١٨-

٣ [٢، ٥] - [٢، ٥] =

(أ) {٢، ٥} (ب) [٢، ٥] (ج) [٢، ٥] (د) Ø

٤ خمس العدد ٥ يساوي

(أ) ٢٥ (ب) ٥ (ج) ٥% (د) ٥

٥ إذا كانت : $\frac{1}{3} = \frac{2}{5} = \frac{3}{7}$ فإن كل نسبة تساوي

(أ) $\frac{1+2+3}{3}$ (ب) $\frac{1+2+3}{3}$

(ج) $\frac{1+2+3}{10}$ (د) $\frac{1+2+3}{5}$

٦ إذا كان : س عدداً فردياً فإن العدد الفردي التالي له هو

(أ) س-١ (ب) س+١ (ج) س+٢ (د) س+٣

٧ (أ) إذا كان : ٢٣ = ٢ ب فأوجد قيمة المقدار : $\frac{2-12}{2+1}$

(ب) إذا كانت : د (س) = ٢ س + ٥ ، وكانت : د (٣-) = ٨ فأوجد : قيمة ٢

٨ (أ) إذا كانت : س ، ص ، ع في تناسب متسلسل فأثبت أن : $\frac{2}{ص} = \frac{2}{ص} + \frac{2}{ص} = \frac{2}{ع}$

(ب) إذا كانت : س = {١، ١، ٢} ، ص = {٢، ٤، ٦، ٨} ، وكانت ع علاقة من س إلى ص حيث «١ ع ٢» تعني أن «٢ = ١ + ٢» لكل $٢ \in س$ ، $٢ \in ص$ ، اكتب بيان ع ومثلها بمخطط سهمي. هل ع دالة من س إلى ص؟ ولماذا؟

٩ (أ) إذا كانت ص تتغير طردياً بتغير س ، وكانت : ص = ٢٠ عندما س = ٧ ،

أوجد العلاقة بين ص ، س ، ثم أوجد ص عندما س = ١٤

(ب) إذا كان (٥ - ٢ س ، ص) = (١ ، ٢٧) فأوجد : قيمة ٣ س + ص

١٠ (أ) ارسم الشكل البياني للدالة د : د (س) = ٢ - ٢ حيث $٢ \in [٢، ٢-]$

، ومن الرسم استنتج إحداثي نقطة رأس المنحنى ، والقيمة الصغرى للدالة.

(ب) أوجد الانحراف المعياري للقيم : ٧ ، ١٦ ، ١٣ ، ٥ ، ٩



محافظة بنى سويف

١٦

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ النقطة (٤- ، ٢-) تقع في الربع

(أ) الأول. (ب) الثاني. (ج) الثالث. (د) الرابع.

٢ إذا كانت : س تمثل عدداً سالباً فإن العدد الموجب هو

(أ) ٢ س (ب) ٢ س-٢ (ج) ٤ س-٢ (د) ٦ س-

٣ إذا كانت : س = ١ فإن : ص تتغير مع

(أ) $\frac{1}{س}$ (ب) س-١ (ج) س (د) س+١

٤ أبسط وأسهل طرق قياس التشتت هو

(أ) الوسيط. (ب) الوسط.

(ج) الانحراف المعياري. (د) المدى.

٥ إذا كان : $\frac{1}{س} = \frac{2}{ص} = \frac{3}{ع}$ حيث $٢ \in ع$ فإن : $\frac{1}{س} = \frac{2}{ص} = \frac{3}{ع}$

(أ) ٢ (ب) ٢ (ج) ٢ (د) ٢

٦ إذا كان : $٢ = س$ فإن : $\frac{٢}{٣} = \frac{س}{٣}$
 (أ) $\frac{٤}{٩}$ (ب) $\frac{٢}{٣}$ (ج) $\frac{٩}{٤}$ (د) $\frac{٤}{٩}$

١٢ (١) أوجد العدد الذي إذا أضيف إلى حدى النسبة ٧ : ١١ فإنها تصبح ٢ : ٢

(ب) إذا كانت : $س = \{١، ٢، ٣\}$ ، $ص = \{١، ٢، ٣، ٤، ٩\}$

وكانت $ع$ علاقة من $س$ إلى $ص$ حيث « $ع$ » تعنى أن « $ب = أ$ »

لكل $أ \in س$ ، $ب \in ص$ اكتب بيان $ع$ ومثلها بمخطط سهمى وبين هل $ع$ دالة أم لا.

٣ (١) إذا كانت : $\frac{س}{٢} = \frac{ص}{٣} = \frac{ع}{٤} = \frac{س-٢-ص+٥}{٥}$ أوجد : قيمة $ع$ العديدة.

(ب) مثل بياناً الدالة : د (س) = $٢ - س$ ، $س \in [٢، ٢-]$ ومن الرسم استنتج نقطة رأس المنحنى والقيمة العظمى للدالة.

٤ (١) إذا كانت : $ص$ تتغير طردياً مع $س$ وكانت : $ص = ٢$ عندما $س = ١٥$

أوجد العلاقة بين : $ص$ ، $س$ ثم أوجد قيمة : $س$ عندما $ص = ١٠٠$

(ب) إذا كانت : $س = \{١، ٢\}$ ، $ص = \{٢، ٤، ٥\}$

أوجد : ١) $س \times ص$ ٢) $ص \times س$ ٣) $س^٢$

٥ (١) إذا كانت : د (س) = $٣ + س + ع$ ، $س (س) = ع$

حيث د ، $س$ دالتان كثيرتا حدود. أوجد قيمة $ع$ إذا كانت : د (٣) + $س (٥) = ١٥$

(ب) احسب الانحراف المعياري لمجموعة القيم : ١٢ ، ١٣ ، ١٦ ، ١٨ ، ٢١



محافظة المنيا

١٧

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) $\sqrt{٢٠٧} + \sqrt{٥٧} = \dots$

(أ) $\sqrt{٢٥٧}$ (ب) $\sqrt{٢٥٠}$ (ج) $\sqrt{٢٠٩}$ (د) $\sqrt{٢٠٣}$

٢ إذا كانت ثلاثة أمثال عدد = ٤٥ فإن : $\frac{١}{٥}$ العدد =

(أ) ١٥ (ب) ٥ (ج) ٢ (د) ٩

٣ $٢٥ \times ٥ = \dots$

(أ) ٥ (ب) ١ (ج) صفر (د) -٥

٤ إذا كان : $س = ٣$ ، $ص = (س \times ص) = ١٢$ فإن : $س = \dots$

(أ) ٤ (ب) ٩ (ج) ١٥ (د) ٣٦

٥ العلاقة التي تمثل تغيراً طردياً بين المتغيرين $ص$ ، $س$ هي

(أ) $س = ٥$ (ب) $ص = س + ٣$

(ج) $\frac{س}{٣} = \frac{٥}{ص}$ (د) $\frac{س}{٣} = \frac{٥}{٣}$

٦ المدى هو مقاييس التشتت.

(أ) أبسط. (ب) أكبر. (ج) أصعب. (د) غير ذلك.

٢ (١) إذا كانت : $س = \{١، ٢، ٣\}$ ، $ص = \{١، \frac{١}{٣}، \frac{١}{٤}، \frac{١}{٥}\}$ وكانت $ع$

علاقة من $س$ إلى $ص$ حيث « $ع$ » تعنى أن «العدد ١ معكوس ضربى للعدد ب»

لكل $أ \in س$ ، $ب \in ص$ اكتب بيان $ع$ ومثلها بمخطط سهمى

، ثم بين هل $ع$ دالة أم لا.

(ب) إذا كانت : $ب$ وسطاً متناسباً بين $أ$ ، $ج$ أثبت أن : $\frac{ب}{أ} = \frac{ب+١}{ج-١}$

٣ (١) إذا كانت : $ص = ٢$ ، $س = ٣$ فأوجد قيمة : $\frac{٣+س-٢}{٦-ص-س}$

(ب) إذا كانت : $س = \{٣، ٤\}$ ، $ص = \{٤، ٥\}$ ، $ع = \{٦، ٥\}$

فأوجد : ١) $س \times (ص \cap ع)$ ٢) $(س - ص) \times ع$

٤ (١) إذا كانت $ص \propto \frac{١}{س}$ وكانت : $ص = ٢$ عندما $س = ٢$

أوجد : ١) العلاقة بين $س$ ، $ص$ ٢) قيمة $س$ عندما $ص = ٤$

(ب) احسب الانحراف المعياري للقيم : ١٢ ، ١٣ ، ١٦ ، ١٨ ، ٢١

٥ (١) اذكر درجة الدالة : د (س) = $٣ - ٢ + س$ ثم أوجد : د (٠) ، د (٢-)

(ب) مثل بياناً الدالة : د (س) = $س + ٢ + س + ١$ متخذاً $س \in [٢، ٤-]$

ومن الرسم استنتج :

١) معادلة محور التماثل. ٢) القيمة العظمى أو الصغرى للدالة.



محافظة أسيوط

١٨

أجب عن الأسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ $س \div س^2 = \dots\dots\dots$ (حيث $س \neq ٠$)

(أ) $س^3$ (ب) $س^2$ (ج) $س$ (د) $س^{-١}$

٢ إذا كانت : $س = \{١\}$ ، $ص = \{٢\}$ فإن : $ص \cap س = \dots\dots\dots$

(أ) $\{١، ٢\}$ (ب) $\{١، ٣\}$ (ج) $\{٢\}$ (د) $\{١\}$

٣ المعكوس الضربي للعدد ٠،٢٥ هو

(أ) ٤ (ب) -٠،٢٥ (ج) $\frac{١}{٤}$ (د) -٠،٥

٤ الوسط المتناسب بين ٤ ، ١٦ هو

(أ) -٨ (ب) ٨ (ج) $٨ \pm$ (د) ٦٤

٥ $٠،١٢ + ٠،٣ = \dots\dots\dots$

(أ) ٠،٤٢ (ب) ٠،١٥ (ج) ٠،٢٤ (د) ٠،٣٦

٦ المدى لمجموعة القيم : ٤ ، ١٤ ، ٢٥ ، ٣٤ هو

(أ) ٤ (ب) ٢٠ (ج) ٢٨ (د) ٣٤

٢ (١) إذا كانت : $س = \{٦، ٧\}$ ، $ص = \{٢، ٧\}$ فأوجد :

(أ) $س \cap ص = \dots\dots\dots$ (ب) $س \times ص = \dots\dots\dots$

(ب) إذا كانت : $\frac{١}{٢} = \frac{٢}{٣} = \frac{٣}{٤}$ فأثبت أن : $\frac{٢}{٣} = \frac{٣}{٤}$

٣ (١) إذا كانت : $س = \{١، ٢، ٣\}$ ، $ص = \{١، ٤، ٦، ٩\}$ وكانت $ك$

علاقة من $س$ إلى $ص$ حيث « $ك$ » تعني « ١ » لكل $١ \in س$ ، $٢ \in ص$ اكتب بيان $ك$ ومثلها بمخطط سهمي وبين أن $ك$ دالة من $س$ إلى $ص$ وأوجد مداها.

(ب) إذا كانت : $ص \propto س$ وكانت $ص = ٣$ عندما $س = ٤$

أوجد : (أ) العلاقة بين $ص$ ، $س$ (ب) قيمة $ص$ عندما $س = \frac{٣}{٤}$

امتحانات الجبر والإحصاء

٤ (١) أوجد العدد الموجب الذي إذا أُضيف مربعه إلى حدي النسبة ٧ : ١١ فإنها تصبح ٢ : ٣

(ب) مثل بيانياً منحنى الدالة $د$ حيث $د(س) = س^2 - ٤$ متخذاً من $[-٣، ٣]$

ومن الرسم استنتج نقطة رأس المنحنى والقيمة العظمى أو الصغرى للدالة ومعادلة محور التماثل.

٥ (١) إذا كانت : $د(س) = س^2 - ٢$ ، $س(س) = ٣$

أوجد : $د(٢\sqrt{٢}) + س(٥)$

(ب) احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم : ١١ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٧ ، ٢٠



محافظة سوهاج

١٩

أجب عن الأسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ أربعة أمثال العدد $٨^٢$ هو

(أ) ٢٢٢ (ب) $٨^٨$ (ج) ١٠٢ (د) ١٢٤

٢ إذا كان : $د(س) = ٢$ ، $ص(س) = ٩$ فإن : $د(ص) = \dots\dots\dots$

(أ) ٦ (ب) ١٨ (ج) ١١ (د) ٧

٣ إذا كان : $٣\sqrt{٢} - س = ١$ (حيث $س \in ح$) فإن : $س = \dots\dots\dots$

(أ) ٣ (ب) $٣\sqrt{٢}$ (ج) $٣ -$ (د) $٣\sqrt{٢}$

٤ إذا كانت : ٨ ، ٦ ، $س$ ، ١٢ كميات متناسبة فإن : $س = \dots\dots\dots$

(أ) ٤ (ب) ١٦ (ج) ٥ (د) ٢٥

٥ إذا كان الوسيط للقيم : $٢ + ١$ ، $٢ + ١$ ، $٤ + ١$ (حيث $١ \in ص$) هو ٨

فإن : $١ = \dots\dots\dots$

(أ) ٢ (ب) ٥ (ج) ٣ (د) ٤

٦ من مقاييس التشتت

(أ) الوسيط ، (ب) المنوال ، (ج) المدى ، (د) الوسط الحسابي



٢ (١) إذا كان : $s \times v = \{ (١, ١), (٢, ١), (٥, ١) \}$

أوجد : s, v ٢ $s \times v =$

(ب) إذا كانت : $\frac{s}{v} = \frac{2}{3}$ أوجد قيمة : $\frac{s+2}{v-6}$

٣ (١) إذا كانت : $s = \{ ٠, ١, ٢, ٣ \}$ ، $v = \{ ٢, ٣, ٤, ٥, ٦ \}$

وكانت g علاقة من s إلى v حيث « g » تعني أن « $g = b + a = ٥$ »

لكل $a \in s, b \in v$

١ اكتب بيان g ومثلها بمخطط سهمي.

٢ بين أن g دالة من s إلى v وأوجد مداها.

(ب) أوجد العدد الذي إذا أضيف إلى حدى النسبة ٧ : ١١ فإنها تصبح ٢ : ٣

٤ (١) إذا كانت النقطة (٢، ٤) تقع على الخط المستقيم : $v = ٤ - s = ٥$ فأوجد : قيمة f

(ب) إذا كانت : $s \propto v$ وكانت : $v = ٦$ عندما $s = ٢$

فأوجد : ١ العلاقة بين s, v ٢ قيمة s عندما $v = ٥$

٥ (١) مثل بياناً الدالة $d : s \rightarrow v$ = $s - ٢ + ٤$ متخذاً $s \in [١, ٥]$

ومن الرسم استنتج : ١ إحداثي رأس المنحنى. ٢ معادلة محور التماثل.

(ب) احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم الآتية : ١٢، ١٣، ١٦، ١٨، ٢١



محافظة قنا

٢٠

أجب عن الأسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان : $s = ٥ = ٥$ فإن : $s \propto$

(١) s^3 (ب) s (ج) $٥s$ (د) s^0

٢ $3\sqrt{2} + 3\sqrt{2} + 3\sqrt{2} =$

(١) ٣ (ب) ٩ (ج) $3\sqrt{2}$ (د) ٢٧

٣ الوسط المتناسب بين العددين ٣، ١٢ هو

(١) ٦ (ب) ٦- (ج) $6 \pm$ (د) ٩

٤ النقطة (٢، ٣) تقع في الربع

(١) الأول. (ب) الثاني. (ج) الثالث. (د) الرابع.

٥ جميع الدوال المعرفة بالقواعد الآتية كثيرات حدود عدا الدالة

(١) د (س) = $s^2 + s^2 + ٢$ (ب) د (س) = $s^2 + \frac{1}{s} + ٧$

(ج) د (س) = $٥ - s^2$ (د) د (س) = $s^2 (٣ - s)$

٦ المدى لمجموعة القيم : ٥١، ٢٤، ٤٣، ٥٥، ٢٨ هو

(١) ٥٥ (ب) ٢٤ (ج) ٢١ (د) ٣١

٢ (١) إذا كانت : $s = \{ ١, ٣, ٤, ٥ \}$ ، $v = \{ ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧ \}$

وكانت g علاقة من s إلى v حيث « g » تعني أن « $g = b + a = ٧$ »

لكل $a \in s, b \in v$ ، اكتب بيان g ومثلها بمخطط سهمي.

هل g دالة أم لا مع ذكر السبب ؟ وإذا كانت دالة فأوجد المدى.

(ب) إذا كانت b وسطاً متناسباً بين : a, c ، فأثبت أن : $\frac{1}{a} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$

٣ (١) إذا كانت : د (س) = $s^2 - ٣s$ ، ق (س) = $s - ٢$

١ أوجد : د $(\sqrt{2}) + ٣ + (\sqrt{2})$ ٢ أثبت أن : د (٣) = ق (٣)

(ب) أوجد العدد الذي إذا أضيف إلى حدى النسبة ٧ : ١١ فإنها تصبح ٢ : ٣

٤ (١) إذا كان : $٥ = ٣ = b$ فأوجد قيمة المقدار : $\frac{s+9}{s-2} + \frac{s+7}{s+4}$

(ب) فيما يلي التوزيع التكراري لأعمار ١٠ أطفال :

| العمر بالسنوات | ٥ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٢ | المجموع |
|----------------|---|---|---|----|----|---------|
| عدد الأطفال | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١٠ |

احسب الانحراف المعياري للعمر بالسنوات.

٥ (١) إذا كانت $s \propto s$ وكانت : $v = ٤٠$ عندما $s = ١٤$

فأوجد : s عندما $v = ٨٠$



(ب) مثل بيانيًا الدالة د : د (س) = ٢ - ٣ - ٤ ، خذ $\exists [-٢ ، ٢]$

ومن الرسم البياني أوجد :

١ رأس المنحنى. ٢ معادلة خط التماس.

٣ القيمة العظمى أو القيمة الصغرى للدالة.



محافظة الأقصر

٢١

أجب عن الأسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ مجموع عوامل العدد ١٥ يساوى

(١) ٣ (ب) ٤ (ج) ١٥ (د) ٢٤

٢ إذا كانت د (س) = ٤ س + ١ وكانت د (٢) = ١٥ فإن : ١ =

(١) ٢ (ب) ٤ (ج) ٧ (د) ١٥

٣ المقدار الأصغر عندما س = ٧ هو

(١) $\frac{٦}{س}$ (ب) $\frac{٦}{س+١}$ (ج) $\frac{٦}{س-١}$ (د) $\frac{س}{٦}$

٤ الثالث المتناسب للعددين ٦ - ١٢ هو

(١) ٢٤ (ب) ٦ (ج) ١٨ (د) ٧٢

٥ إذا كان : ٣ س - ١ = ١ - ٣ س فإن : س =

(١) صفر (ب) $\frac{١}{٣}$ (ج) ١ - (د) ٣

٦ أى من القيم الآتية للعدد س تجعل مدى مجموعة القيم : س ، ١٥ ، ٢٠ ، ٢٤

يساوى ١٤ ؟

(١) ٢٠ (ب) ٢٥ (ج) ١٩ (د) ١٠

٢ (١) إذا كان بيان الدالة د = { (١ ، ٣) ، (٢ ، ٥) ، (٣ ، ٧) ، (٤ ، ٩) ، (٥ ، ١١) } : ١

اكتب : ١ مجال الدالة د ٢ مدى الدالة د ٣ قاعدة الدالة د

(ب) عددان صحيحان النسبة بينهما ٢ : ٣ إذا طرح من كل منهما ٧ أصبحت النسبة ١ : ٢

فلأوجد العددين.

٣ (١) إذا كانت : س = { -٢ ، ٢ ، ٥ } ، ص = { ٣ ، ٧ ، ١ } : ١

وكانت د دالة من س إلى ص حيث «أ» د «ب» تعنى «ب = أ - ١»


لكل ١ س ، ب ٢ س

١ أوجد قيمة ل ٢ اكتب بيان د

٣ مثل الدالة د بمخطط سهمى.

(ب) إذا كانت : ص = ٩ - ١ وكانت ص ١٠ $\frac{١}{س}$ وكانت ١٨ = ١ عندما س = $\frac{٢}{٣}$

أوجد العلاقة بين س ، ص ثم استنتج قيمة ص عندما س = ١



٤ (١) الشكل المقابل يمثل الدالة د

حيث د (س) = ٤ - ٢ س

أوجد إحداثي كل من النقطتين ١ ، ب

ومساحة Δ أ ب

(ب) إذا كانت : $\frac{س}{٣} = \frac{ص}{٧}$

أثبت أن : (٢ س - ٢ ص) ، (س + ٢ ص) ، ١٠ ، ٢٦ متناسبة.

٥ (١) احسب الانحراف المعياري لمجموعة القيم : ٧٢ ، ٥٣ ، ٦١ ، ٧٠ ، ٥٩

(ب) مثل بيانيًا الدالة د حيث د (س) = ١ - ٤ س + س^٢ متخذًا س $\exists [٤ ، ٠]$

ومن الرسم أوجد : ١ إحداثي رأس المنحنى. ٢ معادلة محور التماس.

٣ القيمة العظمى أو الصغرى للدالة.

محافظة أسوان

٢٢

أجب عن الأسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : س = { ١ ، ٢ } ، ص = { ٠ } : ١

فإن : د (س × ص) =

(١) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

(ب) التوزيع التكراري التالي يبين عدد أطفال بعض الأسر في إحدى المدن الجديدة :

| | | | | | |
|-------------|-----|----|----|----|---|
| عدد الأطفال | صفر | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
| عدد الأسر | ٨ | ١٦ | ٥٠ | ٢٠ | ٦ |

احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعدد الأطفال.



محافظة الوادي الجديد

٢٣

أجب عن الأسئلة الآتية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : $\sqrt{16} = \sqrt{x}$ فإن : $x =$
 (أ) ٤ (ب) ٨ (ج) ١٦ (د) ٦٤

٢ إذا كانت : ٢ ، ٤ ، ٦ متناسبة فإن : $x =$
 (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٥ (د) ٨

٣ إذا كانت : $x = 2$ فإن : $x \times x =$
 (أ) $\frac{1}{x}$ (ب) x (ج) $x + 2$ (د) $x - 2$

٤ $x^2 - 1 = 0$ عندما $x \supseteq$
 (أ) ٥ (ب) $x - 5$ (ج) $\{0\}$ (د) $\{5\}$

٥ الوسط المتناسب بين العددين ٣ ، $\frac{1}{3}$ هو
 (أ) $1 \pm$ (ب) ٩ (ج) $\frac{1}{9}$ (د) $9 \pm$

٦ إذا كان : $\overline{(x - 2)} = 36$ لمجموعة من القيم عندها ٩ فإن الانحراف المعياري =
 (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٦

٢ (١) إذا كانت : $\{2, 2\} = S$ ، $\{2, 4, 5\} = T$ فإن : $S \cap T =$
 (أ) $S \times T$ (ب) $S \cup T$ (ج) $S \cap T$ (د) $S \setminus T$

أوجد : $S \times T$ ومثلها بمخطط سهمي.

(ب) إذا كانت : $x^2 - 14x + 49 = 0$ فأثبت أن : $x \supseteq 7$

٢ $(2 - \sqrt{5})(2 + \sqrt{5}) =$
 (أ) ٥ (ب) ٣ (ج) ٢ (د) ١

٣ المدى لمجموعة القيم : ١٦ ، ٣٢ ، ٥ ، ٢٧ ، ٢٠ هو
 (أ) ٢٧ (ب) ٢٠ (ج) ١٦ (د) ١٣

٤ الثالث المتناسب للأعداد ٨ ، ٦ ، ... ، ١٢ هو
 (أ) ٢٤ (ب) ٢٠ (ج) ١٦ (د) ٨

٥ إذا كانت : $x = 3$ ، $x = 5$ فإن : $x =$
 (أ) ١٣٥ (ب) ١٢٥ (ج) ١١٥ (د) ٩٥

٦ إذا كانت : $x = 12$ فإن : $x = 10$
 (أ) ١٢ (ب) ٢٢ (ج) ٢٤ (د) ٣٤

٢ (١) إذا كان : $S \times T = \{(2, 2), (2, 5), (5, 2)\}$ فإن : $S =$
 (أ) $\{2, 5\}$ (ب) $\{2, 2\}$ (ج) $\{5, 5\}$ (د) $\{2, 5, 2\}$

أوجد : $S \cap T$

(ب) إذا كانت : S وسطاً متناسباً بين A ، B فأثبت أن : $\frac{A}{B} = \frac{B}{A+B}$

٣ (١) إذا كانت : $S = \{2, 3, 5\}$ ، $T = \{4, 6, 8, 10\}$ فإن : $S \cap T =$
 (أ) $\{2, 3, 5\}$ (ب) $\{4, 6, 8, 10\}$ (ج) $\{2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$ (د) $\{2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$

وكانت G علاقة معرفة من S إلى T حيث « G » تعني أن « $2 = 4$ »
 لكل $A \in S$ ، $B \in T$ فإن : $A \in G(B)$

١ اكتب بيان G ومثلها بمخطط سهمي.

(ب) إذا كانت S تتغير عكسياً مع T وكانت : $x = 2$ عندما $x = 4$

أوجد العلاقة بين S ، T ثم أوجد S عندما $x = 16$

٤ (١) إذا كانت : $(2, 4)$ تقع على الخط المستقيم الممثل للدالة : $y = x + 2$

حيث $x = 4$ ، $y = 6$ أوجد : قيمة x

(ب) إذا كانت : $\frac{1}{x} = \frac{2}{y} = \frac{3}{z}$ أوجد : قيمة x

٥ (١) مثل بياناً منحنى الدالة $y = (x - 2)^2$ متخذاً $S \supseteq [0, 6]$

ومن الرسم استنتج نقطة رأس المنحنى والقيمة الصغرى أو العظمى للدالة ومعادلة محور التماثل.



٣ (١) أوجد العدد السالب الذي إذا أضيف مربعه إلى كل من حدى النسبة ١١ : ٧

فإنها تصبح ٤ : ٥

(ب) إذا كانت $s = \{2, 4, 8\}$ وكانت : g علاقة على s حيث « g »
تعنى « g ضعف s » لكل $s \in s$ ، $s \in s$ ، اكتب بيان g وهل g دالة ؟ ولماذا ؟

٤ (١) إذا كانت : $\frac{1}{4} = \frac{3}{4} = \frac{5}{4} = \frac{7}{4}$

فأوجد قيمة كل من : ١ s

(ب) إذا كانت $d : c \leftarrow c$ ، $d = (s) = 2 - 3$

فأوجد : قيمة g إذا كان : ١ $d = (g) = 0$ ٢ $(2, g) \in$ بيان الدالة d

٥ (١) التوزيع التكرارى التالى يبين عدد أطفال لبعض الأسر فى إحدى المدن الجديدة :

| | | | | | |
|-----------------|---|----|----|----|----|
| عدد الأطفال s | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ١١ |
| عدد الأسر g | ٣ | ١٢ | ٢١ | ١٠ | ٤ |

احسب الوسط الحسابى والانحراف المعيارى لعدد الأطفال.

(ب) مثل بيانياً منحنى الدالة d حيث $d = (s) = (1 + s)^2$ متخذاً $s \in [-2, 1]$

ومن الرسم استنتج :

١ نقطة رأس المنحنى.

٢ معادلة محور التماثل.

٣ القيمة الصغرى للدالة.



محافظة جنوب سيناء

أجب عن الاسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ الدالة $d : d = (s) = 2 - 3s + 5$ كثيرة حدود من الدرجة

(١) الرابعة. (ب) الثالثة. (ج) الثانية. (د) الأولى.

٢ الرابع المتناسب للكميات : ٢ ، ٦ ، ٦ هو

(١) ٩ (ب) ١٢ (ج) ٦ (د) ١٦

٣ إذا كان : $s = (3) = 0$ ، $s = (s \times s) = 10$ فإن : $s = (s) =$

(١) ٢٠ (ب) ١٠ (ج) ٣ (د) ٢

٤ الوسط الحسابى للقيم : ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٧ يساوى

(١) ٤٠ (ب) ٢٠ (ج) ١٠ (د) ٥

٥ إذا كانت : $s = 2 + 4s = 4s$ فإن :

(١) $s \times s$ (ب) $s \times s^2$ (ج) $s \times s$ (د) $s \times \frac{1}{s}$

٦ إذا كانت : f عدداً فردياً فإن العدد الفردى التالى له هو

(١) f^2 (ب) $f^2 + f$ (ج) $f + 6$ (د) $f + 2$

٢ إذا كانت : $s = \{2, 2, 4\}$ ، $s = \{s : s \geq 2, s < 9\}$

حيث s مجموعة الأعداد الطبيعية ، وكانت g علاقة من s إلى s حيث « g »

تعنى « g » $\frac{1}{s} = s$ لكل $s \in s$ ، $s \in s$

اكتب بيان g ، وهل g دالة من s إلى s ؟ وأوجد مداها.

٣ (١) أوجد العدد الذى إذا أضيف إلى حدى النسبة ١١ : ٧ أصبحت ٢ : ٣

(ب) إذا كانت $s \times s = 14$ ، وكانت : $s = 14$ عندما $s = 42$

أوجد علاقة بين s ، s ، ثم أوجد قيمة s عندما $s = 60$

٤ (١) مثل بيانياً الدالة $d : c \leftarrow c$ حيث $d = (s) = 2 - 3$

(ب) إذا كانت s وسطاً متناسباً بين ١ ، ٢ فاثبت أن : $\frac{1}{s} = \frac{1}{s} = \frac{1}{s}$

٥ (١) إذا كان : $(s^2, s + 1) = (27, \sqrt{125})$ فأوجد : قيمة كل من s ، s

(ب) احسب الوسط الحسابى والانحراف المعيارى للبيانات الآتية : ٢٠ ، ١٧ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ١٨



محافظة شمال سيناء

٢٥

أجب عن الأسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت: د (س) = ٥ فإن د (٥) + د (٥) =
 (أ) صفر (ب) ٥ (ج) -٥ (د) ١٠

٢ إذا كان: (س - ٢) = (٣، ٥) فإن س =
 (أ) ٥ (ب) ٣ (ج) ٧ (د) ٨

٣ إذا كانت: ف عدداً فردياً فإن العدد الفردي التالي له هو
 (أ) ٢ (ب) ٦ (ج) ٢ + ف (د) ١ + ٢ ف

٤ الرابع المتناسب للكميات ٤، ٨، ٨ هو
 (أ) ٤ (ب) ٨ (ج) ١٢ (د) ١٦

٥ مجموع الجذرين التربيعين للعدد $\frac{1}{4}$ هو
 (أ) $\frac{1}{4}$ (ب) صفر (ج) $\frac{1}{2}$ (د) $\frac{1}{4}$

٦ الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة لمجموعة من البيانات هو
 (أ) المدى (ب) الوسط الحسابي (ج) الوسيط (د) الانحراف المعياري

٢ (١) إذا كانت: س = {١، ٢، ٣} ، ص = {١، $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ }
 وكانت ك علاقة معرفة من س إلى ص حيث «ك س»
 تعني أن «ك هو المعكوس الضربي للعدد س» لكل $س \in ص$ ، $س \in ص$
 اكتب بيان ك ومثلها بمخطط سهمي. هل ك دالة أم لا ؟
 (ب) إذا كانت ص $\propto \frac{1}{س}$ وكانت: ص = ٣ عندما س = ٢
 أوجد العلاقة بين س ، ص

٢ أوجد قيمة ص عندما س = ١، ٥

امتحانات الجبر والإحصاء

٣ (١) إذا كانت الدالة د حيث د (س) = ٥ س + ٤ يمثلها بيانياً خط مستقيم يمر بالنقطة (٣، ب) فأوجد: قيمة ب

(ب) إذا كانت: $\frac{س}{٤} = \frac{٢}{٤}$ فأوجد قيمة المقدار: $\frac{٣س + ٥}{س + ٥}$

٤ (١) إذا كان: س × ص = -١ فإن: (١، ٢)، (٢، ٤)، (٢، ٥)
 فأوجد كلاً من: س، ص، ص

(ب) إذا كانت: ب وسطاً متناسباً بين ٢، ح أثبت أن: $\frac{٢ - ح}{٢} = \frac{٢ - ٥}{٢}$

٥ (١) احسب الانحراف المعياري لمجموعة القيم: ١٢، ١٣، ١٦، ١٨، ٢١

(ب) مثل بيانياً د: د (س) = ٢ - س متخذاً س $\in [-٣، ٣]$
 ومن الرسم استنتج:

١ إحداثي رأس المنحنى. ٢ معادلة محور التماثل.

٣ القيمة العظمى أو الصغرى للدالة.

محافظة البحر الأحمر

٢٦

أجب عن الأسئلة الآتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت النقطة (٢ - ٣، ٥) تقع على محور الصادات فإن: ٢ =
 (أ) ٥ (ب) ٣ (ج) ٢ (د) صفر

٢ إذا كانت: ٢، ٣، ٦، س كميات متناسبة فإن س =
 (أ) ٩ (ب) ١٨ (ج) ١٢ (د) ٣

٣ المدى لمجموعة القيم: ٣، ٥، ٦، ٧، ٩ يساوي
 (أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ١٢

٤ إذا كانت: د (س) = ٣ فإن د (٥) + د (٥) =
 (أ) ١ - (ب) صفر (ج) ١ (د) ٦



محافظة مطروح

٢٧

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : ١ ، ب ، ٢ ، ٣ كميات متناسبة فإن : $\frac{1}{3} = \dots$ (أ) $\frac{3}{4}$ (ب) $\frac{3}{2}$ (ج) $\frac{2}{3}$ (د) $\frac{4}{3}$ ٢ $[4, 1] - [4, 1] = \dots$ (أ) $\{0\}$ (ب) $\{4, 1\}$ (ج) $[4, 1]$ (د) \emptyset ٣ إذا كان : $(5, 2) \in \{2, 2\} \times \{1, 1\}$ فإن : \dots

(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ١ (د) ٥

٤ إذا كان : $(س - ١, ٢) = (٨, ١)$ فإن : $(س, ص) = \dots$ (أ) $(٣, ٢)$ (ب) $(٢, ٣)$ (ج) $(٣, ٠)$ (د) $(٣, -٠)$ ٥ النقطة $(٣, -٤)$ تقع في الربع

(أ) الأول. (ب) الثاني. (ج) الثالث. (د) الرابع.

٦ إذا كان : $مح (س - س) = ٣٦$ لمجموعة من القيم عددها يساوي ٩فإن : $\dots = ٥$

(أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ١٨ (د) ٢٧

٢ (١) إذا كانت : $س = \{١, ٢, ٣\}$ ، $ص = \{١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧, ٨, ٩, ١٠\}$ وكانت $ع$ علاقة من $س$ إلى $ص$ حيث « $ع$ » تعني أن « $١ = \frac{1}{3}$ »لكل $١ \in س$ ، $٢ \in ص$ اكتب بيان $ع$ ، هل $ع$ دالة أم لا ؟ وإذا كانت دالة اكتب مداها.(ب) إذا كانت : $\frac{1}{3} = \frac{2}{5}$ أوجد قيمة : $\frac{٢-١٧}{٢+١٣}$ ٣ (١) إذا كان : $س \times ص = \{(١, ١), (٣, ١), (٥, ١)\}$ أوجد : ١ $س$ ، $ص$ ٢ $ص$ ٥ إذا كانت : $س - ص = ٥$ ، $س + ص = ١$ فإن : $س - ص = ٢$ =(أ) $\frac{1}{20}$ (ب) ١ (ج) ٥ (د) ٢٥٦ إذا كان : $س = ٧$ فإن : $ص = ٣٥$ (أ) $\frac{1}{س}$ (ب) $س - ٧$ (ج) $س + ٧$ (د) $س$ ٢ (١) إذا كان : $س \times ص = \{(١, ١), (١, ٥), (١, ٧)\}$ أوجد :١ $س$ ٢ $ص$ (ب) $س$ ٣ $س \times ص$ (ب) إذا كانت $ب$ وسطاً متناسباً بين ١ ، ٢ ، ٣ أثبت أن : $\frac{1}{ب} = \frac{٢+٣}{٢+٣}$ ٣ (١) إذا كانت $د (س) = ٤ + س$ ، $د (٢) = ١٥$ أوجد : قيمة ١ (ب) إذا كانت : $س = \{١, ٢, ٣\}$ ، $ص = \{١, ٢, ٣, ٤, ٥\}$ ، $ع$ علاقةمن $س$ إلى $ص$ حيث « $ع$ » تعني « $١ + ب = ٥$ » لكل $١ \in س$ ، $٢ \in ص$ ٢ اكتب بيان $ع$ ومثلها بمخطط بياني. ٣ هل $ع$ دالة أم لا ؟٤ (١) إذا كانت : $\frac{2}{3} = \frac{س}{ص}$ أوجد قيمة : $\frac{٢+س}{٢-ص}$ (ب) إذا كانت $ص = ٣٥$ وكانت : $ص = ٢$ عندما $س = ٦$ أوجد :١ العلاقة بين $ص$ ، $س$ ٢ قيمة $ص$ عندما $س = ١٥$ ٥ (١) مثل بياناً منحنى الدالة $د$ حيث $د (س) = ٤ - س$ متخذاً $س \in [٢, ٢]$

ومن الرسم استنتج :

١ إحداثي نقطة رأس المنحنى. ٢ معادلة خط تماثل المنحنى.

(ب) احسب الانحراف المعياري للقيم : ١٢ ، ١٣ ، ١٦ ، ١٨ ، ٢٦



(ب) إذا كانت : $\frac{س}{س+٢٢} = \frac{ص}{س-٢} = \frac{ع}{٢-ع}$
 أثبت أن : $\frac{٢+س+ص}{س-٤+٢٤} = \frac{٢+س+ص}{س-٤+٢٤}$

٤ (١) إذا كانت النقطة (٢، ٣) تقع على الخط المستقيم الممثل للدالة د : $ع ← ع$

حيث د (س) = ٤ - س - ٥ أوجد : قيمة ؟

(ب) التوزيع التكراري التالي يبين عدد أطفال بعض الأسر في إحدى المدن الجديدة :

| عدد الأطفال | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|-------------|---|----|----|----|---|
| عدد الأسر | ٨ | ١٦ | ٥٠ | ٢٠ | ٦ |

احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعدد الأطفال.

٥ (١) إذا كانت : ص تتغير عكسياً مع س وكانت : ص = ١٠ عندما س = ٣

أوجد العلاقة بين س ، ص ثم أوجد قيمة ص عندما س = ٥

(ب) مثل بيانياً منحنى الدالة د حيث د (س) = (٣ - س)² متخذاً س ∈ [٠، ٦]

ومن الرسم استنتج نقطة رأس المنحنى والقيمة العظمى أو الصغرى للدالة.

امتحانات المحافظات فى حساب المثلثات والهندسة



محافظة القاهرة

١

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان : $\vec{AB} \perp \vec{CD}$ ، وكان ميل $\vec{AB} = \frac{1}{4}$ فإن : ميل $\vec{CD} = \dots\dots\dots$

(أ) ٢ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $\frac{1}{4}$ (د) ٢-

٢ عدد محاور تماثل المثلث المتساوى الساقين يساوى

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

٣ 60° ط $30^\circ = \dots\dots\dots$

(أ) 30° (ب) 30° (ج) 45° (د) 60°

٤ مجموع قياسات الزوايا الداخلة للشكل الرباعى يساوى

(أ) 540° (ب) 360° (ج) 180° (د) 90°

٥ معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢ ، ٣) ويوازي محور السينات هى

(أ) $س = ٢$ (ب) $س = ٣$ (ج) $ص = ٢$ (د) $ص = ٣$

٦ محيط المربع الذى مساحته ١٠٠ سم^٢ يساوى سم.

(أ) ١٠ (ب) ٢٠ (ج) ٤٠ (د) ٥٠

٢ (أ) إذا كانت : $س = ٤٥^\circ$ ما $٤٥^\circ = ٣٠^\circ$ أوجد : قيمة $س$ (موضحًا خطوات الحل)

(ب) أوجد معادلة الخط المستقيم الذى ميله ٢ ويمر بالنقطة (١ ، ٠)


٣ (أ) $س = ٤$ $ص = ٦$ $ع = ٨$ سم ، أوجد قيمة المقدار : $س + ص - ع$

(ب) $س = ٤$ $ص = ٢$ $ع = ٠$ ، أوجد قيمة المقدار : $س + ص - ع$

(ج) $س = ٤$ $ص = ٢$ $ع = ٠$ ، أوجد قيمة المقدار : $س + ص - ع$

(د) $س = ٤$ $ص = ٢$ $ع = ٠$ ، أوجد قيمة المقدار : $س + ص - ع$

امتحانات حساب المثلثات والهندسة



٤ (أ) فى الشكل المقابل :

أب ح د مستطيل فيه : $أب = ١٥$ سم

، $أد = ٢٥$ سم

أوجد : (أ) طول $أب$

(ب) $س + ص$ (د) $أد$ ح د

(ج) مساحة المستطيل $أب ح د$

(ب) إذا كانت : ح د (٦ ، ٤) هى نقطة منتصف $أب$ حيث $أ (٥ ، ٣)$

أوجد إحداثى نقطة ب

٥ (أ) إذا كان المستقيم الذى معادلته : $س + ٢ ص - ٧ = ٠$ يوازي المستقيم الذى يصنع

زاوية قياسها ٤٥° مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. أوجد : قيمة ؟

(ب) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطتين (٤ ، ٢) ، (٢ ، ١) ثم أثبت أن المستقيم

يمر بنقطة الأصل.

محافظة الجيزة

٢

أجب عن الأسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : ما $س = \frac{1}{4}$ حيث $س$ زاوية حادة فإن : ما $٢ ص = \dots\dots\dots$

(أ) $\frac{1}{4}$ (ب) ١ (ج) $\frac{1}{4}$ (د) $\frac{3}{4}$

٢ بُعد النقطة (٤ ، ٣) عن المحور الصادى يساوى وحدة طول.

(أ) ٢- (ب) ٤- (ج) ٢ (د) ٤

٣ النقط : (٠ ، ٨) ، (٠ ، ٠) ، (٦ ، ٠) ، (٠ ، ٠)

(أ) تكون مثلثًا قائم الزاوية. (ب) تكون مثلثًا منفرج الزاوية.

(ج) تكون مثلثًا حاد الزوايا. (د) تقع على استقامة واحدة.

محافظة الإسكندرية

٣


أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) إذا كان : $\vec{AB} // \vec{CD}$ وكان ميل $\vec{AB} = \frac{2}{3}$ فإن ميل \vec{CD} =

- (أ) $\frac{2}{3}$ (ب) $\frac{3}{2}$ (ج) $-\frac{2}{3}$ (د) $-\frac{3}{2}$

٢) في الشكل المقابل :



أ ب ح مثلث متساوي الساقين قائم الزاوية في أ

فإن : طاح =

- (أ) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ (ب) $\frac{1}{3\sqrt{2}}$ (ج) ١ (د) $\frac{1}{3}$

٣) لأى زاويتين حادتين أ ب إذا كان : $\sin(أ) + \sin(ب) = 90^\circ$

، $\sin(أ) \neq \sin(ب)$ فإن :

- (أ) ما أ = ما ب (ب) ما أ = ما ب (ج) ط أ = ط ب (د) ما أ = ما ب

٤) دائرة مركزها نقطة الأصل وطول نصف قطرها يساوى ٢ وحدة طول

فإن النقطة تنتمى إليها .

- (أ) $(-1, 2)$ (ب) $(2, -5\sqrt{2})$ (ج) $(0, 1)$ (د) $(\sqrt{3}, 1)$

٥) إذا كان : $\sin(دس) = \sin(دس)$ ، حيث دس ، دس متكاملتان

فإن : $\sin(دس) = \sin(دس)$ =

- (أ) ٣٠ (ب) ٤٥ (ج) ٦٠ (د) ٩٠

٦) متوازي الأضلاع الذى قطراه متساويان فى الطول ومتعامدان يكون

- (أ) مربعاً . (ب) معيناً . (ج) مستطيلاً . (د) شبه منحرف .

٧) أوجد قيمة س التى تحقق : $\sin 30^\circ + \sin 45^\circ = \sin 60^\circ$

(ب) أ ب ح د متوازي أضلاع فيه : أ (٢، ٣) ، ب (٤، -٥) ، ح (٠، -٣)


أوجد إحداثى نقطة تقاطع قطريه ثم أوجد إحداثى نقطة د

٨) إذا كانت : أ (٥، ٧) ، ب (١، -١) فإن نقطة منتصف \vec{AB} هى

- (أ) (٢، ٣) (ب) (٣، ٣) (ج) (٣، ٢) (د) (٢، ٣)

٩) معادلة المستقيم الذى يمر بالنقطة (١، -٣) ويوازي محور السينات هى

- (أ) $x = 3$ (ب) $x = 1$ (ج) $x = -3$ (د) $x = -2$



١٠) الشكل المقابل يمثل ربع دائرة طول نصف قطرها ٢ سم

فإن محيط الشكل يساوى سم .

- (أ) 2π (ب) 5π (ج) $4 + \pi$ (د) $4 + \pi$

١١) أوجد معادلة المستقيم الذى ميله ٢ ويمر بالنقطة (١، -١)

(ب) أ ب ح مثلث قائم الزاوية فى ح فيه : أ ح = ٢ سم ، ب ح = ٤ سم

أوجد : (أ) ما أ ما ب - ما أ ما ب (ب) $\sin(دس)$

١٢) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن : $\sin 60^\circ = 2 \sin 30^\circ \cos 30^\circ$

(ب) إذا كان المستقيم ل يمر بالنقطتين (٣، ١) ، (٢، ٤) والمستقيم ل يمر ب

الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 45° أوجد : قيمة ل إذا كان : ل \perp ل

١٣) إذا كانت : ما ه ط ما ٣٠ = ما ٤٥ فـأوجد : $\sin(د ه)$ حيث ه زاوية حادة.

(ب) بين نوع المثلث الذى رؤوسه النقط : أ (٢، ٣) ، ب (١، ٥) ، ح (١، ٣)

من حيث أطوال أضلاعه.

١٤) أوجد ميل المستقيم : $5x + 4y = 10$

ثم أوجد طول الجزء المقطوع من محور الصادات.

(ب) أثبت أن النقط : أ (٣، -١) ، ب (٤، ٦) ، ح (٢، -٢) الواقعة فى

مستوى إحداثى متعامد تمر بها دائرة واحدة مركزها م (١، -٢)

ثم أوجد مساحة الدائرة.

٣ (١) أثبت أن النقط : ١ (٣ ، -١) ، ٢ (٤ ، -٦) ، ٣ (٢ ، -٢) تقع على دائرة مركزها النقطة م (١ ، ٢) ثم أوجد محيط الدائرة (علمًا بأن $\pi = 3.14$)


(ب) أوجد معادلة الخط المستقيم العمودي على المستقيم : $3x + 2y + 5 = 0$ ويقطع جزءًا موجبًا من محور الصادات مقداره ٧ وحدات.

٤ (١) أثبت أن المستقيم الذي يمر بالنقطتين (٣ ، -٢) ، (٤ ، ٥) يوازي المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 45°

(ب) ١ ب مثلث قائم الزاوية في ح فيه : ٢ ح = ٦ سم ، ٣ ح = ٨ سم أوجد قيمة : ١ ما ٢ ما ٣ ما

٥ (١) إذا كانت : ١ (٤ ، -٦) ، ٢ (٣ ، ٧) ، ٣ (١ ، -٣) فأوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة ١ ، وينقطة منتصف ٢

(ب) في الشكل المقابل :



١ ب ح مستطيل فيه : ١ ب = ١٥ سم

٢ ح = ٢٥ سم

أوجد : ١ ب (د ١ ح ب)

٢ مساحة سطح المستطيل ١ ب ح



محافظة القليوبية

٤

أجب عن الأسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : $\sin A = \frac{1}{2}$ حيث $\frac{\pi}{2} < A < \pi$ قياس زاوية حادة موجبة فإن : $\cos A =$

(١) ٣٠ (ب) ٩٠ (ج) ٦٠ (د) ١٢٠

٢ مثلث مساحته ٢٤ سم^٢ وارتفاعه ٨ سم

فإن طول قاعدته المناظرة لهذا الارتفاع = سم.

(١) ١٦ (ب) ٦ (ج) ٣ (د) ٢

٣ إذا كان : ح يوازي محور الصادات حيث ح (٤ ، ٤) ، د (٥ ، -٧) فإن : ح =

(١) ٥ (ب) ٧ (ج) -٥ (د) ٤

٤ معادلة الخط المستقيم المار بنقطة الأصل وميله ١ هي

(١) $\sin = \cos$ (ب) $\sin = -\cos$ (ج) $\sin = 2\cos$ (د) $\sin = -2\cos$

٥ إذا كانت النقطة (٠ ، ١) تنتمي للمستقيم : $3x - 4y + 12 = 0$ فإن :

فإن : ١ =

(١) ٤ (ب) -٣ (ج) ٣ (د) -٤

٦ في ΔABC إذا كان : $\angle A < \angle B < \angle C$ فإن زاوية ح تكون

(١) حادة. (ب) قائمة. (ج) منفرجة. (د) مستقيمة.

٢ (١) إذا كان بُعد النقطة (س ، ٥) عن النقطة (٦ ، ١) يساوي ٢ $\sqrt{5}$ وحدة طول

فأوجد : قيمة س

(ب) بدون استخدام الحاسبة أوجد القيمة العددية للمقدار :

$\sin 45^\circ + \sin 30^\circ - \sin 60^\circ$

٣ (١) ١ ب ح متوازي أضلاع فيه : ١ (٢ ، ٣) ، ٢ (٤ ، -٥) ، ٣ (٠ ، -٢) أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطريه ، ثم أوجد إحداثي نقطة و

(ب) ١ ب ح مثلث قائم الزاوية في ب فيه : ١ ح = ١٠ سم ، ٢ ح = ٨ سم

فأثبت أن : $1 + 2 = 3$ ما ١ ح + ما ٢ ح


٤ (١) إذا كان المستقيم ل يمر بالنقطتين (١ ، ٣) ، (٢ ، ٤) ، المستقيم لم يصنع مع

الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 45° فأوجد : قيمة ل إذا كان : ل // لم

(ب) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة (١ ، ٢) وعمودي على المستقيم :

$\sin = \cos + 7$

٥ (١) في الشكل المقابل :



أ ب ح د مستطيل فيه :

أ ب = ١٥ سم ، أ ج = ٢٥ سم

أوجد : ١ (د أ ح ب)

٢ مساحة سطح المستطيل أ ب ح د

(ب) أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يقطع من محوري الإحداثيات السيني والصادي جزءين موجبين طولاهما ٤ ، ٩ وحدة طول على الترتيب.

محافظه الشرقية

٥

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : $\sin(\theta) = \frac{1}{2}$ حيث θ قياس زاوية حادة

فإن : $\cos(\theta) =$

(١) ٢٠ (ب) ٢٥ (ج) صفر (د) ٥

٢ الخط المستقيم الذي معادلته : $2x - 3y = 6$ ميله يساوى

(١) ٢ (ب) $\frac{2}{3}$ (ج) ٦ (د) $\frac{3}{2}$

٣ معادلة الخط المستقيم المار بنقطة الأصل ويميل على الاتجاه الموجب لمحور السينات بزاوية قياسها 60° هي

(١) $\sin = 3\sqrt{2}$ (ب) $\sin = 3\sqrt{2} + 2$

(ج) $\sin = 2$ (د) $\sin = 3\sqrt{2} - 2$

٤ إذا كان : أ ب ح مثلثاً قائم الزاوية في ب ، وكانت : ما أ = $\frac{2}{3}$

فإن : ما ح =

(١) $\frac{2}{3}$ (ب) $\frac{2}{3}$ (ج) $\frac{4}{3}$ (د) $\frac{5}{3}$

٥ بُعد النقطة أ (٤ ، ٢) عن نقطة الأصل يساوى وحدة طول.

(١) $2\sqrt{2}$ (ب) $2\sqrt{2}$ (ج) $2\sqrt{2}$ (د) $2\sqrt{2}$

امتحانات حساب المثلثات والهندسة

٦ إذا كان المستقيم ل ميله $\frac{1}{2}$ والمستقيم م ميله $\frac{2}{3}$ حيث : أ ب $\neq 0$ وكان ل ل م

فإن : أ ب =

(١) $\frac{2}{3}$ (ب) $\frac{2}{3}$ (ج) ١٥ (د) ١٥ -

١ بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن : $\frac{\sin 60^\circ}{\sin 40^\circ} = \frac{\sin 20^\circ}{\sin 40^\circ}$

(ب) أثبت أن النقط : أ (٣ ، ١) ، ب (٤ ، ٦) ، ج (٢ ، ٢) الواقعة في

مستوى إحداثي متعامد تمر بها دائرة واحدة مركزها النقطة م (١ ، ٢)

ثم أوجد محيط الدائرة.

٣ (١) إذا كانت : أ (١ ، ٥) ، ب (٣ ، ٧) ، ج (١ ، ٢) ثلاث نقط ليست على

استقامة واحدة أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة أ ويوازي


(ب) في الشكل المقابل :

أ ب ح مثلث متساوي الساقين حيث :

أ ب = أ ج = ١٠ سم ، ب ح = ١٢ سم

أوجد : ١ ما ب

٢ مساحة سطح المثلث أ ب ح



٤ (١) إذا كان : أ ب ح د متوازي أضلاع فيه : أ (٣ ، ٢) ، ب (٢ ، ٢) ، ج (٥ ، ١)

فأوجد : ١ إحداثي نقطة تقاطع القطرين. ٢ إحداثي نقطة و

(ب) أوجد معادلة الخط المستقيم المار بالنقطتين (٥ ، ٤) ، (٣ ، ٠)

ثم أوجد إحداثي نقطة تقاطع المستقيم مع محور السينات.

٥ (١) إذا كانت : ما س = ما ٣٠ ما ٦٠

فأوجد : قياس زاوية س (حيث س زاوية حادة) ثم أوجد : ط س

(ب) أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يقطع ٣ وحدات من الجزء الموجب لمحور الصادات

وعمودي على المستقيم : $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$

محافظة المنوفية

٦



أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : $\sin(10^\circ + \theta) = \frac{1}{2}$ فإن : $\sin(70^\circ - \theta) = \dots\dots\dots$

- (أ) $\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (ج) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (د) $\frac{1}{2}$

٢ دائرة مرسومة داخل مربع بحيث تماس أضلاعه الأربعة ، فإذا كان محيط المربع ٥٦ سم فإن مساحة سطح الدائرة سم^٢ (حيث $\pi \approx \frac{22}{7}$)

- (أ) $\frac{77}{2}$ (ب) ٧٧ (ج) ١١٢ (د) ١٥٤

٣ مضلع منتظم قياس إحدى زواياه الداخلة ١٤٤°

فإن عدد أضلاعه أضلاع.

- (أ) ٧ (ب) ٨ (ج) ٩ (د) ١٠

٤ المثلث المتساوي الساقين يمكن أن تكون أطوال أضلاعه ٤ سم ، ٩ سم ،

..... سم

- (أ) ٤ (ب) ٩ (ج) ١٣ (د) ٣٦

٥ النقطة (٢- ، ٣-) تبعد عن محور السينات وحدة طول.

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٢- (د) ٣-

٦ المستقيم الذي ميله $\frac{1}{3}$ ويقطع محور الصادات عند النقطة (صفر ، ٢) ،

فإن معادلته هي

- (أ) $2 + \frac{1}{3}x = y$ (ب) $\frac{1}{3}x = y$ (ج) $2 + \frac{1}{3}x = y$ (د) $2 + \frac{1}{3}x = y$

٢ (أ) بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد القيمة العددية للمقدار :

$$\sin 20^\circ + \sin 60^\circ - \sin 40^\circ$$

(ب) إذا كان : \overline{AB} قطرًا في الدائرة م حيث $\angle(3^\circ, 7^\circ)$ ، $\angle(1^\circ, 5^\circ)$

فأوجد : ١ مساحة سطح الدائرة م ، اعتبر $(\pi = 3.14)$

٢ إحداثي مركز الدائرة م


٣ (أ) إذا كان المثلث $\triangle ABC$ قائم الزاوية في $\angle A$ ، $\angle A = 5^\circ$ ، $\angle B = 13^\circ$ سم

فأوجد القيمة العددية للمقدار : $\sin A + \sin B$

(ب) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة $(3, 1)$ وعمودي على المستقيم المار بالنقطتين

$(1, 2)$ ، $(0, 5)$

٤ (أ) في الشكل المقابل :



$\triangle ABC$ شبه منحرف متساوي الساقين ،

مساحته = ٣٦ سم^٢ ، $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$

، $\angle A = 6^\circ$ ، $\angle B = 12^\circ$ سم

أوجد : قيمة $\sin A + \sin B$


(ب) بين نوع المثلث الذي رؤوسه $\angle(3^\circ, 1^\circ)$ ، $\angle(1^\circ, 5^\circ)$ ، $\angle(4^\circ, 6^\circ)$

بالنسبة لقياسات زواياه.

٥ (أ) أوجد الميل وطول الجزء المقطوع من محور الصادات بالمستقيم الذي معادلته :

$$4x + 5y = 10$$

(ب) في الشكل المقابل :



المستقيم \overline{AB} يمر بالنقطتين $A(2, 3)$ ، $B(6, 2)$

ويقطع محوري الإحداثيات في النقطتين α ، β


على الترتيب.

أوجد بالبرهان :

١ معادلة المستقيم \overline{AB}

٢ مساحة المثلث $\triangle OAB$ حيث O نقطة الأصل.

٤ (١) في الشكل المقابل :



المستقيم \overleftrightarrow{AB} يوازي محور الصادات والمستقيم \overleftrightarrow{BC}

معادلته : $ص - س + ٢ = ٠$ والنقطة $ب = (٢, ٤)$

أوجد : ١ طول \overline{AB}

٢ مساحة الشكل ABC

٣ $\angle C$ (د و ح ب)

(ب) $\angle B$ ح مثلث قائم الزاوية في B

١ أثبت أن : $ص^2 = س^2 + ٢^2$

٢ إذا كان : $ب = ٥$ سم ، $أ = ١٣$ سم أوجد : $\angle C$ (د ح) لأقرب دقيقة.

٥ (١) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة $(٤, ٢)$ ويصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها ١٣٥°

(ب) بدون استخدام الحاسبة أثبت أن : $٦٠^\circ - ٦٠^\circ = ٠^\circ$ ، $٦٠^\circ + ٦٠^\circ = ١٢٠^\circ$

محافظة الإسماعيلية

٩

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ عدد محاور تماثل المثلث المختلف الأضلاع يساوي

(١) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

٢ نقطة منتصف \overline{AB} حيث $أ = (٠, ٦)$ ، $ب = (٤, ٠)$ هي

(١) $(٤, ٦)$ (ب) $(٦, ٤)$ (ج) $(٢, ٣)$ (د) $(٣, ٢)$

٣ إذا كان طولا ضلعين في مثلث هما ٣ سم ، ٤ سم فإن طول الضلع الثالث يمكن

أن يساوي

(١) ١ (ب) ٦ (ج) ٧ (د) ٨

٣ إذا كان المستقيم المار بالنقطتين $(١, ٤)$ ، $(٢, ٤)$ ميله يساوي ٤٥°

فتكون $ص =$

(١) ١ (ب) ٢ (ج) ١- (د) ٤

(ب) $\angle B$ ح شبه منحرف متساوي الساقين فيه : $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ، $أ = ٤$ سم

، $ب = ٥$ سم ، $ح = ١٢$ سم أوجد قيمة المقدار : $\frac{\text{طاب ح} + \text{طاب ح} + \text{طاب ح}}{\text{طاب ح}}$

٢ (١) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان المستقيم الذي معادلته : $٢ + س + (٢ - ٢) ص = ٥$ يوازي المستقيم

المار بالنقطتين $(١, ٤)$ ، $(٢, ٥)$ فإن $أ =$

(١) ٢ (ب) ٢- (ج) ٦ (د) ٤

٢ $\angle B$ ح مثلث فيه : $\angle C = (٢٠^\circ)$ ، $\angle A = (٢٠^\circ)$ ، $\angle B = (٢٠^\circ)$

فإن : $\angle C =$ (د ح) =

(١) ٣٠ (ب) ٦٠ (ج) ٤٥ (د) ٩٠

٣ المستقيم : $ص = \frac{٣}{٢} - \frac{٣}{٢}$

يقطع من محور السينات جزءًا طوله وحدة طول.


(١) ٢ (ب) ٢ (ج) ٦ (د) ١٢

(ب) \overline{AB} قطر في دائرة مركزها $م$ ، حيث $ب = (٨, ١١)$ ، $أ = (٥, ٧)$

أوجد : ١ محيط الدائرة. ٢ معادلة المستقيم العمودي على \overline{AB} من نقطة $أ$

٣ (١) أثبت أن الشكل الرباعي $ABCD$ الذي رؤوسه :

$أ = (١, ٣)$ ، $ب = (٥, ١)$ ، $ح = (٧, ٤)$ ، $د = (١, ٦)$ متوازي أضلاع.



(ب) الشكل المقابل يمثل المستقيم \overleftrightarrow{AB}

الذي معادلته : $ص = ٤س + ٢$

ويقطع من محوري الإحداثيات جزءين متساويين

في الطول ويمر بالنقطة $(٢, ٣)$

أوجد : ١ قيمة كل من $ل$ ، $ح$


٢ مساحة المثلث ABC

٤ إذا كانت : ط ٢ سن $\frac{1}{3}$ حيث (٢ سن) قياس زاوية حادة
فإن : سن =

- (أ) ١٥ (ب) ٢٠ (ج) ٤٥ (د) ٦٠

٥ عندما تقف أمام المرآة وتظهر صورتك فإن هذا يسمى في علم الرياضيات
(أ) دوراناً. (ب) انتقالاً. (ج) انعكاساً.

٦ في الشكل المقابل :



أى مما يأتى يمثل معادلة المستقيم ل ؟

- (أ) سن = سن (ب) سن = ٢
(ج) سن + سن = ٢ (د) سن - سن = ٢


٢ (١) بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة سن إذا كان : سن م٢ = ٢٠ ط٢ = ٦٠ م٢ = ٤٥

(ب) إذا كانت : ٢ (٥ ، -١) ، ٢ (٢ ، ٧) ، ٢ (١ ، -٣)
فأوجد معادلة المستقيم الذى يمر بنقطة منتصف ب ح ، والنقطة أ

٣ (١) أثبت أن النقط : ٢ (١ ، -٢) ، ٢ (-٤ ، ٢) ، ٢ (١ ، ٦)
هى رؤوس مثلث متساوى الساقين.

(ب) أ ب ح مثلث قائم الزاوية فى ب أوجد قيمة : $\frac{أ ح}{ب ح}$
وإذا كانت : ط ا ه = $\frac{أ ح}{ب ح}$ أوجد : ح (د ه) حيث ه زاوية حادة.

٤ (١) إذا كان المستقيم ل يمر بالنقطتين (١ ، ٤) ، (٤ ، ٤) ، والمستقيم ل يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها ٤٥° أوجد قيمة أ إذا كان المستقيمان متوازيين.



(ب) فى الشكل المقابل :

أ ب ح مثلث متساوى الأضلاع ، طول ضلعه ٥ سم
، $د \in \overline{أ ب}$ بحيث $د = ١$ سم ، رسم $د ه \perp \overline{ب ح}$
أوجد : ط ا (د ح ه)


٥

(١) إذا كان : أ ب ح معيّنًا فيه : ٢ (٣ ، ٣) ، ح (٣- ، ٣-)

أوجد : ١ نقطة تقاطع القطرين. ٢ معادلة المستقيم ب ح

(ب) فى الشكل المقابل :

فى المستوى الإحداثى المتعامد رسم المثلث أ ب ح
أثبت أن : $\Delta أ ب ح$ قائم الزاوية
وأوجد مساحة سطحه.



محافظة السويس

١٠

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ $٦٠^\circ م٢ + ٦٠^\circ م٢ =$

- (أ) صفر (ب) $\frac{1}{2}$ (ج) $\frac{1}{3}$ (د) ١

٢ أ ب ح متوازي أضلاع فيه : ح (د) + ح (د ح) = ٢٠٠°

فإن : ح (د ب) =

- (أ) ٨٠° (ب) ٥٠° (ج) ١٠٠° (د) ١٦٠°

٣ فى الشكل المقابل :

معادلة المستقيم ل هى


(أ) سن = ١

(ج) سن = سن

٤ إذا كان : أ ب قياسا زاويتين متتامتين بحيث : ب = ١ : ٢

فإن : ب =

- (أ) ١٨٠° (ب) ٩٠° (ج) ٣٠° (د) ٦٠°





محافظة بورسعيد

١١

أجب عن الأسئلة الآتية:

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١ إذا كان المستقيمان اللذان ميلاهما $\frac{2}{3}$ ، $\frac{4}{5}$ متعامدين فإن: له =

(١) ٩ (ب) ٤ (ج) ٩- (د) ٤-

٢ البعد بين النقطتين (٠، ١٥)، (٠، ٦) يساوى وحدة طول.

(١) ٩- (ب) ٩ (ج) ٢ (د) ٢-

٣ أ ب ح مثلث قائم الزاوية في ح فيه: أ ب = ٢٥ سم، أ ح = ١٥ سم
فإن مساحة سطح المثلث أ ب ح = سم^٢.

(١) ٢٠٠ (ب) ٧٥ (ج) ١٥٠ (د) ٣٧٥

٤ إذا كان المستقيم ح يوازي محور الصادات حيث ح (٤، ٤)، د (٧، ٥-)
فإن: م =

(١) ٥ (ب) ٥- (ج) ٧- (د) ٧

٥ إذا كانت نقطة الأصل هي منتصف أ ب حيث أ (٢، ٥) فإن النقطة ب هي

(١) (٥، ٢) (ب) (٢، ٥) (ج) (٢، -٥) (د) (٢، ٥-)

٦ إذا كانت: ط (س + ١٠) = ٣ حيث س زاوية حادة

فإن: ن (د س) =

(١) ٤٠ (ب) ٥٠ (ج) ٦٠ (د) ٧٠

٢ (١) أثبت أن المستقيم المار بالنقطتين: (٢، ٢)، (٤، ٢) يوازي المستقيم: ٣ ص - س - ١ = ٠.

(ب) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن: ما ٦٠ ما ٣٠ ما ٩٠ ما ١ = ١

٣ (١) إذا كانت: ما ه = $\frac{٤٥}{٣٠}$ ما ه فأوجد: ن (د ه) حيث ه زاوية حادة.

٥ البعد العمودي بين المستقيمين: س - ٢ = ٠، س + ٢ = ٠ يساوى وحدة طول.

(١) ١ (ب) ٥ (ج) ٢ (د) ٣

٦ إذا كانت: ٩ (٠، ٠)، ب (٥، ٧)، ح (٥، ٥) رؤوس المثلث أ ب ح القائم الزاوية في ح فإن: ه =

(١) صفر (ب) ٥ (ج) ٧ (د) ٥-

٢ (١) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن: ما ٢ ما ٣٠ ما ٤ ما ٦٠ ما ٩٠

(ب) إذا كانت: ٩ (١-، ١-)، ب (٢، ٢)، ح (٦، ٠)، د (٣، ٤-) أربع نقط في مستوى إحداثي متعامد أثبت أن: أ ح، ب د ينصف كل منهما الآخر.

٣ (١) إذا كانت: ما ٣ س = $\frac{٣٠}{٤٥}$ ما ٦٠ ما ٩٠ ما ٤٥ ما ٦٠ فأوجد: قيمة س بالدرجات حيث ٣ س قياس زاوية حادة.

(ب) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة (١، ٢) وعمودي على الخط المستقيم المار بالنقطتين ٩ (٢، -٢)، ب (٥، ٤-)

٤ (١) أ ب ح مثلث قائم الزاوية في ح فيه: أ ب = ٥ سم، ب ح = ٤ سم

أثبت أن: ما ٩ ما ب + ما ٩ ما ب = ١

(ب) أوجد معادلة الخط المستقيم الذي ميله يساوى ميل الخط المستقيم: $\frac{١}{٣} = \frac{١-ص}{س}$ ويقطع جزءًا سالبًا من محور الصادات مقداره ٢ وحدات.

٥ (١) أ ب ح مثلث حيث ٩ (٠، ٠)، ب (٤، ٢)، ح (٢، ٤-)

أوجد: محيط المثلث أ ب ح


(ب) في الشكل المقابل:

أ ب ح شبه منحرف فيه أ ب // ح د

٩ (٢، ٣)، ب (٢، ٩)

ح (س-، س-)، د (س، ٤-)

أوجد إحداثي النقطة ح



(ب) أثبت أن النقط $أ(٢، -٠)$ ، $ب(٣، ٤)$ ، $ج(١، -٦)$ هي رؤوس مثلث متساوي الساقين.

٤ (أ) أوجد معادلة الخط المستقيم الذي ميله يساوي ميل الخط المستقيم : $\frac{١}{٣} = \frac{١-ص}{س}$ ويقطع جزءاً سالباً من محور الصادات مقداره ٣ وحدات.

(ب) $أ$ ب $ج$ شكل رباعي حيث $أ(٢، ٢)$ ، $ب(٦، ٢)$ ، $ج(٢، -٢)$ ، $د(٢، -٢)$ ، أثبت أن : الشكل $أ$ ب $ج$ د شبه منحرف.

٥ (أ) إذا كانت $أ(٥، -٦)$ ، $ب(٣، ٧)$ ، $ج(١، -٣)$

فأوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة $أ$ وينقطة منتصف $ب$ ج

(ب) $س$ ص $ع$ مثلث قائم الزاوية في $ص$ فيه : $س = ٥$ سم ، $ص = ١٢$ سم أوجد قيمة : $ما$ س $ع$ + $ما$ س $ع$

محافظة دمياط

١٢

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ الزاوية التي قياسها ٤٠° تنتم الزاوية التي قياسها

(أ) ٥٠° (ب) ٨٠° (ج) ٩٠° (د) ١٤٠°

٢ إذا كانت : $ج(٦، -٤)$ هي منتصف $أ$ ب حيث $أ(٥، -٣)$

فإن نقطة $ب$ هي

(أ) $(٥، -٧)$ (ب) $(٧، ٥)$ (ج) $(٧، ٥)$ (د) $(٥، -٧)$

٣ طول نصف قطر الدائرة التي مركزها $(٠، ٠)$ وتمر بالنقطة $(٣، ٤)$

يساوي وحدة طول.

(أ) ٧ (ب) ١ (ج) ١٢ (د) ٥

٤ ميل المستقيم : $س - ٥ = ٠$ هو

(أ) ٥ (ب) $\frac{١}{٥}$ (ج) غير معرف. (د) صفر

٥ إذا كانت : $طا(س + ١٠) = ١$ حيث $س$ زاوية حادة فإن : $د(س) =$

(أ) ٤٥° (ب) ٣٥° (ج) ٨٠° (د) ٥٠°

٦ البعد العمودي بين المستقيمين : $س - ٣ = ٠$ ، $س + ٤ = ٠$ يساوي

وحدة طول.

(أ) ١ (ب) ٥ (ج) ٢ (د) ٧

٧ (أ) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطتين : $(٠، ٥)$ ، $(٥، ٠)$

(ب) $أ$ ب $ج$ مثلث قائم الزاوية في $ب$ ، $أ = ٧$ سم ، $ج = ٢٥$ سم

أوجد قيمة : $ما$ $أ$ + $ما$ $ج$

٨ (أ) إذا كانت النقط : $(١، ٠)$ ، $(٣، ٩)$ ، $(٥، ٢)$ تقع على استقامة واحدة

أوجد : قيمة $أ$

(ب) أوجد معادلة الخط المستقيم المار بالنقطة $(٢، ٧)$ ويوازي المستقيم الذي معادلته :

$س + ٣ = ٥ + ص$

٩ (أ) أوجد قيمة $س$ حيث $س$ قياس زاوية حادة إذا كان :

$٢ ما س = ما ٣٠ + ما ٦٠ + ما ٦٠$

(ب) أوجد معادلة المستقيم الذي ميله $= ٢$ ويقطع جزءاً موجباً من محور الصادات

مقداره يساوي ٧ وحدات.

١٠ (أ) أثبت أن : $طا ٦٠ = \frac{٢ طا ٣٠ - ١ طا ٣٠}{٣٠}$ مبيناً خطوات الحل.

(ب) بين نوع المثلث الذي رؤوسه النقط : $أ(٢، -٤)$ ، $ب(٢، -١)$ ، $ج(٤، ٥)$

بالنسبة لأطوال أضلاعه.

محافظة كفر الشيخ

١٣

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ قياس الزاوية الخارجة عن المثلث المتساوي الأضلاع يساوي

(أ) ٦٠° (ب) ١٥٠° (ج) ١٢٠° (د) ٣٠°

محافظة البحيرة

١٤

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت نقطة الأصل هي منتصف \overline{AB} حيث $A(5, -2)$ فإن النقطة B هي

(أ) $(-5, -2)$ (ب) $(5, 2)$ (ج) $(-5, 2)$ (د) $(5, -2)$

٢ الزاوية التي قياسها 50° تتم زاوية قياسها

(أ) 50° (ب) 40° (ج) 30° (د) 130°

٣ دائرة مركزها $(3, -4)$ وطول نصف قطرها 5 وحدات فإن من النقط الآتية تنتمي للدائرة ؟

(أ) $(-4, 3)$ (ب) $(0, 0)$ (ج) $(5, 0)$ (د) $(4, 0)$


٤ إذا كانت : $\frac{1}{3} = \frac{2}{x}$ حيث $\frac{2}{x}$ قياس زاوية حادة فإن : $\frac{1}{3} = \frac{2}{x}$

(أ) 60° (ب) 120° (ج) 180° (د) 90°

٥ إذا كان $\angle A$ حاد متوازي أضلاع فيه : $\angle D = 110^\circ$ و $\angle C = 220^\circ$ فإن : $\angle B =$

(أ) 110° (ب) 70° (ج) 140° (د) 80°

٦ في الشكل المقابل :



$\angle A$ حاد مثلث قائم الزاوية في B

$\angle A$ ينصف $\angle D$ ، $DE \perp AC$

$\angle A = 2$ سم ، $\angle C = 2$ سم

فإن : $\angle B =$

(أ) 2 (ب) 2 (ج) 4 (د) 5

٢ أثبت أن المستقيم المار بالنقطتين $(3, -1)$ ، $(4, 2)$ يوازي المستقيم : $3x - y - 1 = 0$

٢ إذا كان المستقيمان اللذان ميلاهما $\frac{2}{3}$ ، $\frac{1}{2}$ متعامدين فإن : $\angle =$

(أ) 4 (ب) 9 (ج) 4 (د) 9

٣ إذا كان : $\angle A$ حاد مربعاً فإن : $\angle D$ حاد =

(أ) 90° (ب) 45° (ج) 60° (د) 30°

٤ إذا كانت : $\frac{1}{3} = \frac{2}{x}$ حيث $\frac{2}{x}$ قياس زاوية حادة فإن : $\frac{1}{3} = \frac{2}{x}$

(أ) 30° (ب) 60° (ج) 10° (د) 90°

٥ متوازي الأضلاع الذي قطراه متساويان في الطول وغير متعامدين يكون

(أ) مربعاً (ب) معيناً (ج) مستطيلاً (د) شبه منحرف

٦ معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة $(2, -3)$ ويوازي محور السينات هي

(أ) $y = 2$ (ب) $y = 3$ (ج) $y = -2$ (د) $y = -3$

٢ (١) بين نوع المثلث الذي رؤوسه النقط $A(3, 0)$ ، $B(1, 4)$ ، $C(-1, 2)$ من حيث أطوال أضلاعه.

(ب) أوجد بدون استخدام الحاسبة قيمة المقدار : $\sin 45^\circ + \frac{1}{2} \sin 60^\circ$ ما 60°

٣ (١) إذا كان المستقيم l : $y = (2 - x)$ ، والمستقيم m يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 45° أوجد : قيمة \angle إذا كان $l \parallel m$

(ب) إذا كان : $\sqrt{3} \sin 45^\circ = \sin 60^\circ$ ما 60° أوجد : \angle حيث \sin زاوية حادة.

٤ (١) إذا كان بعد النقطة $(3, -2)$ عن النقطة $(2, 5)$ يساوي $2\sqrt{2}$ وحدة طول أوجد : قيم \sin

(ب) أوجد معادلة الخط المستقيم الذي ميله 3 ويمر بالنقطة $(5, -2)$

٥ (١) إذا كانت : $A(2, 3)$ هي منتصف \overline{BC} حيث $C(-1, 3)$ أوجد : إحداثي النقطة B

(ب) $\angle A$ حاد مثلث قائم الزاوية في B ، $\angle A = 1$ أوجد : $\angle D$

٣ إذا كانت : ط = (س + ١٠) حيث س قياس زاوية حادة
فإن : س =

- (١) ٦٠ (ب) ٣٠ (ج) ٥٠ (د) ٧٠

٤ الشكل الذي عدد أضلاعه يساوى عدد أقطاره هو

- (١) الشكل الرباعي. (ب) المثلث.
(ج) الشكل الخماسي. (د) الشكل السداسي.

٥ دائرة مركزها نقطة الأصل وطول نصف قطرها ٢ وحدة طول
فإن النقطة تنتمي إليها.

- (١) (١، ٢) (ب) (٢، -٥)
(ج) (٣، ١) (د) (٠، ١)

٦ المربع الذي طول قطره ٨ سم فإن مساحته تساوى سم^٢.

- (١) ٤ (ب) ٢٢ (ج) ٦٤ (د) ١٦

٢ (١) أثبت أن النقط ٢ (١، -٣) ، ٣ (٤، -٦) ، ٤ (٢، -٢) تقع على دائرة

واحدة مركزها النقطة م (١، ٢) ثم أوجد محيط الدائرة حيث $3.14 = \pi$

(ب) بدون استخدام حاسبة الجيب أثبت أن :

$$\sin 60^\circ - \sin 40^\circ = \sin 60^\circ + \sin 20^\circ$$

٣ (١) أوجد معادلة الخط المستقيم العمودى على \overline{AB} من نقطة منتصفها

حيث ٢ (١، ٣) ، ٣ (٥، ٢)

(ب) أ ب ح مثلث قائم الزاوية فى ب فيه : ح = ٥ سم ، ب = ٤ سم

أوجد قيمة : ٢ مم^٢ ح + مم^٢ ب

٤ (١) أثبت أن النقط ٢ (٣، -٢) ، ٣ (٥، -٠) ، ٤ (٠، -٧) ، ٥ (٨، -٩)

هى رؤوس متوازي أضلاع.

(ب) أوجد قيمة س إذا كان : ٤ = س = مم^٢ ٣٠ مم^٢ ٢٠ مم^٢ ٤٥

(ب) أ ب حى شبه منحرف فيه : ٤٩ // ٥٢ ، ب ح = ٩٠ ، ب = ٣ سم
، ب ح = ٦ سم ، ٤٩ = ٢ سم أوجد : طول ح ثم أوجد قيمة : مم^٢ (د ب حى)

٣ (١) أوجد معادلة المستقيم الذى ميله يساوى ٣ ويمر بالنقطة (١، ٢)

(ب) بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة س التى تحقق :

$$2 \sin 60^\circ - 2 \sin 40^\circ = \sin 20^\circ$$

٤ (١) إذا كان المستقيم ل يمر بالنقطتين (١، ٣) ، (٢، ٤)

والمستقيم ل يمر بالاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها ٤٥
أوجد قيمة ل إذا كان المستقيمان ل ، ل متعامدين.

(ب) أ ب ح مثلث قائم الزاوية فى ب فإذا كان : ٢ = ب ح
فأوجد النسب المتثلثة الأساسية للزاوية ح

٥ (١) إذا كانت ٢ (س، ٣) ، ٣ (٢، ٣) ، ٤ (١، ٥)

وكانت : ٢ = ب ح ، ب ح = ٢ فأوجد : قيمة س

(ب) أثبت أن النقط ٢ (٠، ٦) ، ٣ (٢، -٤) ، ٤ (٢، -٤)

هى رؤوس مثلث قائم الزاوية فى ب ،

ثم أوجد إحداثى نقطة و التى تجعل الشكل أ ب حى مستطيلاً.



محافظة الغيوم

١٥

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ البعد العمودى بين المستقيمين : س - ٢ = ٠ ، س + ٢ = ٠

يساوى وحدة طول.

- (١) ١ (ب) ٥ (ج) ٢ (د) ٣

٢ مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوى

- (١) ٩٠ (ب) ١٨٠ (ج) ٣٦٠ (د) ٢٧٠



٥ (١) إذا كان المستقيمان : ٣ - ص - ٤ - ص = ٠ ، ٤ - ص + ٤ - ص = ٠ متعامدين فأوجد : قيمة α

(ب) أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يقطع من محوري الإحداثيات السيني والصادي جزأين موجبين طولاهما ١ ، ٤ وحدات طول على الترتيب.



محافظة بنى سويف

١٦

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ ٤ ما α ط $\alpha = 60^\circ$
 (١) ٣ (ب) ٦ (ج) ١٢ (د) ٢٢

٢ صورة النقطة (٤ ، ٥) بالانتقال (٢ ، ٣) هي
 (١) (٦ ، ٨) (ب) (٨ ، ٦) (ج) (٦ ، ٨) (د) (٨ ، ٦)

٣ البعد العمودي بين المستقيمين : $3 - x = 0$ ، $x + 3 = 0$
 يساوى وحدة طول.

(١) ١ (ب) ٢ (ج) ٤ (د) ٥

٤ معادلة المستقيم المار بالنقطة (٥ ، ٣) ويوازي محور الصادات هي
 (١) $x - 5 = 0$ (ب) $x - 3 = 0$ (ج) $x = 5$ (د) $x = 3$

٥ عدد محاور التماثل للدائرة
 (١) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) عدد لا نهائي

٦ النقطة (٠ ، ٠) ، (٠ ، ٦) ، (٦ ، ٠) ، (٦ ، ٦)
 (١) تكون مثلثاً حاد الزوايا. (ب) تكون مثلثاً قائم الزاوية.
 (ج) تكون مثلثاً منفرج الزاوية. (د) تقع على استقامة واحدة.

٢ (١) إذا كانت : النقطة ح (٦ ، ٤) هي منتصف \overline{AB} حيث : $A(5 ، 3)$ أوجد : إحداثي النقطة ب

(ب) في الشكل المقابل :

أ ب ح د شبه منحرف فيه :

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ، $\angle D = 90^\circ$

$AD = 12$ سم ، $BC = 20$ سم ، $AB = 12$ سم

$BC = 25$ سم

أوجد : طول \overline{AC} ، $\angle C$ (د ح)

٣ (١) أثبت أن : $\frac{1}{2} \alpha = 60^\circ$ ما $\alpha = 20^\circ$ ما $\alpha = 30^\circ$

(ب) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢ ، ٣) وميله يساوى ٢

٤ (١) إذا كانت : ما α ط $\alpha = 40^\circ$

أوجد : $\angle D$ (د هـ) حيث $\angle D$ زاوية حادة.

(ب) أثبت أن المستقيم المار بالنقطتين (٢ ، ١) ، (٦ ، ٣) يوازي المستقيم الذي يصنع زاوية موجبة قياسها 40° مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.

٥ (١) أثبت أن النقط : (٣ ، ١) ، (٤ ، ٦) ، (٢ ، ٢) تقع على الدائرة التي مركزها م (١ ، ٢)

(ب) أوجد ميل الخط المستقيم : $3 - x = 0$ ، $x + 3 = 0$

، ثم أوجد طول الجزء المقطوع من محور الصادات.



محافظة المنيا

١٧

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ الزاوية التي قياسها 60° تتكم زاوية قياسها
 (١) ٣٥ (ب) ٢٥ (ج) ١١٥ (د) ٤٥

٢ أ ب ح د متوازي أضلاع فيه : $\angle D = 120^\circ$ ، $\angle C = 20^\circ$

فإن : $\angle B =$
 (١) ٥٠ (ب) ٨٠ (ج) ١٠٠ (د) ١٦٠

(يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ قياس الزاوية المستقيمة يساوي°

(أ) ٩٠ (ب) ٣٦٠ (ج) ١٨٠ (د) ٢٤٠

٢ إذا كانت : $\angle A = (20 + x)^\circ$ حيث $\angle B = 3x^\circ$ قياس زاوية حادة فإن : $x =$

(أ) ٢٠ (ب) ٦٠ (ج) ٩٠ (د) ٤٠

٣ طول الضلع المقابل للزاوية التي قياسها 30° في المثلث القائم الزاوية يساوي طول الوتر.

(أ) $\frac{1}{4}$ (ب) ضعف (ج) $\frac{1}{2}$ (د) $\frac{1}{3}$

٤ إذا كان المستقيمان : $س + ص = ٥$ ، $لح + س + ٢ ص = ٧$ متعامدين فإن : $لح =$

(أ) ٢- (ب) ١- (ج) ١ (د) ٢


٥ المعين الذي طول قطريه ٦ سم ، ١٢ سم تكون مساحته سم^٢

(أ) ١٦ (ب) ٢٠ (ج) ٣٦ (د) ٧٢

٦ البعد العمودي بين المستقيمين : $س - ٢ = ٠$ ، $س + ٤ = ٠$ يساوي وحدة طول.

(أ) ٢ (ب) ٧ (ج) ١٢ (د) ٦

١ (أ) في الشكل المقابل :



أ ب ح مثلث قائم الزاوية في ح

، $أ = ١٢$ سم ، $ب = ١٢$ سم

أثبت أن : $أ ح + ح ب + ح أ = ١$

(ب) بين نوع المثلث الذي رؤوسه النقط : $أ(١، ١)$ ، $ب(١، ٥)$ ، $ح(٤، ٣)$ من حيث أطوال أضلاعه.

٣ مجموع طولى أى ضلعين فى مثلث طول الضلع الثالث.

(١) أصغر من (ب) يساوى (ج) أكبر من (د) ضعف

٤ إذا كانت : $ما - س = \frac{1}{3}$ فإن : $لح (د - س) =$ حيث $س$ زاوية حادة.

(١) ٤٥ (ب) ٦٠ (ج) ٩٠ (د) ٣٠

٥ البعد بين النقطتين $(٠، ٣)$ ، $(٤، ٠)$ يساوى وحدة طول.

(١) ٤ (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ٧

٦ إذا كان : $س + ص = ٥$ ، $لح + س + ٢ ص = ٠$ مستقيمين متوازيين فإن : $لح =$

(١) ٢- (ب) ١- (ج) ١ (د) ٢

٢ (١) أوجد قيمة المقدار الآتى بدون استخدام الآلة :


$\sin 60^\circ \cdot \cos 30^\circ - \sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ + \sin 60^\circ \cdot \cos 30^\circ$

(ب) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة $(١، ٢)$ عمودياً على المستقيم المار بالنقطتين : $أ(٢، ٤)$ ، $ب(٣، ٢)$

٣ (١) بدون استخدام الآلة أوجد قيمة $س$ التي تحقق : $٢ ما - س = \sin 60^\circ - ٢ \cos 45^\circ$

حيث $س$ قياس زاوية حادة.

(ب) فى الشكل المقابل :



Δ أ ب ح فيه : $\angle د = 90^\circ$

، $أ ح = ١٥$ سم ، $ب ح = ٢٥$ سم

أثبت أن : $ح أ + ح ب - ح أ ح ب = ٠$

٤ (١) أثبت أن النقط : $أ(١-، ٤-)$ ، $ب(١، ٠)$ ، $ح(٢، ٢)$

تقع على استقامة واحدة.

(ب) إذا كانت : $ح(٦، ٤-)$ هى منتصف $أ ب$ حيث $أ(٣، ٥)$ فأوجد إحداثى نقطة ب

٥ (١) أثبت أن المستقيم الذى يصنع زاوية قياسها 45° مع الاتجاه الموجب لمحور السينات

يوازى المستقيم الذى معادلته : $س - ص = ١$.

(ب) أوجد قيمة $أ$ إذا كان البعد بين النقطتين : $أ(٢، ٧)$ ، $ب(٢، ٢)$ يساوى ٥ وحدات طول.

٣ (١) إذا كان 2 ما $س = 60^\circ - 4$ ما 30° أوجد: $س$ (دس) حيث $س$ زاوية حادة.

(ب) 4 ما $س$ متوازي أضلاع فيه: 4 (ب) $(2, 3)$ ، 4 (ب) $(0, 5)$ ، 4 (ب) $(1, 4)$ أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطريه ، ثم أوجد إحداثي نقطة

٤ (١) بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة: $60^\circ + 30^\circ + 45^\circ$

(ب) أثبت أن المستقيم المار بالنقطتين $(2, 3\sqrt{2})$ ، $(4, 3\sqrt{2})$ عمودي على الخط المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 60°

٥ (١) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة $(3, 5)$ ويوازي المستقيم:

$$س + 3ص = 7$$

(ب) أوجد ميل الخط المستقيم وطول الجزء المقطوع من محور الصادات

$$\frac{1}{س} = \frac{1-ص}{س}$$

محافظة سوهاج

١٩

أجب عن الأسئلة الآتية: (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١ نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كلًا منها بنسبة من جهة القاعدة.

(١) $3:2$ (ب) $1:2$ (ج) $2:1$ (د) $3:2$

٢ إذا كانت: $ما ه = ما ه$ فإن: $س$ (د ه) = (حيث $ه$ زاوية حادة)

(١) 30° (ب) 45° (ج) 60° (د) 90°

٣ مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوي

(١) 30° (ب) 60° (ج) 180° (د) 360°

٤ البعد بين النقطتين $(0, 3)$ ، $(0, 1)$ يساوي وحدة طول.

(١) 4 (ب) 5 (ج) 6 (د) 7

٥ المربع الذي طول ضلعه $3\sqrt{2}$ سم تكون مساحته سم^٢.

(١) $4\sqrt{2}$ (ب) 9 (ج) 3 (د) 6

محافظة قنا

٢٠

أجب عن الأسئلة الآتية:

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١ إذا كانت: $ما س = \frac{1}{س}$ حيث $س$ قياس زاوية حادة فإن: $2س =$

(١) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ (ج) 60 (د) $\frac{1}{3\sqrt{2}}$

٢ 4 ما $س$ مثلث قائم الزاوية في ح فيه:

4 ما $س = 13$ سم ، 4 ما $س = 12$ سم

أوجد: 1 طول 4 ما

2 ما 4 ما $س + 4$ ما $س$

(ب) أوجد معادلة المستقيم الذي ميله يساوي 2 ويمر بالنقطة $(1, 0)$

٤ (١) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن: 2 ما $30^\circ = 60^\circ - 2$ ما 45°

(ب) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطتين $(1, 3)$ ، $(1, -3)$ ، ثم أثبت أنه يمر بنقطة الأصل.

٥ (١) أثبت أن النقط 4 (ب) $(-3, 1)$ ، 4 (ب) $(6, 5)$ ، 4 (ب) $(2, 3)$ تقع على استقامة واحدة.

(ب) أثبت أن المستقيم الذي يمر بالنقطتين $(-3, 2)$ ، $(4, 5)$ يوازي المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 45°



٥

(١) أثبت أن النقط $أ(٠، ٣-)$ ، $ب(٤، ٢)$ ، $ح(١، -٦)$

هي رؤوس لثلث متساوي الساقين رأسه $أ$ ، ثم أوجد طول القطعة المستقيمة المرسومة من $أ$ عمودية على $ب ح$

(ب) $أ ب ح$ متوازي أضلاع حيث $أ(٢، ٢)$ ، $ب(٤، -٥)$ ، $ح(٠، -٣)$ أوجد إحداثي النقطة $د$



محافظة الأقصر

٢١

أجب عن الأسئلة الآتية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(١) عدد المثلثات القائمة الزاوية المظلة التي تلزم لتغطية سطح المستطيل تمامًا يساوي

- (أ) عشرة (ب) ثمانية
(ج) ستة (د) أربعة

(٢) إذا كان : $ق(٤) = ٨٥^\circ$ وكانت : $ح ا ب = ح ا ب$ في $\Delta أ ب ح$ فإن : $ق(د ح) =$

- (أ) 30° (ب) 45° (ج) 50° (د) 60°


(٣) صورة النقطة $(٥، -٦)$ بالانتقال $(٣، -٢)$ هي

- (أ) $(٤، -٢)$ (ب) $(٢، ٤)$ (ج) $(٢، -٤)$ (د) $(٢، -٤)$

(٤) في الشكل المقابل :

ميل $أ ب =$


- (أ) $\frac{2}{3}$ (ب) $\frac{2}{3}$
(ج) $\frac{2}{3}$ (د) $\frac{2}{3}$



(٥) قياس الزاوية الخارجة عند رأس من رؤوس مثلث متساوي الأضلاع يساوي

- (أ) 30° (ب) 60° (ج) 90° (د) 120°

(٢) عدد الأشكال الرباعية في الشكل المقابل هو



- (أ) ٢ (ب) ٦
(ج) ٩ (د) ١٢

(٣) إذا كان المستقيمان المثلثان للمعادلتين : $ص + ح = ٤$ ، $٣ ص + ح = ٠$ متعامدين فإن : $أ =$

- (أ) $2-$ (ب) $١-$ (ج) ١ (د) ٢

(٤) عدد محاور تماثل المعين هو

- (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

(٥) المستقيم الذي معادلته : $٢ ص = ٣ ح - ٦$ يقطع من محور الصادات جزءًا طوله وحدة طول.

- (أ) ٦ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) $\frac{2}{3}$

(٦) صورة النقطة $(٢، -٣)$ بالانعكاس في نقطة الأصل هي

- (أ) $(٢، ٣)$ (ب) $(٢، -٣)$ (ج) $(٢، -٣)$ (د) $(٢، ٣-)$

(٢) (١) $\Delta أ ب ح$ قائم الزاوية في $ب$ ، $أ ح = ١٠$ سم ، $ب ح = ٨$ سم

أثبت أن : $ح ا ب = ١ + ٢ ح ا ب + ح ا ب$

(ب) أثبت أن النقط $أ(١، ١)$ ، $ب(٠، -١)$ ، $ح(٢، ٢)$

تقع على استقامة واحدة.

(٣) (١) إذا كانت : $ح ا ب = ٢٠$ ، $ح ا ب = ٤٥^\circ$

فأوجد : قيمة $ح$ بالدرجات حيث $ح$ قياس زاوية حادة.

(ب) أثبت أن المستقيم المار بالنقطتين $(١، -٢)$ ، $(٢، ٤)$

يوازي المستقيم الذي معادلته : $٣ ص - ح = ١$.

(٤) (١) بدون استخدام الحاسبة أثبت أن : $ح ا ب = ٢٠$ ، $ح ا ب = ٢٠$

(ب) $أ ب ح$ شكل رباعي حيث $أ(٥، ٣)$ ، $ب(٦، -٢)$ ، $ح(١، -١)$ ، $د(٠، ٤)$

أثبت أن الشكل $أ ب ح د$ معين ، وأوجد مساحة سطحه.

محافظة أسوان

٢٢

أجب عن الأسئلة الآتية: (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- ١ الزاوية التي قياسها 60° تنتم زاوية قياسها
 (أ) 130° (ب) 110° (ج) 20° (د) 10°
- ٢ إذا كان: $\vec{AB} \perp \vec{CD}$ وكان: ميل $\vec{AB} = \frac{1}{4}$ فإن: ميل $\vec{CD} =$
 (أ) 2 (ب) -2 (ج) $\frac{1}{4}$ (د) $-\frac{1}{4}$
- ٣ إذا كانت: $\vec{CD} \exists$ محور تماثل \vec{AB} فإن: \vec{CD} \vec{AB}
 (أ) \perp (ب) $>$ (ج) $<$ (د) $=$
- ٤ إذا كانت الأطوال ٣ سم، ٧ سم، ٥ سم هي أطوال أضلاع مثلث فإن: ٥ سم يمكن أن تساوي سم.
 (أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٧ (د) ١٠
- ٥ البعد بين النقطتين: $(0, 6)$ ، $(8, 0)$ يساوي وحدة طول.
 (أ) ٦ (ب) ٨ (ج) ١٠ (د) ١٤
- ٦ إذا كانت: $\angle A = (10^\circ + \angle B)$ حيث $\angle B$ زاوية حادة فإن: $\angle C = (د \text{ سم}) =$
 (أ) 80° (ب) 50° (ج) 30° (د) 20°

٢ (أ) إذا كانت: $\angle A = 2$ ما $\angle B = 60^\circ$ - $\angle C = 40^\circ$

أوجد: قيمة $\angle B$ (حيث $\angle B$ قياس زاوية حادة)

(ب) أوجد معادلة الخط المستقيم العمودي على \vec{AB} من نقطة منتصفها حيث:
 $A(3, 1)$ ، $B(5, 3)$

٣ (أ) إذا كانت النقطة $C(2, 4)$ حيث \vec{C} منتصف \vec{AB} ، $A(4, 2)$ ، $B(6, 8)$ (ص)
 أوجد: قيمة $\angle C$

٦ إذا كانت: $C(3, -)$ ، $B(9, -)$ منتصف \vec{AB} حيث $A(6, -)$ ، $B(12, -)$

فإن $\angle C =$
 (أ) ٧ (ب) ٩ (ج) ٦ (د) ١٨

٢ (أ) إذا كان البعد بين النقطتين $(4, 5)$ ، $(2, 1)$ يساوي ٥ وحدات طول فأوجد: قيمة $\angle C$

(ب) إذا كان: $\angle A = 30^\circ$ ، $\angle B = 40^\circ$ ، $\angle C = 80^\circ$ فأوجد: قيمة $\angle C$ حيث $\angle C$ قياس زاوية حادة.

٣ (أ) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة $(1, 2)$ موازيًا للمستقيم: $2x + 3y - 6 = 0$
 (ب) أوجد قياس الزاوية الموجبة θ التي يصنعها المستقيم المار بالنقطتين $(2, -3)$ ، $(4, 3)$ مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.

٤ (أ) \vec{AB} قطر في الدائرة Γ حيث: $A(4, -1)$ ، $B(2, -7)$

أوجد طول نصف قطر الدائرة ومساحتها.

(ب) \vec{AB} ح \vec{CD} فيه: $\vec{AB} = \vec{CD}$ ، $\vec{AB} = 10$ سم، $\vec{CD} = 12$ سم

رسم $\vec{AB} \perp \vec{CD}$ يقطعها في E

أثبت أن: $\vec{AE} = \vec{CE}$ ، $\vec{BE} = \vec{DE}$ (١) $\vec{AB} + \vec{CD} < 1$ (٢)

٥ (أ) إذا كان المستقيم $\vec{AB} \parallel$ محور الصادات حيث: $A(7, -)$ ، $B(5, 2)$

فأوجد: قيمة $\angle C$


(ب) في الشكل المقابل:

\vec{AB} ح معين تقاطع قطراه في M

فإذا كان: $\vec{AB} = 5$ سم، $\vec{AM} = 4$ سم

أوجد: (١) $\angle C$ (د) $\angle D$

(٢) مساحة المعين \vec{AB} ح



(ب) إذا كانت : $ق (١-، ١-)$ ، $ب (٣، ٢)$ ، $ح (٠، ٦)$ رؤوس مثلث أثبت أن : المثلث $أ ب ح$ قائم الزاوية في $ب$

٤ (١) $س$ $ص$ $ع$ مثلث قائم الزاوية في $ص$ فيه : $س$ $ص = ٥$ سم ، $س$ $ع = ١٣$ سم أوجد : ١ $طا$ $س \times طا$ $ع$ ٢ $ع$ $س$ $ع$ - $ع$ $س$ $ع$

(ب) أوجد معادلة المستقيم الذي يقطع من محوري الإحداثيات السيني والصادي جزءين موجبين طولاهما ١ ، ٤ وحدات طول على الترتيب.

٥ (١) أثبت أن المستقيم المار بالنقطتين $(٣، ١-)$ ، $(٤، ٢)$ يوازي المستقيم : ٣ $ص$ - $س$ - $١ = ٠$

(ب) $أ ب ح$ مثلث قائم الزاوية في $ب$ فإذا كان : $أ ب = ٣\sqrt{٢}$ ، $أ ح = ٣\sqrt{٢}$ أوجد النسبة المثلثية الأساسية للزاوية $ح$



محافظة الوادي الجديد


٢٣

أجب عن الأسئلة الآتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ الشكل الرباعي $أ ب ح د$ الذي فيه : $أ ب < ح د$ ، $أ ب // ح د$ يكون
(١) مربعاً. (ب) مستطيلاً. (ج) معيناً. (د) شبه منحرف.

٢ في الشكل المقابل :



$أ ب ح د$ مستطيل فيه :

$أ ب = ٦$ سم ، $ب ح = ٨$ سم ، $هـ \in أ ب$

فإن : مساحة سطح المثلث $هـ ب ح$ = سم^٢

(١) ١٤ (ب) ٢٤
(ج) ٢٨ (د) ٤٨

٣ لأي زاوية قياسها $أ$ يكون $\frac{٩}{١٠} = \dots\dots\dots$

(١) $أ$ (ب) ٩٠° (ج) ٩٠° (د) ٩٠°

٤ إذا كان : $أ ب ح د$ مستطيلاً ، $ق (٠، ١)$ ، $ح (٤، ٤)$

فإن : $ب د$ = وحدة طول.

(١) ٥ (ب) ٨ (ج) ٩ (د) ١٠

٥ إذا كان المستقيمان : $س$ $ص$ + $هـ = ٥$ ، $ل$ $س$ + $٢ ص = ١$ متعامدين فإن : $ل$ =

(١) ٢ (ب) ١ (ج) ١- (د) ٢-

٦ في الشكل المقابل :



$أ ب ح$ مثلث قائم الزاوية في $ب$ ، $ق (١، ٣)$ ، $ق (١، ٣)$

فإن $ب ح$: $أ ح$: $أ ب$ =

(١) $١ : ٣ : ٢$ (ب) $٢ : ٣ : ١$
(ج) $١ : ٢ : ٣$ (د) $٢ : ١ : ٣$

٢ (١) $س$ $ص$ $ع$ مثلث قائم الزاوية في $ع$ ، $س$ $ص = ٣$ سم ، $ص$ $ع = ٤$ سم

أوجد قيمة كل من : ١ $طا$ $س \times طا$ $ع$ ٢ $ع$ $س$ $ع$ - $ع$ $س$ $ع$


(ب) بين نوع المثلث الذي رؤوسه النقط : $ق (٣، ٢)$ ، $ب (٥، ١)$ ، $ح (١، ٣)$ بالنسبة لأطوال أضلاعه وبالنسبة لقياسات زواياه.

٣ (١) إذا كانت : $طا$ $س = ٤$ ما ٣٠° ما ٦٠° ، $س$ قياس زاوية حادة

فأوجد قيمة كل من : ١ $س$ ٢ $ما$ $س$

(ب) أوجد معادلة المستقيم الذي ميله يساوي ٢ ويمر بالنقطة $(١، ٠)$

٤ (١) في الشكل المقابل :



$أ ب ح$ مثلث فيه : $أ ب = ١٠$ سم ، $ب ح = ١٢$ سم ، $أ ب \perp ب ح$

أوجد قيمة كل من :

(١) ٩٠° (ب) ٩٠° (ج) ٩٠° (د) ٩٠°

٦) أ ب ح مثلث قائم الزاوية في أ ، $\angle \text{أ} \perp \text{ب ح}$ حيث $\angle \text{ب} = 30^\circ$ ، $\angle \text{ح} = 60^\circ$ ، فإن : $\angle \text{أ} = \dots\dots\dots$

(أ) $\text{ب} \times \text{ح} = \text{أ} \times \text{ب}$ (ب) $\text{ح} \times \text{ب} = \text{أ} \times \text{ب}$ (ج) $\text{ب} \times \text{ح} = \text{أ} \times \text{ب}$ (د) $\text{ب} \times \text{ح} = \text{أ} \times \text{ب}$

٢) (أ) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن : $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ ، $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ، $\sin 90^\circ = 1$

(ب) إذا كانت : $\angle \text{أ} = 30^\circ$ ، $\angle \text{ب} = 60^\circ$ ، $\angle \text{ح} = 90^\circ$ ، فإن : $\sin \text{أ} = \dots\dots\dots$

أوجد إحداثي النقطة ب

٣) (أ) أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطتين : $(1, 3)$ ، $(-1, 3)$

(ب) بين نوع المثلث أ ب ح حيث : $\angle \text{أ} = 30^\circ$ ، $\angle \text{ب} = 60^\circ$ ، $\angle \text{ح} = 90^\circ$ ، $\sin \text{أ} = \dots\dots\dots$

بالنسبة لأطوال أضلاعه.

٤) (أ) أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة $(-2, 3)$ ويصنع زاوية مع الاتجاه الموجب لمحور السينات قياسها 45°

(ب) أوجد قيمة : $\frac{\sin 45^\circ}{\sin 90^\circ} = \dots\dots\dots$


٥) (أ) أوجد معادلة الخط المستقيم الذي ميله يساوي ٢ ، وطول الجزء المقطوع من محور الصادات الموجب يساوي ٥ وحدات.

(ب) في الشكل المقابل :

$\Delta \text{أ ب ح}$ قائم الزاوية في ب فيه :

$\angle \text{أ} = 30^\circ$ ، $\angle \text{ب} = 60^\circ$ ، $\angle \text{ح} = 90^\circ$ ، $\sin \text{أ} = \dots\dots\dots$

أوجد : $\sin \text{أ} = \dots\dots\dots$



(أ) $\sin \text{أ} = \dots\dots\dots$

(ب) $\sin \text{أ} = \dots\dots\dots$

محافظة شمال سيناء

٢٥

أجب عن الأسئلة الآتية :

١) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) إذا كانت : $\sin \text{أ} = \frac{1}{2}$ ، حيث أ قياس زاوية حادة ، فإن : $\sin \text{ب} = \dots\dots\dots$

(أ) 90° (ب) 60° (ج) 45° (د) 30°

(ب) أ ب ح معين فيه : $\angle \text{أ} = 30^\circ$ ، $\angle \text{ب} = 60^\circ$ ، $\angle \text{ح} = 90^\circ$ ، $\sin \text{أ} = \dots\dots\dots$

أوجد : $\sin \text{أ} = \dots\dots\dots$

٥) (أ) إذا كان المستقيم ل يمر بالنقطتين $(1, 3)$ ، $(-1, 3)$ ، والمستقيم م يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 45°



فأوجد : قيمة $\sin \text{أ} = \dots\dots\dots$

(ب) أوجد معادلة المستقيم الذي يقطع من محوري الإحداثيات السيني والصادي جزعين موجبين طولاهما ٢ ، ٤ على الترتيب.



محافظة جنوب سيناء

٢٤

أجب عن الأسئلة الآتية :

١) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) إذا كانت : $\sin \text{أ} = \frac{1}{2}$ ، فإن : $\sin \text{ب} = \dots\dots\dots$ حيث أ زاوية حادة.

(أ) ١ (ب) $\sqrt{3}$ (ج) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (د) $\frac{1}{2}$

٢) المسافة بين النقطتين $(0, 3)$ ، $(4, 0)$ تساوي وحدة طول.

(أ) ٤ (ب) ٥ (ج) ٣ (د) ٢

٣) إذا كانت : $\angle \text{أ} = 30^\circ$ ، $\angle \text{ب} = 60^\circ$ ، $\angle \text{ح} = 90^\circ$ ، فإن نقطة منتصف أ ب هي

(أ) $(1, 0)$ (ب) $(3, 3)$ (ج) $(2, 3)$ (د) $(0, 1)$

٤) أ ب ح مثلث قائم الزاوية في ب ، $\angle \text{أ} = 30^\circ$ ، $\angle \text{ب} = 60^\circ$ ، $\angle \text{ح} = 90^\circ$ ، فإن : $\sin \text{أ} = \dots\dots\dots$

(أ) 90° (ب) 45° (ج) 60° (د) 30°

٥) إذا كان : $\sin \text{أ} = \frac{1}{2}$ ، $\sin \text{ب} = \frac{1}{2}$ ، $\sin \text{ج} = \frac{1}{2}$ ، فإن : $\sin \text{د} = \dots\dots\dots$

(أ) 2 (ب) 1 (ج) -1 (د) 1

٥ إذا كانت: $(1, 2)$ ، $(-6, 4)$ ، $(2, 2)$ ، $(-2, 1)$

١ أثبت أن : النقط ٩ ، ب ، ح تقع على دائرة مركزها م

٢ أوجد : محيط الدائرة م حيث $(\pi = 3,14)$



محافظة البحر الأحمر

أجب عن الأسئلة الآتية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : $q(5, 7)$ ، $p(1, 1)$ فإن منتصف \overline{AB} هي النقطة

(٤ ، ٣) (ج) (٢ ، ٣) (د) (٣ ، ٣) (هـ) (٣ ، ٢) (ز)

٢) معين طولاً قطريه ٦ سم ، ٨ سم فإن مساحة سطحه سم^٢.

٤٨ (١) ٢٨ (ب) ٢٤ (ج) ١٤ (د)

٣ إذا كانت : $\theta = \frac{\sqrt{3}}{4}$ حيث θ زاوية حادة فإن : $\theta = \dots\dots\dots$

$$\frac{1}{\sqrt{r}} (u) \quad Y = \left(\frac{1}{2} \right) \quad 1 (u) \quad \frac{\sqrt{r}}{r} (1)$$

٤ إذا كان طولاً ضلعين في مثلث متساوي الساقين ٥ سم ، ١٣ سم

فإن طول الضلع الثالث سم.

۱۶ (ج) ۱۳ (د) ۸ (ب) ۵ (ا)

٥ إذا كان المستقيمان : ٣ - ٤ ح - ٤ ح + ٤ ح = ٣ ، ٤ ح + ٤ ح = ٨ متعامدين

..... = **لے** : **فان** :

$$\Upsilon - (\underbrace{}_J) \qquad \Xi - (\underbrace{}_{\frac{a}{b}}) \qquad \Upsilon (\underbrace{}_{\underbrace{}_b}) \qquad \Xi (1)$$

٦ عدد محاور تماثل المثلث المتساوي الأضلاع هو

(١) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

١) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن: $\sin 60^\circ = 2 \sin 30^\circ \cos 30^\circ$

ب) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطتين : $(2, 4)$ ، $(-1, 2)$

٢ قياس الزاوية الخارجة عن المثلث المتساوي الأضلاع يساوي

° ۱۸. (۵) ° ۱۲. (۴) ° ۹. (۷) ° ۶. (۱)

٣ ميل الخط المستقيم الذى يصنع زاوية موجبة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات قياسها 45° يساوى

١, ٤ (د) (ج) صفر ١- (ب) ١ (ا)

٤ الزاوية التي قياسها 40° تتمم زاوية قياسها

$$^{\circ}\xi. (j) \qquad ^{\circ}\theta. (\frac{a}{b}) \qquad ^{\circ}\backslash\xi. (\sqcup) \qquad ^{\circ}\gamma. (i)$$

5. إذا كانت : $A(2, -2)$ ، $B(-2, 2)$ فإن نقطة منتصف \overline{AB} هي

$$(\cdot, \cdot)(\cdot) \quad (\xi - \cdot, \xi)(\cdot) \quad (\cdot - \cdot, \cdot)(\cdot) \quad (\cdot, \cdot - \cdot)(\cdot)$$

٦ إذا كانت : ٣ ، ٧ ، ل أطوال أضلاع مثلث فإن ل يمكن أن تساوي

$$\lambda_*(\mu) \qquad \qquad \qquad V(\frac{a}{b}) \qquad \qquad \qquad \xi(\frac{a}{b}) \qquad \qquad \qquad \Upsilon(i)$$

(١) أثبت أن : $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ (بدون استخدام الحاسبة)

(ب) أثبت أن المثلث الذي رؤوسه النقط: $4(-, 1)$ ، $3(-, 4)$ ، $1(1, 6)$ متساوي الساقين.

(١) أوجد معادلة المستقيم الذي ميله يساوي ٢ ويقطع ٧ وحدات موجبة من محور الصادات.


(ب) في الشكل المقابل :

١٦٦ ح. مثلث قائم الزاوية في ب فيه :

۹ = ح ۱۰ = سم ، ح = ۸ سم

١ أوجد : طول AB

٢ أثبت أن : $\mathbf{e}_1^2 + \mathbf{e}_2^2 + \mathbf{e}_3^2 = \mathbf{1}$


$$(1) \text{ إذا كانت : } \frac{٦٠ \text{ ما } ٣٠}{٤٥ \text{ ما}} =$$

أوجد : قيمة θ حيث θ قياس زاوية حادة. (بدون استخدام الحاسبة)

(ب) أوجد معادلة الخط المستقيم المار بالنقطة (١ ، ٢) عمودياً على المستقيم المار

بالنقطتين ٢ (٢-، ٣) ، ٥ (٥-، ٤)



٣ (١) إذا كانت : ط = ٤ م ، ٦٠° م ، ٣٠° حيث : س زاوية حادة أوجد : قيمة س

(ب) أ ب ح مثلث فيه : ٢ (٤ ، ٢) ، ب (٠ ، ٣) ، ح (٥ ، ٧) ،

أثبت أن المثلث أ ب ح قائم الزاوية ثم أوجد مساحة سطحه.

٤ (١) أوجد معادلة المستقيم الذي ميله ٢ ويقطع جزءًا موجبًا من محور الصادات


طوله ٧ وحدات طول.

(ب) في الشكل المقابل :

إذا كان أ ب ح مثلثًا قائم الزاوية في ب

، أ ح = ١٣ سم ، ب ح = ٥ سم

أوجد : قيمة ما أ ح + ما ح + ما أ ح



٥ (١) إذا كان البعد بين النقطتين (س ، ٧) ، (٣ ، ٢) هو ٥ وحدة طول أوجد : قيم س

(ب) إذا كان المستقيم : ل يمر بالنقطتين (١ ، ٣) ، (٢ ، ٤)

، المستقيم ل م يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها ٤٥°

أوجد : قيمة ل م إذا كان : ل م // ل م



محافظة مطروح

٢٧

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : ما ٢ س = $\frac{1}{3}$ فإن : س (د س) =

(١) ٦٥° (ب) ٣٠° (ج) ٤٥° (د) ٦٠°

٢ الزاوية التي قياسها ٣٧° تتمها زاوية قياسها

(١) ٥٣° (ب) ١٤٣° (ج) ٣٧° (د) ٩٠°

٣ إذا كان المستقيمان اللذان ميلهما $\frac{2}{3}$ ، $\frac{3}{4}$ متوازيين فإن : ل =

(١) $\frac{4}{3}$ (ب) $\frac{2}{4}$ (ج) ٢ (د) $\frac{1}{3}$

٤ مساحة سطح الدائرة تساوي

(١) π نق (ب) 2π نق (ج) π نق (د) 2π نق

٥ في المثلث : أ ب ح يكون : أ + ب + ح أ ح

(١) < (ب) ≤ (ج) > (د) ≥

٦ إذا كان : أ ب قطرًا في الدائرة حيث : ٢ (٥ ، ٢) ، ب (١ ، ٥)

فإن مركز الدائرة هو

(١) (٢- ، ٨) (ب) (٢ ، ٤) (ج) (٢ ، ٢) (د) (٢- ، ٤)

٢ (١) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن : ط = ٦٠° $\frac{2 \cdot \text{ط} \cdot ٣٠}{٣٠ \cdot ٦٠ - ١}$

(ب) أثبت أن : النقط ٢ (٠ ، ٦) ، ب (٤ ، ٢) ، ح (٢ ، ٤) هي رؤوس مثلث

قائم الزاوية في ب

٣ (١) إذا كان البعد بين النقطتين (٧ ، ٤) ، (٣ ، ٢) يساوي ٥ وحدة طول فأوجد : قيمة أ

(ب) أ ب ح مثلث قائم الزاوية في ب ، أ ب = ٣ سم ، ب ح = ٤ سم

أوجد : قيمة ما أ ح + ما ح + ما أ ح

٤ (١) إذا كان أ ، ب قياسي زاويتين متتامتين بحيث كان أ : ب = ١ : ٢

أوجد : ما أ + ما ب

(ب) أوجد الميل وطول الجزء المقطوع من محور الصادات بالمستقيم

الذي معادلته : $1 = \frac{x}{3} + \frac{y}{4}$

٥ (١) إذا كانت ح منتصف أ ب حيث : ٢ (س ، ٦) ، ب (٩ ، ١٢)

، ح = (٢- ، ص) أوجد : قيمتي س ، ص

(ب) أوجد معادلة الخط المستقيم المار بالنقطة (٢ ، ٥) ويوازي المستقيم س + ٢ ص = ٧